




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2353/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2353/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2353/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2353/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2353/A

MS

2353/A

£3

E2

Cal. 72-192

Emp w f8

Adrianus 1650

Handwritten initials or mark

2353/A


L3


E2


Cal. 72192


Enip w f8


H. Evans 1650























56871

NICOLAI FONTANI
INSTITUTIONES
PHARMACEVTICÆ,

EX

BAVDERONIO & DV BOYS

In Pharmacopœorum gratiam potif-
simum concinnatæ.

*hic Liber attinet Franciscæ
Thard appre de*

grasse



AMSTERDAMI,

Ex Typographia Iacobi Charpentier,

Anno Christi cId. Idc. xxxiii.



*Amplissimo Doctissimoque viro,
Perillustri Domino,*

FRANCISCO PAZ,

**Medicinæ Doctori exper-
tissimo,**

*Catholicæ Majestatis, & Serenissimæ
ISABELLÆ, Hispaniarum
Infantis, Belgiique Guber-
natricis Archiatro,*

**Domino suo plurimum
observando.**



Iraberis non immeri-
tò, Vir perillustri, au-
dacious hominis Ba-
tavi, qui tam liberè
D. V. compellat. Sed
ignosce, causamque
simul cognosce. Fama enim eximie
vestræ probitatis, & humanitatis, sin-
gularisque doctrinæ, non solum ad
hoc me excitavit, sed etiam coëgit,
Magnæ enim fælicitatis putabam, ta-
lem

tem virum ; quem præsentem non
possem verbis, saltem absentem lite-
rario aliquo munusculo salutare, &
honorare: præsertim oportuna oblata
occasione. Cùm enim Institutionibus
Pharmaceuticis, quas in adolescen-
tia, & natura ducente, & Patris, Avo-
rumque meorum exemplo monente,
primum Medicinæ, deinde Pharma-
ceuticæ studens, ex probatissimis auc-
toribus collegeram, jamque maturè
recognoveram, Patronum quærerem,
cujus Illustris nominis tutelæ eas
committerem, & consecrarem, nul-
lus mihi occurrit, qui vellet & posset
rectius de iis judicare, meliusque
contra Invidiam & Calumniam eas
defendere, quam is, qui summo inge-
nio præditus ab iis vitiis longissimè
dissidet, & virtute eruditioneque
eam affecutus est auctoritatem, ut
Catholicæ Majestati in pretio, Sere-
nissimæ **ISABELLÆ, HISPAN-**
NIARVM INFANTI Archia-
ter

ter, omnibusque probis ac doctis tam
alienæ, quam propriæ nationis sit
admirationi, dignusque, qui vitam sa-
nam in multos annos producat. Quod
à Medicinæ, & medicamentorum
Creatore summopere precor. Amstel-
dami, ix. Maji. clō. Io. C. XXXIII.

*Amplissimæ & expertissimæ
Dominationi Vestræ addictissimus*

NIC. FONTANVS, I. F.

* 2 AD

A. D

LECTOREM BENEVOLVM,

Ode Iambica.

A Cuere dentes, Mome, cessa lividos,
Innoxiumque rodere.
Si ratio nulla te movet, moveat bonos,
Quos aequitas tulit arbitros.
Lanugo quondam nulla mentum texerat,
Cum Bauderonius mihi
Est Mystagoges artis hujus inclytus,
Quam pharmaceuticen vocant.
Os ejus, & monumenta plures formulas
Dedere commodissimas:
Quas alibi nusquam cum videre fors sinat,
Visum est eas luci dare:
Probæ juventæ mox futuras utiles,
Tyronibusque nesciis.
Nihil peritis, imperitis omnia
Hæc scriptitasse me scias.
Quare libellum hunc consulas rogo boni,
Rudi laboratum manu.
Si vestra laudem gratitudo asperserit,
Pelitiora moliar.

Tuus

Nicolaus Fontanus.

In

• *In Institutiones artis Pharmaceuticæ
doctissimi Viri,*

NICOLAI FONTANI,

Medicinæ Doctoris, & Medici apud
Amstelodamenses eximii.

Pharmaca, Pergameo quondam laudata magistro,
Et toties Coo pharmaca scripta seni;
Pharmaca, quæ tellus, quæ vastus parturit æther,
Aut mediis ægro suppeditantur aquis;
Pharmaca, quæ tacitæ servant sub sulphure flammæ,
Cocta vel è centum pharmaca, simplicibus:
Sumite Bataviæ cives. & discite juxta,
Non has esse bonæ sobrietatis opes.
Tot gula peccatrix, tot gignit pharmaca luxus,
Imperat hæc vobis mensa superba dapes.
Ambitiosa fames & avaræ prandia linguæ,
Et veneris petulans postulat illa puer.
Non hæc Fabriciis, non hæc sunt nota Camillis,
Non Curiis istud perplacuisse olus.
Cum vitiiis Medicina suas accrescere curas
Sentit, & ex ipso crimine lucra capit.
Hiuc querulæ sorbent male-olentia pocula fauces,
Et pariter pœnam, quæ medicamen habent,
Quæ dum succincto donas, FONTANE, libello,
Et precium famæ non leve scriptor habes.
Vive diu, nec sospes ama tua pharmaca. pulchrum est,
Cum curis Medicus non eget ipse suis.

C. Barlæus.

*In Dispensatorium Ingeniosissimi ac
doctissimi Viri,*

NICOLAI FONTANI,
Iohannis Filii, Medici Orphanorum expertissimi.

Fontanus sequitur cari vestigia patris,
Illustratque artem, proavi, retroque sequentes,
Quam tribuere patres, Plempl cognomine clari,
Ergo Plempiadas genuinos gloria jugis,
Fontanosque manet, dum Phœbum laurea comit,
Et Medicina viget, Fontanus honore vigebit.

Zacutus Lusitanus M. D.

*In Institutiones Pharmaceuticas
Doctissimi Viri,*

NICOLAI FONTANI,
Orphanorum apud Amsteldamenses Medici.

Qvem quondam Clario hausisti de fonte liquorem,
Fontane, hunc clarum porrigis & nigrum;
Patris ad exemplū, proavūque, proinde vocandus
Artis tu Phœnix, jure Machaoniæ.
Cur igitur Cives aliorum flumina vultis,
Nectar cum Fons hic præbet & Ambrosiam.
Vos Medici bibite, Tuos FONTANE liquores
Hippocratis natos flumine funde procul.

G. Heeremans I. V. D.

Clarif-

Clarissimo & Excellentissimo viro

NICOLAO FONTANO,

Institutiones Pharmaceuticas
publicanti.

Praeclara laus est, eruditis artibus,
Queis seculo prosumus, antecellere
Vulgus profanum. major inde gloria
Descendit, ac si clarus ortu nobili,
Auroque multo dives illustret domum.
Hæc namque fati subjacent arbitrio,
Levique casu pristinum mutant herum.
Nec tam decorum splendida nasci domo,
Quam turpe, avitum nomen indecentibus
Fœdare factis. Omne sed punctum feret,
Et NOBILIS dici meretur, qui bono
Prognatus ortu propriis virtutibus
Decus paternum tollere in majus studet.
Tibi utriusque copiam fecit Deus,
Fontane, clarus dum propage nobili
Virtute vincis generis auctores tui.
Hi namque pulsi celsiori ab indole,
Cupidique laudis, artibus præ cæteris
Ad hanc laborem transtulere, quæ modes
Docet medendi: pellere ut scirent graves
Morbos ab ægris, & salutem corpori
Morti propinquo reddere. Hæc vestigia
Et ipse totus persequens Apollinis

Instru

*Instructus arte non modo morbis levas
Affecta membra, sed per artem cognita
Profers ad usus publicos, dum pharmaci
Confectiones eruditas nunc doces.
Fontane, quantum te manebit hinc decus,
Originis memor quod altae patria
Et avita sectans studia, fontis illius
Vnda salubri Corpus & Mentem irrigas:
Dum reddis illud sanitati, & instruis
Hanc docta per praecepta te Medicum sequi.
Cures ab isto fonte plures rivuli
Ut in nepotum floreant nepotibus,
Parique cura seculo fructus ferant.*

Debitae observantiae testandae scribebam
IOHANNES CHRISTENIVS.

*In Pharmaceuticas Institutiones
Clarissimi Viri,
NICOLAI FONTANI,
Medicinae Doctoris, & Amsteldamensis
Orphanatrophii Medici ordinarii.*

Illi de Fonte scyphos hos promit Apollo,
Quis Fons! quem primum dicit Apollo sibi,
Non hic tabidulas tantum solarier herbas
Natus, at humanis artibus utilior.
Hic Fons melle scatet, mel arida germina condit,
Hic Fons, si superet, uberiora feret.

I. Hilandros Art. & M. D.

In

*In Pharmaceuticam Doctissimi & in mor-
borum curatione felicissimi,*

NICOLAI FONTANI,

Medici Amstelodamensis.

Quod Parris, quod Avi, Proavique Abavique medendo
Inhæreas vestigiis,

Innumeros gelidæ revocans à limine mortis

Herbis potentioribus;

Frondis Apollinæ cingit tua tempora ramus

FONTANE Doctor inclyte.

Ast ubi præclarum Solis translatus in orbem

Inter Medentes fulseris,

Ipse tibi proprii partem concedet honoris

Præses chori Machaonis:

Ut quicumque tuo lympa de Fonte petita

Ægris salutem infuderint,

Semper odoratos gestent in vertice flores,

Tuo sacratos Numini.

In Eamdem.

Quisquis diversis quæris medicamina morbis,

Ilte salutaris Fons tibi promet aquas.

Amicus amico.

Elen-

Elenchus rerum quæ hoc libro
tractantur.

De Ponderibus,	pag. 1
De Mensuris,	9
De Pharmacopœi officio,	15
De Conditis, & Confectionibus,	19
De Conseruis,	32
De Sapis,	38
De Iulapiis,	43
De Syrupis,	45
De Eclegmatibus,	68
De Speciebus Arom,	75
De Electuariis,	97
De Opiatis,	115
De Pilulis,	131
De Trochiscis,	149
De Ceratis & Emp.	178
De Unguentis,	241
De Oleis,	301

PHAR.

LIBER
INSTITVT. PHARM.
Tractatus universalis,

De

Medicamentorum Ponderibus, & eorum
notis.



In tres partes di-
stinxit Medico-
rum Princeps Hip-
pocrates artem me-
dicam, nempe;
In *Dietam*, quæ
tenuiori, vel ple-
niori alimēto in-
stituitur: in *Chi-*

urgiam quæ divisione, ac conjunctione
absolvitur: Ultimo in *Pharmaciam*, de
qua noster tractatus & labor erit, quæ
omni medicamentorum cognitione, præ-
parationeque consistit, una resolutione,
& cōpositione perficitur ut medicorum
Coryphæus testatur lib. i. de victu acu-
o. De illa multi multa in lucem edi-
derunt, capita & sectiones electuario-
rum, specierum, atque syruporum, di-
A verso

2 INSTITVTIONES

verso ordine statuerunt, sed ego cum Baudoronio, & Renodæo de Confer-
vis & Syrupis, posteaquam pondera
absolverim (quæ in posteriori ordine
ponuntur à multis, sed à me priori,
ut unusquisque qui huic arti incum-
bendi desiderio tenetur, hisce notis,
perfacile cætera quæ ad laudem ejus
& utilitatem proximi pertinent, ad-
discat) incipiendum judico.

Notate, omnia quæ in orbe terrarum
à rerum omnium largitore creata
sunt, certo numero, pondere, atque
mensura, ut cum literis sacris atte-
stantur Philosophi, constare: Consi-
derate quòd ille verus æternusque
Deus tandem hosce, qui justitiam &
æquitatem bono animo secuti fuere
ad astra vehat, ubi audituri sunt vo-
cem exclamantem: Observastis ju-
stitiam, & Deus novit corda ve-
stra.

Estote Medici manus dextra, di-
scite Iustitiam, & audite Ambrosium
inquietem in lib. de parad. *Prosis ali-
liis, non tibi, utilitates tuas neglige, communis
emolumenta præpone.*

Hoc agit justitia, quæ nihil alienum
vendicat, quæ cuilibet dat quod su-
um

PHARMACEVTICÆ. 3

um est, quæ propriam negligit utilita-
em. Si verò Iustitia postponatur, sequi-
tur labor periculo plenus: nam in me-
dicina sæpe bis peccare non contin-
git. Tunc enim non solum Medicum,
sed ipsos & ægrum decipitis, sed ani-
mam vestram immortalem pessunda-
tis.

Occurrunt elementa, ex quibus pon-
dera constant. Inter quæ Granū, græcè
ἐπιπύριον dictum, primum est. quod, atte-
stante Fernelio cap. vj. lib. iv. *Method.*
med. omnium ponderum est mini-
mum.

Sequitur dubitatio fatis memoran-
da, à nullo ante Bandoronium agitata;
& à me hoc loco proposita, quoniam
grano hic & ubique locorum ponde-
randum sit sine clade, incommodo, vel
alteratione ægri? Vultis hordei gra-
num, lentis, cicerum, piperis, vel tri-
tici? Erratis. Ideo audite Baudoro-
nium, qui inquit tract: universali de
ponderibus: Si Aër siccus & serenus sit,
grana erunt sicca: sin verò pluviolosus, ob hu-
miditates & vapores, mollia, & ex conse-
quenti erunt graviora. Igitur quæ eligen-

4 INSTITVTIONES

Cum Fernelio illud minutum numarium, quod aurifabri granum appellant, quodque latinè dici potest momentum, nam hoc omnibus mundi nationibus unum idemque est ac stabile.

Sequitur Chalcus sive Æreolus quipendit grana duo, sive filiquæ dimidium. is jam in usu non est, sicuti olim *Siliqua* à Græcis *Ceration*, ab Arabibus *Kirat* dicitur, habet Chalcos duos, vel grana quatuor.

Davicq. alterius ponderis nomen est, non apud nostros, sed Arabes usitatum: continet filiquas duas, vel grana octo: Semiobulus valet Æreolos tres Siliquam unam & dimidiam.

Obulus Arabicè Onolosat tam hoc sculo in usu est, quam superiori; filiquas habet tres, seu Chalcos sex, aut semis scrupulum, vel grana duodecim.

Scrupulus Græcis Gramma est quasi primum ponderis elementum, & tot sunt in uncia scrupuli, quot in alphabeto græco literæ: nempe viginti quatuor, juxta metrum Poëtæ Faustiniani.

Vnci

Vncia fit drachmis bisquatuor, unde putandum Grammata dicta, quod hoc vigintiquatuor in se Vnci: habet, tot enim formis vox græca notatur. Horis quot mundus peragit, noctemque diemque.

Non levis error multorum cognoscitur, qui viginti grana pro scrupulo statuunt & non vigintiquatuor, ut Domini videre possunt in tractatu Baudonronii de ponderibus, in quo ait: *Libram siegeris ne plures quam duodecim uncias sume, sic, & in omni loco, quæ pro quarta parte tres uncias & non quatuor, quod mercatorum est, habet; Vnaquæque uncia octo drachmas, drachma scrupulos tres, scrupulus vero viginti quatuor grana, quæ faciunt 72. grana pro unaquaque drachma. Numerum si observaveritis, vobis honestum nomen, ægro sanitatem, medico honorem, absque dubio, comparabitis.*

Aggrediamur Drachmam, apud græcos Holce dictam, octavam uncix partem, non nonam, ut Salernitanus inquit, quæ notatur 3.

Hanc sequitur Denarius Romanus, qui apud aurifabros ponderosior est.

A 3

Hanc

6 INSTITVTIONES

Hanc Medici scrupulum vocant. Tenet grana xxiv. illorum vero valet octoginta duobus granis. itaque septem Denarii Vnciam constituunt. Notandum quod Romani Denarium pro Drachma, & vice versa Drachmam pro Denario, ob paruum inter illos discrimen, statuerunt, teste Galeno lib. octavo de Medicam, loc. ubi ait: *Denarium Romanum, Græcorum esse Drachmam. Notantur.* D , vel Den.

Aureus, Exagium, Sextula, & Solidus non nisi nomine differunt, nam pendunt sextam Vnciæ partem, nempe quatuor scrupulos, si octo drachmas cum Græcis dixeris, sesquidrachmam, ex auctoritate Salernitani, qui ex novem Drachmis Vnciam construit, notantur: Aur. Exag. Solid. & Sext.

Affarius, vel Sicilicus Didrachmam apud Scriboniū pendit. notatur z ij .

Quæ tertiam Vnciæ partem habet ex octo Scrupulis confectam, Duella nominatur, literisque primis notatur, Duell.

Sator semiuncia est, Dupondiū quoque dicitur. pendit Affaria duo. notatur, z \beta , vel z. iv .

Ad

PHARMACEVTICÆ. 7

Ad Vnciam perveni. quæ duodeci-
na libræ pars est, tam apud Græcos,
quàm Latinos, & Arabes.

Pendit 3. viij. vel septem denarios,
vel scrupulos xxiv. vel grana 576. te-
stante Baudronio, cap. de Ponderibus,
*Errorem multi committunt malè ducti aucto-
ritate Nicolai Salernitani, Saladini, Nicolai
Præpositi, constituentes tantummodo scrupulum
ex xx granis. Quod animadvertit Re-
nodæus in institutionibus Pharmaceu-
ticis, cap. de Metridatio.*

Nec non Iacobus Sylvius lib. iij. de
Medicamentorum præparatione, cap.
de Ponderibus, ac olim ineus in cele-
berrima Duacensi Academia veneran-
dus Professor, Doctor Ludovicus Gar-
dinius lib. de Remedio errorum, con-
tra acutissimum Fernelium falso de-
ceptum.

Quem si rectè revolvatis, non dubi-
to, quin omnis abusus & omnis ejus
occasio bonis avibus exulabunt, sic-
que pondus nobis remanebit justum
& verum. Faxit Deus, O! Faxit in
multa sæcula, in bonum sanitatis,
conscientiæ tranquillitatem, & Rei-
publicæ commodum, ac utilita-
tem.

A 4

Si

3 INSTITVTIONES

fi sextans scribitur, cape. ζ ij, si triens, tres, quadrans, quatuor, quincunx, quinque, semis, sex. Semis significat mediā alicujus ponderis partem, seu ζ vj. septunx, septem, bes vel octunx octo, Dadrans, novem, Dextans, decem, Deunx, undecim, &c.

Omnia quæ numerantur, ut, Amygdalæ, Sebesten, Pruna, aut similia, præscribenda sunt, monente Rondeletio, notis priscorum Romanorum, quæ ita depinguntur. i.ij. iij. iiij. v. vj. vij. non Characteribus, vel Ziphris, ne ignarus tyro, pro drachmis 32, depictis, triginta duas assumat.

Ana plurium medicamentorum æqualem esse assumendam portionem indicat hic, & ubique locorum.

Ne pondera ex plumbo conficiatis, nam illa facile obducuntur sordibus, & gravantur ac deinde multa purgatione leviora fiunt; sit vobis materia immutabilis, ut ferrea, ærea, vel argentea, quam ego ex aliis eligerem.

Caput II. De Mensuris.

Non sine ratione divinus ille Plato hominem omnium animantium sapientissimi-

PHARMACEVTICÆ. 9

mentissimum dixit, quod numerare non
verit. Nam ponderando unicuique su-
um tribuitur, quot iussit Deus opt. max.
Levit: 19. & Deut. 26.

Dum ait: *Omnia iusto pondere atque men-
sura trutinentur*. Itaque mihi cogitanti
nihil firmum ac stabile præter Deum
in hoc seculo manere, atque omnia
temporis mutatione mutari, operæ præ-
mium me facturum putavi de certo et-
nam mensurarum genere, quod hic &
ubique locorum in usu sit, pauca loqui.

Sicuti pondera pro solidioribus, ita
mensuræ pro liquidis medicamentis
constituuntur. Discrimen inter hoc illud-
ve liquidum satis magnū apparet: verbi
grat. oleum levius vino: quia constat
partibus aquosis. E contra mel du-
plo ponderosius est oleo, ob naturam
densam & gravem. Hisce perpensis
Pharmacopæus mediocriter saltē ver-
satus omnia pondera priscorum ad no-
stra redigere potest. Interea quid
Congius sit, petimus.

Ex Congio vel Cho pendent cætera,
Congius vel Chus in regione Persa-
rum, & Romanorum pendebat libras
decem, sed apud Athenienses, novem.

Et quod Sextarius ab Arabibus, vel
Aꝛ Chri-

INSTITVTIONES

Christ dicitur, sextam Conchii partem tenet, quæ apud græcos valet libra 1 β , apud Romanos $\frac{3}{4}$ xx, quæ libram habet 1. & $\frac{3}{4}$ viij.

Cotula vel Hemina, semi-pars Sextarii est. quæ, ut Galeus testatur lib. 10. de Compos. medicamentorum, & in compositione Andromachi, & Hieræ, apud Græcos valet $\frac{3}{4}$ ix. sed apud Latinos decem. qui tamen nullum, quamvis Græcus esset, inter hæc pondera discrimen habuit: nam cum Romæ vitam degeret, in hisce parum vel nihil mutavit. Ita, ut iudicem illum de re tam facili, atque nullius momenti, nunquam verbis concertasse.

Pendit ergo Congius olei libras novē, vini decem, tredecim & semis mellis.

Sextarius continet octodecim uncias olei, viginti vini, & viginti septem mellis, quæ duas libras & quartarium constituunt.

Hemina novem uncias olei capit, vini mediocris substantiæ decem, tredecim & semis mellis.

Mystrum magnum uncias tres olei, vini verò uncias iij. & viij. sed $\frac{3}{4}$ iv β . mellis continet.

Acetabulum octodecim drachmis olei,

PHARMACEVTICÆ II

lei, ℥ij. & xij. vini, ℥ iij. & ix. mellis perficitur.

Cyathus, ita ob similitudinem vitri dictus, ℥.x.olei habet, ℥ iß. & iv.vini, ℥ ij. ℥ ij. mellis.

Parvum mystrum ex sex Drachmis olei, & viginti scrupulis vini, & drachmis novendecim mellis paratur.

Mensuras tam apud Græcos, quàm Arabes, & Romanos usitatas recitavi, quibus unusquisque absque læsione conscientiæ, sine Medicorum controversiis, hic, & ubique locorum uti poterit. Iam de iis quæ manu exhibentur.

CAPVT III.

De Manipulis.

Cum Fasciculus inter manuum mensuras maximus sit, statuo ab eo quasi à corpore integro, id est, ab universali, ad particularia pervenire.

Fasciculus itaque est, quod toto comprehenditur brachio. Notatur primis majusculis literis, FASC.

Rarò notatur vel præscribitur, nisi in exhibitione viridum herbarum, quibus utimur in magna quantitate, ut pro balneis, semicupiis, &c.

Manipulus est, quod manu comprehenditur.

ditur. Notatur M.

Pugillus quod tribus digitis. Notatur P.

Semis medium est, ut in Cap. de Ponderibus satis abunde diximus, notatur. ß.

Omnia à senioribus in lucem edita, repetere superfluum est. Si quis ergo illorum mensuris, curiositatis causa, studere tentet, legat Galenum, Cornelium Celsum, Paul. Æginetam, Avicennā, Aëtium, Scribonium, Oribasium, Salernitanum, Saladinum, Præpositum, Rondeletium, Fernelium, Iacobum Sylvium, Baudronium, Renodeum, atque Cordum, vel plures, qui hoc tempore de hisce tractarunt.

CAP. IV.

Referuntur aliqua generalia nomina, sub quibus simul, comprehenduntur plura, quæ ponuntur in descriptionibus decoctorum, quibuscum dissolvuntur purgantia, aut infunduntur.

Quinque radices aperientes.

Petroselini.

Fœniculi.

Apii.

Rusci, &

Asparagi.

Aliqui-

PHARMACEVTICÆ. 13

Aliqui loco radicum Apii, ponunt ra-
dices Graminis.

Herbæ iv. emollientes.

Malva.

Althæa,

Violaria,

Acanthus, id est, branca ursina, vel

Mercurialis,

Beta.

Parietaria &

Atriplex.

Modo sumpseris quatuor quaslibet
ex his octo, habebis quatuor herbas e-
mollientes.

Omnes capillares herbæ, sive quin-
que capillares.

Polytricum.

Capillus Veneris.

Adiantum vulgare.

Salvia vita, vel

Ruta muraria, &

Asplenium, seu

Ceterach.

Semina iv. frigida majora.

Melonum.

Cucumeris.

Cucurbitæ, &

Citrulli, vel

Peponis.

A 7

Semi-

14 INSTITVTIONES

Semina iv. frigida minora,
Lactucæ.
Portulacæ.
Endiviæ, &
Cichorii.

Semina iv. calida majora
Anisi.
Fœniculi.
Cumini, &
Carui.

Aliqui loco Cumini substituunt Corian-
drum.

Semina iv. calida minora.
Ameos.
Amomi.
Aprii, &
Dauci.

Flores cordiales tres calidi.
Chamomillæ,
Meleloti.
Anethi, aliàs Liliorum.

Flores cordiales tres frigidi.
Violarum, aliàs, Rosarum.
Boraginis, &
Buglossi.

Hi flores etiam intelliguntur, quan-
do simpliciter de tribus floribus cor-
dialibus est mentio, sine prolatione
frigidorum.

Aquæ

PHARMACEVTICÆ. 15

Aquæ cordiales quatuor.

Endiviæ.

Cichorii.

Buglossi, vel, Boraginis.

Scabiosæ, vel Melissæ.

Nota præscribendi modum. Nam quando dicitur: Radicum quinque aperientium uncia ij. sine vocula (ana) tunc oportet sumere tantummodo aliquod ex singulis radicibus aperientibus, ita ut omnes quinque simul junctæ efficiant unc. ij. dumtaxat. Si verò diceretur cum vocula (ana) sic: radicum quinque aperientium ana unc. ij. tunc deberet sumere radicum aperientium unc. x. id est, unc. ij. ex singulis.

Qualis Pharmacopæus esse debeat.

ANtequā institutū nostrū aggrediar, quid Pharmacopæus, & qualis esse debeat, quale itidem illius objectum, seu finis sit, placuit hoc loco, rudiori, ut ajunt, Minerva, vobis præ oculis ponere.

Vitæ probitas non tam in Philosopho, quàm Pharmacopæo, qui vel tuendæ, vel resarciendæ sanitatis gratia, medicamenta parat, & porrigit, expetitur. in ejus enim manibus morbus
& sa-

16 INSTITVTIONES

& sanitas, vita & mors. Atqui illi cum mala mens est, vel nescia recti, libera patet nocendi & necandi potestas: sicq; præstat Pharmacopæum esse virum bonum, quam Socratem.

Debet autem inprimis esse pietatis studiosus, divini nominis cultor, invidia & livoris omnis expers, sanus mente, artis Grammaticæ gnarus, bonorum fortunæ nec indigus, nec auri vel pecuniæ sitiens, & laboris diurni nocturnique patientissimus. Atheus enim ut nihil ducit creatorem, sic nec creaturam; Et,

Invidus alterius macrescit rebus opimis.

Fatuus vero id habet proprium, ut velit nocere; Et imperitus nil nisi quod ipse facit, rectum putat, ideoque eo nihil iniustius. Avarus autem nulli bonus, adeo ut sibi ipsi pessimus sit, & egenus facile fiat veneficus, Ad turpia enim cogit egestas.

Indigni quoque sunt Pharmacopæi nomine & dignitate, scurræ, bibuli, histriones, mimi, erronei, garruli, impostores, agyræ, tenebriones, & circulatores, qui nugis, fraude, jactatione, promissis vanis, adulatione, & men-

PHARMACEVTICÆ. 17

mendacio plebeculam decipientes, ipsius crumenam exhauriunt; Nihil enim Reipubl. magis infensum id genus hominibus, *cane quovis peioribus & angue.*

Dum autem idem sit subjectum Pharmaciae, & Medicinæ, nempe corpus humanum, quatenus sanitatis est, vel morbi susceptivum, multa habent inter se communia Medicus, & Pharmacopæus, ut prudentiam, probitatem, diligentiam, & medicamentorum cognitionem. Sed cum Pharmacia inserviat, ministret, atque subjecta sit Medicinæ, habeatque tantum pro objecto medicamentum, & pro scopo, & fine formam debitam medicamenti, cum ulterius progredi Pharmacopæus audeat, pro Pharmacopæo veneficus, & circulator habendus est.

Officium igitur Pharmacopæi est, medicamenta solummodo tractare, atque usum salutarem Medici consilio jussuque adhibere. Quod ut feliciter consequatur, primo debet ea seligere, secundo præparare, tertio componere.

Quæ omnia ut rectè ad proximi commodum efficiantur, te clementissime Pater supplex oro, ut meam, Pharmaco-

18 INSTITVTIONES

copæorumque mentem clarissima fan-
ti Spiritus luce illustres, ut tandem mei,
& illorum conatus, ad tui nominis glo-
riam referantur, Amen.



PHA R-

PHARMACEVTICÆ. 19
LIBER PRIMVS.

Seçtio Prima.

CAP. I.

De Conditis, & Confectionibus in genere.

ANte omnia de Conservis & Confectionibus gulæ, stomachoq; gratissimis, humanę naturę familiaribus tracto: quę tam pro alimento, quàm pro medicamento haberi possunt.

Plantę, earumque partes ob quatuor cõdiuntur rationes. Prima est, ut palato jucundiores sint. Secunda, ut diu serventur integrę. Tertia, ut facultas illarum debilis mixtione maiorem vim acquirat. Quarta, ad auferendam, vel saltem obtundendam malignitatem superfluā: quod fit infusione, coctione, assatione, ustione, atque lotionē, & hisce similibus, ut postea apparebit.

Plantę partes condiendę illo tempore, quo illarum vires vigent maximē, ut non monstrat Diosc. in limine libri primi, & post illum Galenus.

Radices succulentę, leves, & rarę, non nisi vere, vel initio æstatis, antequā illarū succus thyrsos, ramos, frondesque pertransiverit, ut Apii, Buglossi, Cichorii, & alię multę. Vice versa, quę ex substantia crassa, densa, & gravi constant,

constant, habentes humiditatem superfluam, in Autumno, quo tempore plantæ foliis suis exuuntur. Nam tunc calore solis humiditas consumitur, & vis stirpium multarum fugit ad radices, atque humor magis est percoctus, teste Gal. de alim. facult. cap. 16. Cælo sereno, plenilunio sunt radices Satyrionis, Irios, Scyllæ extrahendæ, ut videre est apud Diosc. loco citato.

CAP. II.

De Conditis in specie.

DVorum apud Græcos est generum cynosorchis, seu satyrii. Sed eligendæ illæ radices, quæ bulbosæ oblongæ. Vires earum examinandæ, apud Diosc. libr. 3. cap. cxxij. fol. 271. Sequitur condiendi modus.

R. Radicum Satyrionis in Autumno electarum, lotarum, & à primis pelliculis mundatarum. Lib. i. Coquantur in aqua donec tenerescant, deinde in umbra siccentur, sepositis linteis.

Exsiccata misceantur cum pari portione sacchari, in earum decoctione, clarificati, ad electuarii consistentiam cocti,

PHARMACEVTICÆ. 21

cocti, tamen postea ob maiorem con-
servationem, & consistentiam paulo
humiditatem, exponantur soli, ut aquæ hu-
miditas tota dissipetur: seruentur in
olla benè vitreata & cooperta ad usum.

Vires potestis videre apud Io. Mes-
satè.

CAP. III.

*De rad. Symphyti majoris, Iridis, Acori,
& Enulæ campanæ.*

DE hisce ratio planè est eadem, uti
de præcedentibus, attamè discri-
men parvum est, nam illæ integræ, hæ
autem per taleolas concisæ cōdiuntur,
Propter amaritudinem diutius aquæ
s. q. debèt infundi, ut Iubertus monet,
hunc conficiendi monstrans modum,
In hisce ego Baudronii sententiam se-
quar, qui radices primum lotas & mun-
datas coquit, deinde tundit, postea cri-
bro transmittit, tunc excipit duplo sac-
charo ad electuarii cōsistentiam cocto,
& calefacit tantisper dum humiditas
superflua dispareat; quæ cum evanue-
rit, pyxidibus recondit. Si quis fuerit,
qui penes sese illas tempore pestis, vel
itineris

itineris habere optat, poterit modum conficiendi radices Satyrionis sequi, sed neminem obligare volo. Vnum addam: Quo crassiores radices melius purgatæ fuerint à fibris suis, eò diutius conservabuntur, & usui accommodatiores erunt.

CAP. IV.

De Radice Buglossi, Boraginis & Cichorii.

RECTè quidem hæ radices juxta modum rad. Satyrionis condiuntur: sed tamen consulerem illas lavare, & ab internis partibus durioribus, (quæ cor, vel pars lignosa interna dicitur, aut matrix) mundare, & ad mollitiem coquere; deinde extendere supra linteum pannum in umbra per biduum, aut triduum, ut superfluous aqueus humor evanescat, & saccharo, aqua, vel decoctione harum cocto ad justam consistentiam, eas addere, & coquere de novo, donec humiditas superflua, quæ aucta est, consumatur.

CAP. V.

De Radicibus Eryngii.

NOtandū quod Eryngium à Sylvio, multisq; aliis supponitur pro Secacul

PHARMACEVTICÆ. 23

Secacul Arabum, ex Indiis Orientalibus al-
 lato, sed incognito multis. A Rondo-
 etio in officina Pharmaceutica, gallicè:
Gingiber mechn, dictū est. Sed ut sine ullo
 dubio de hac radice vera judicare pos-
 sitis, legite Serapionem inter Arabes
 excellentissimū libro de Simp. cap. 89.
 tract. 7. & cap. 35. Avicennam post illū
 libr. secundo, cap. 670. tract. 7. Nec non
 caput Hali, filii Abbatis, duodecimum,
 In horto civitatis Aleppæ foliis no-
 stræ pestinacæ herba similis floruit, quæ
 apud multos pro vera Secacul habeba-
 tur. Sed vulgarissima Medicorum opi-
 nio est, Eryngiū à Secacul minimè alie-
 num esse.

Ratio condiendi est cum aliis com-
 munis: nam primo rad. Eryngii cortice
 extimo, lignoque interno exempto plu-
 res dies in aqua pura (non ut aliqui vo-
 lunt salsa) tam diu infundi debent, do-
 nec mollescant, deinde, ut præscriptæ,
 condiendæ. Mesues quædam aromata
 addit, ut cinamomum, zingiber, chario-
 phyllos, & summopere mel ad cōdien-
 dum laudat, sed nos cum Bauderonio
 saccharum præponimus.

CAP.

CAP. VI.

De Corticibus.

Quia tutior certiorque via condiendi à junioribus inventa est, ad præseruationem corticum Arantiorum, Limonum, Citriorum, &c. ideo modulus à Doct. Mesue præscriptus parum curatur.

Cortices ex lixivio dulci, vel aqua pura coquantur donec tenerescant, & pellucidi fiant, ut immunes sint ab amaritudine; deinde affunditur iis Iulapium ex aqua & saccaro coctum, in quo quatuor dierum spatio macerentur, denuo coquantur; donec acquirant justam consistentiam. Postea insolentur propter humiditatem superfluum.

CAP. VI.

De Caulium conditura.

PAuci plantarum condiuntur caules partim ob duritiem, partim etiam ob insuauitatem, vel qualitates inutiles. ideo inconsultum mihi videtur tempus in iis

PHARMACEVTICÆ. 25

ni aliis inutiliter terere, sed uno exemplo proposito, ceterorum condiendi modus facile elucescet.

℞. Caulium lactucæ crispæ à pelli-
cula exteriori purgatorum lib. 1.

Coquantur ex s. q. aquæ pluvialis,
donec mollescant, deinde exsiccentur
in teo, postea sume par saccari pondus,
& cum aquæ s. q. coque, donec syrupus
liquanto crassior evadat, & repone in
ase habili.

Si forma ficcior magis arrideat, ex-
terius tergeantur & siccentur, cum per
inā atque alteram ebullitionem in sac-
cario percocti fuerint.

CAP. VIII.

De Fructuum Conditura in genere.

Nonnulli fructus virides in locis ubi
crescunt condiuntur, ut, Myrabolani,
Nuces Moschatæ, Cassiæ fistulæ.

Per virides intelligimus recentes,
cum Mesue cap. de Elect. Psylli. In
hisce vero regionibus, vel integri, vel
divisi ante maturitatem, vel dum ma-
turi sunt, condiuntur cum melle, vel
Saccharo, ut Nuces, Amygd.

B

Mat-

Maturi, ut Berberes, Pira, Cerasa, Abri-
cotti, Cydonia, Pruna.

CAPVT. IX.

De fructuum conditura in specie.

Nuces virides, & adhuc teneræ diebus
xv macerantur, quaterquotidie mu-
tata aqua, tribus quatuorve foramini-
bus prius pertusæ. Amaritudine exuta
coquantur aquâ, donec satis emollitæ
videantur, deinde melle affuso despu-
mato reponantur. Post triduum propter
humiditatem superfluum denuo co-
quantur ad syrupi formam. Antequam
hoc fiat consulere ut nuces coctæ
frustulis Cinamomi, aut Garyophyllis
per longum scissis cōfigantur. Sunt qui
saccharum, sunt qui mel volunt, quod
perinde est. Ut albæ appareant, ab
externis mundentur corticibus, & in-
fundantur aquæ clarissimæ, sine Cina-
momo Garyophyllisque, & postea
cum s. q. sacchari coquito ad consisten-
tiam

CAP. X.

*De Prunorum, Pirorum, Malorum,
Persicorum conditura.*

In hac conditura sequimur eandem
methodum

PHARMACEVTICÆ. 27

methodum, cum ferè matura sunt.
A pellicula exteriori mundentur, tum
paulatim ebulliant in s. q. sacchari
purâ cocti ad mollitiem, reser-
uenturq; usui.

CAP. XI.

De Amygdalis,

Quid de ijs multa dicam: quando-
quidem in propriâ regione condiun-
tur, vel ex melle albo, vel ex Sac-
charo puro, mense Iulij, ut Nu-
ces.

Possunt etiam involvi Saccharo,
ut Saccharo Anisato, Carvino, et
simili.

CAP. XII.

De Olivis.

Non condiuntur Melle, vel Sac-
charo, sed Muriâ, quâ amaritudi-
nem amittunt.

CAP. XIII.

De Cerasis.

Veniamus ad Cerasa, quæ hoc modo condiuntur. Saccharo purgato, & coctione inspissato, aliquanto magis quam si manus Christi (quod Saccharum Rosarum dicitur) conficeretur, cera sa incorporantur ad justam consistentiam, excoquantur, adseruentur, reponanturque usui.

Nota quod signum perfectæ coctionis Sacchari sit, si super marmor vel pelvim projectum non adhærescat. Itidem faciendum est de Oxyacantha, vulgo Barberes, de uvis immaturis, & Ribis.

CAP. XIV.

De Pulpa Cydoniorum.

CApe Cydonia matura, cortice exteriori liberata, & à parte interna ossea purgata & in parvas partes diuisa ad placitum, coquantur in saccharo aqua diluto, donec simul acquirant rubedi-

PHARMACEVTICÆ. 29

medinem, tum agitatione continua mu-
nentur in pulpam pyxidibus includen-
dam.

Obserua quod unicuique libræ pulpæ
cydoniorum addatur lib. ꝑ Sacchari.

Si quis medicorum pulpam Cathar-
ticam optet, addat libræ pulpæ calidæ
lib igne dimissæ ꝑ ꝑ. vel drachmas vi.
cammonii pulv. optinè: cinamomi
subtiliss: ꝑ ii. & det ægro ꝑ unā ex mix-
tura cydoniorū: quæ quantitas sufficit
ad Choleram movendam in iis qui à pil-
ulis abhorrent. Si pituitam, adde un-
ciam Turpethi, quatuor scrupulos Zin-
ziberis pulverisati, unicuique libræ: si
utramque simul, fac partes æquales
cammonii, & Turpheti, & da secun-
dum qualitatem personarum. Sic Mesu-
ses & Nicolaus.

CAP. XV.

De foliorum condituris.

CONvertam me ad herbarum folia,
quæ vel natura humida, vel sicca
sunt.

Si humida, succum extrahe, & cum
duplicato saccharo coquantur in syru-

A 3

pum,

30 INSTITVTIONES

pum, vel paulo altius. postea huius
adde residuum benè in mortario
marmoreo cum pistillo ligneo pista-
tum ac mixtum: seruetur in ollâ vi-
treâ.

Si sicca, ut Absinthium Ponticum
Capillus Veneris, Ceterach abjectis
pedicillis & fibris, pistanda sunt, ut
supra, addita duplici Sacchari quan-
titate ad incorporandum.

Sunt, qui herbas pulverisant, &
Saccharo earum infusione rite decocto
excipiunt. Quod probat summopere
Bauderonius lib. i. sectione i. *de folio-
rum condituris.*

CAP. XVI.

De florum conditura in genere.

Non omnes ad Conservas idoneos
esse scitote, tamen non nego ex omni
florum genere fieri posse: sed affirmo,
quod aliter medici, ars ipsa, et expe-
rientia statuerint. Flores autem qui
condiuntur sunt vel humidi, vel medij,
vel sicci. Humidi sūt flores violarū, Bu-
glossi, Boraginis, Cichorij, Nenupharis.
Sicci:

PHARMACEVTICÆ. 31

Sicci : Tamarisci, Stæchados, Rosmarini. Medij, Rosæ, Betonicae, & similes.

Sunt qui volunt humidiores sole exsiccandos esse, inter linteola, ad diminuendam superfluitatem, ut postea melius Saccharo triplicato misceantur, ad formam conservæ. quod à me non improbat; sed sequendum iudicio Frambosarij & Bauderonij documentum, quo monemur Saccharum floribus benè mixtum, pistatumq; soli exponere, & bis terve in septimana agitare, donec simul cocta, atque fermentata sint. quod noster Mesues lib. de simpl. med. purgantibus Cap. de Rosis demonstrat.

Errant toto coelo illi, qui solummodo papyro ollam tempore insolationis claudunt, eamq; perforant acu, exhalationis causa; præcipuè, cum Mesues claudi strictissimè iusserit ob virium labefactionem.

CAP. XVII.

De florum conditura in specie.

Id quod Medicorum Antesignanus distinctione quarta Saccharū Rosatum, &

B 4

Nico-

32 INSTITVTIONES

Nicolaus in Antidotario suo *Rodofaceharum* nominant, à nobis *Conserva Rosarum* dicitur, jure, & merito, nam nostri saccharum Rosatum hoc esse dicunt, quod ex pari quantitate sacchari, & aquæ rosaceæ, ad consistentiam electuarii solidi coctum est.

Est nostra *Conserva Rosarum* duplex.

Mollis, quæ ex floribus duplo saccharo mistis constat.

Solida, quæ ex floribus pulverifatis, siccatisque cum octuplo saccharo in aqua rosacea diluto, & ad electuarii solidi consistentiam cocto (cui parum succi Agrestæ, aut Succi Limonum commiscetur) componitur. Loquar de succo Limonum vel Agrestæ, ob colorem gratiorem, sed moneo ne cum aliquibus scelestis in perniciem utentium oleo Sulphuris utamini.

DE CONSERVIS.

℞. Ergo fol: Ros. recentium, nondum perfectè explicatarum, & exungatarum. Libram unam. Terantur Rosæ in vase lapideo, & permisceantur Sacchari lib. ij vel iij simul. Aliquamdiu tundantur, & reponantur in vase vitreo, pergamento operculato.
In

PHARMACEVTICÆ. 33

Insolentur tribus mensibus, de die
æpè agitando, ut per omnes benè co-
quantur partes. Potest hæc conserva
duobus annis colore constare, & ægris
cucunditati esse. Sunt nonnulli qui co-
cto saccharo Rosas miscent; ut lauda-
tissimam conservam parent, & nō con-
fundunt, sed forficis incisas, & saccha-
ro addito manibus curiosè confricant.
Hic modus mihi non probatur.
Nam me convertam ad solidam, quæ
conficitur ita.

℞ Rosarum ruberrimarū exiguè sic-
catarum, & optimè à parte ima albi-
cante (quæ unguis dicitur) munda-
tarum ℥. i. Ne ob triturationem faci-
liorem, igni, ut multi solent, admo-
veatur, nam facile odor rosarum peri-
ret, & Sacchari cocti, cui parum succi
Limonum, vel Agrestæ commiscetur,
℥ viii, formentur morselli vel longi,
vel rotundi, pro-ut placet.

Hæc gratior molli est: nam huic
drachma pulveris tantum uncia Sac-
chari: Illi vero uncia semis addita est
uncia.

Color sex mensibus perseverat, si
benè reservetur, Conserva violarum,
eodem modo quo rosarum fit: hoc uno

B 5

excepto

34 INSTITVTIONES

excepto, quod hæ paulò diutius in umbra siccandæ, & cum saccharo insolandæ sint.

Idem est de omnibus floribus, conseruis, aut tritis aut integris, ut Boraginis, Buglossæ, Nenupharis, Cichorij, Rosmarini, Salviæ, Betonicæ, Sambuci, Fumariæ, Euphrasiæ, Rutæ.

Mesuei opinio refutatur de exsiccatione florum violarum, Buglossi, Boraginisq; ob eorum virtutem superficiale, & citò dissipabilem; quæ si amittatur, simul etiam vires amittunt: nam ex se humidiores non sunt, quam vires postulant. Attamen si rore cœli, aut imbribus aëris maduerint, tunc ante conservæ confecturam debebunt parum in umbra potius, quàm in sole exsiccari. Nec mirum cuiquam videatur, quod hoc loco etiam de Melle tractem, quod apud Latinos *Rosatum*, Arabes *Geleniabin*, Græcos vero *Rhodomet* dicitur. Nam id ipsum locus & ratio mihi persuadent; quia species quædam Conservæ liquidioris rosarum est. Ejus conficiendi normam cum ubiq; diversam reperim,

PHARMACEVTICÆ. 35

rem, impræsentiarum tres vias præ-
faciam.

Prima recipit

*Ros. rubrarum integrarum & tritarum, ab
anguibus purgatarum partem unam mellis
albi, partes tres coquantur simul, & colen-
tur pro usu.*

Secunda recipit

*Partes æquales Ros. rubr. & mellis despu-
mati, quæ simul insolentur, per dies aliquot,
& colentur ad usum.*

Tertia recipit

*Rosas, & succum expressum, & triplum
mellis, quæ vel coquantur leviter simul,
vel exponuntur soli, & ita servantur ad u-
sum.*

Sunt, qui succum custodiunt, & tem-
pore necessitatis coquunt, cum Melle
ad justam consistentiam cocto, & ita
exhibent. Sed mihi arridet modus ter-
tius, quo mel secundum Medicorum
mandatum optimum redditur.

Idem sentiendum est de melle Ros.
laxativo.

CAP. XVIII.

CAP. XVIII.

De Melle Anthosato.

ANthos nomen commune est florum,
quod Medici per *Anthonomasiam* tri-
buunt flori Rosmarini ob specificam
dignitatem.

Modus parandi.

Rx. Flor. Anthos, seu Rosmarini lib. I.

Mellis boni, bene despumati, lib. III.

*Misce in olla vitrea oris non valde patuli, insola,
& serua ad usum.*

Si Mel nimis inspissatum fuerit, adde
parum vini generosi, ut fiat liquidius.

Cum Rosmarinus bis in anno flo-
reat, nempe, Vere, & Autumno, potest
bis optimè confici dictis temporibus,
tunc enim flos illius recens est, & sua-
vissimè fragrat.

CAP. XIX.

De Melle Mercuriali.

NE ex floribus foliisque maceratis
componatur, nam quod ex ipso
succo conficitur, efficacius à nobis ju-
dicatur.

PHARMACEVTICÆ. 37

indicatur. Tam ex mari, quam fœmina
succus extrahi potest, uterque enim vi-
res affines habet.

R̃. Succus Mercurialis lib. i. ſ.

Mellis opt. depur. lib. ii.

Despumando coquantur ad justam
consistentiam, Multa variaque mella
esse docet ars Pharmaceutica, ut Scili-
tica, Myrthina, Myrobalanica, quæ
omittenda sentio. Tamen aliquid de
melle Anacardino sermocinandum, cu-
jus modus conficiendi multiplex est.
Nonnulli illos fructus aquæ tepidæ in-
fundunt, & coquunt donec aqua rubescat,
mellisque spissitudinē acquirat. Alii in
aceto forti macerant per dies aliquot,
deinde coquunt ad dimidias, postea
cum melle in syrupum. Multi sunt, qui
Anacarda terunt, & melli vino liquato
addunt, & ita coquunt atque colant.
Ut sit, nemo tenetur legibus, modò
medico placere studeat.

Fit etiam Mel ex passulis, quod hoc
modo conficitur.

CAP. XX.

R̃. Passularum ab Acinis purgat. lib. i.

Quæ infundantur lib. iii. aquæ ca-
lentis, xxiiii horas: postea co-
B 7 quan-

38 INSTITVTIONES

quantur ad dimidium, Colatura fortiter expressa concoqui debet ad mellis consistentiam. Sunt qui mel addunt ob saporis gratiam, quod planè dissuadet Matthæus de Gradibus Cap. de Lepra.

SECTIO SECVNDA.

CAP. I.

De Sapis in genere.

Christophorus, *Roba Robub* distinguens toto coelo errat, ut probat Serapio tractatu 7. Cap. 25. Avicena lib. 5. tractatu 6. Rhafis, & Mesues distinctione 6. qui sine ullo discrimine *Rob* & *Robub* pro quouis inspissato succo usurparunt. *Rob* absolute prolaturum idem quod *Sapa*, *Carenum*, & *Defrutum*, ut attestantur Græci.

Cum aliquid per nomen *Rob* significare placet, postponuntur plantarum nomina, ut *Rob Absinthij*, *Eupatorii*, &c. Ergo *Rob* vel *Robub* nihil aliud significat, quàm vinū ad tertias coctum, quod nostri *Sapam* dixere, vel succum herbarum, vel fructuum sole inspissatum cum saccharo vel sine illo, teste Nico-

PHARMACEVTICÆ. 39

Nicolao Præposito lib. 2. Cap. iij
de Syrupis, quem summopere com-
mendo Pharmacopæis.

Ex hisce multi per annos integri ser-
uantur, ut Aloë, Acacia, Hipocistis,
succus Glycirrhizæ, & vinum coctum.
Si quis huic expressioni Mel vel Sac-
charum addiderit, conservationis cau-
sa, ille jam Rob simplex in compo-
situm mutat, ut Rob Mororum, Nu-
mæum, Omphacinum &c.

CAP. II.

De Sapis in specie.

Rob per emphasin vinum dulce est
ad tertias coctum. Succu vel extra-
huntur prelo, vel sola manuum com-
pressione: deinde per manicam traii-
ciantur, ut quicquid inest sordidum,
linteo adhærescat, quò purior suc-
cus transmittatur: qui postea lebete
aut alio vase exceptus insolatur, vel
igne lento coquitur, donec aquea hu-
miditas sit resoluta, formamq; soli-
dam acquirat. Sic Mesues, Serap: Avi-
cenna, & Nicolaus Præpositus sēserunt.
Sapæ cōpositæ sequūtur, sicuti in sequēti
Diamo-

40 INSTITVTIONES

Diamoronis descriptione videre est. Quæ non ex solo succo ad tertias cocto, sed ex diverso succorum genere una cum melle componitur, unde jure merito inter sâpas compositas locum occupat. Ejus compositio hæc est.

Recipiatur Succi Mororum Agrestium, necdum maturorum lib. i. Mororum celsi: id est domesticorum ex arbore, non maturorum. Mellis despumati ana lib. ß. sâpæ nostratis ℥ iij. Coquantur leviter semper despumando, donec justam acquirat consistentiam, usui reponatur.

(Nota quod morus apud Græcos sit Rubus apud Latinos)

Diamorum idem quod compositio ex moris significat, teste Mesue. Multi de Diamorone multa scripserunt, sed inter omnes Medicorum descriptiones illa mihi optima videtur, quæ falso Salernitana dicitur. Hæc Mesuei est, ut patet distinctione quinta; Differt illa in quantitate, non in qualitate. Hujus nullam faciunt mentionem Græci, ut patet apud Galenum, libr. 6. de alim. S. locos Paul, Æg. lib. 7. cap. 14. Aeri. lib.

PHARMACEVTICÆ. 41

lib. 8. cap. 43. Trall. lib. 4. Myreps.
sect. 9. Si cum Arabibus illo uti iubet
necessitas admisceto vinum coctum,
vel inspissatum, cum pelvis ab igne sit
remotus, & succi refrigerati fuerint.

Dianucum simplex à Mesue compo-
situm (cujus modum conficiendi Gale-
nus, lib. 6. sec. locos patefecit) sic fit.

℞. Succu Nucum juglandium viri-
dium Iunio mense extracti, lib. 11.

Mellis despumati, lib. 1.

Coquantur in syrupi crassitudi-
nem ad usum.

CAP. III.

De Sapis,

Sapi Ribesarum, Berberes, Om-
phacij, Cerasorum, & Acetosorum,
componuntur secundum sequens do-
cumentum.

℞. Succu, vel Ribesarum, vel Ber-
beris, lib. 11, β. coquito igne lento ad
tertiæ partis consumptionem; cola, &
subsistere permittito, donec clarescat.
Clarum deinde igni clementi perco-
quito ad justam crassitudinem. Ad con-
servandum cōsulo, ut lib. 1. Sacchari albi
addatur, & in syrupum coquatur iu-
cun-

42 INSTITVTIONES

cundiolem & durabiliorem.

Mivam Cydoniorum simplicem & compositam manifestavit Mesues in Antidotario suo distinct, 6.

Simplex ita componitur.

Rx. Succī & vini Cydoniorum lib. x.

Saccari vel mellis lib. III.

Composita verò pulveribus sequentibus aromatizetur.

Rx. Cinamomi electi, Cardamomi ana ʒj. ʒj. Gargophyllorum, Croci, Troch: Gallicæ musc; (quos in serie Trochiscorum apud Cordū, Fuchium, Framb: Bauderoniumq; & infra reperietis) ana ʒij.

Zinsiberis, Mastiches. Zylaloës (quod lignum aloës dicitur) & macis ana ʒ ss grana viii. Moschi ʒ ss. Fiat pulvis sindone ligatus, inter coquendum frequenter exprimendus.

CAP. IV.

De iulapijs in genere.

Iulep vel Iuleb Persicum nomen est, potionem dulcem significans, quam Græci, veluti Actuarii, & Simeon *ζυλάπρον* nominant, quæ syrupum minuscoctum (quæ ex aquis stillatitijs, ut Rosarum violarum & vel decoctionibus

PHARMACEVTICÆ. 43

nibus simplicibus cum saccharo, vel melle ad crassiorem substantiam elixatis componitur) exprimunt, ut aperte patet 6. distinctione Mes. ser. x. & xvii. Gentil. supra v. cap. Avicennæ. Improperie à rudioribus nominatur *digestivum*, quod à Græcis *μεγρόλιον* id est præpotio dicitur. Iulep simplex & non ad syrupi consistentiam coctum est acceptabile, ægrisque gratisimum, sed non diu durabile, præsertim si ex decoctione Iujubarum, similibusque fructibus constet. Nemo vestrum eam præparet, antequam præscribatur à medicis, facile paratur iubente occasione.

Christophori opinio supra sextam Mesuei distinctionem non admittatur, qui iulapia syrupis coctis præponit, quod facile ipsi concederem, nisi certo scirem, illum in hac re insigniter à vero aberrasse.

CAP. V.

De Iulapijs en. specie.

Iulapium Rosarum vel Violarum.

℞ *Aquæ Ros. vel Viol. in alembico vitreo dist. lib. i.*

Saccari albiss. lib. i. coque, utendi tempore.
Etiam

Etiamsi aquæ stillatæ possint (ut vulgus sētit) āno reservari integræ, & cum Saccharo diutius; tamen consulo, ut nō componantur, nisi cum præscribuntur.

Nam cum tēpore facultas refrigerandi minuitur, & ægris ingratiore propinātur. Antequā syrupos attingamus Iulapium Zyzyphorum doct. Mes. hoc ordine, tussī singulare remedium, palato jucundissimum, præscribam.

CAP. VI.

De Iulapio Zyzyphorum.

℞ Iuiubas Numer. xxv.

Aquæ fontanæ lib. i.

Coque ad medias, cum Saccari albi ℥ i. in Iulapium.

Infundantur Iuibæ pingues, recentes, & fractæ, in aqua fontana per noctem, sequenti die ebulliant ad consumptionem tertiæ partis, deinde cola; Colatura saccharo addita clarificetur albumine ovi, & coquatur in formam Iulapii.

SECTIO

S E C T I O I I I .

C A P . I .

De Syrupis in genere.

Syrupus aut simplex, aut compositus
est secundum Mesuen. Simplex Sy-
rupus duobus modis dicitur, aut ratio-
ne compositionis, aut efficaciae.

Qui simplices dicuntur propter com-
positionem, parantur ex succo, mace-
ratione, aut decoctione partium unius
simplicis, tantum admiscendo sacchari
quantitatem sufficientem ad coquen-
dum. Simplex Syrupus ratione effectus
dicitur, qui quamvis ex plurimis
simplicibus concinnatus sit, tamen uni-
us solo destinatus est tantum operi: vel at-
enuat, vel aperit, vel inspissat, vel ca-
refacit, vel refrigerat, & simili cuidam
indicationis scopo operam, opemque
suam dedicat. Syrupus compositus
nuncupatur, ratione diversorum medi-
camentorum ipsum constituentium, si-
ne factus sit ex succis variis simul com-
ministis, & coctis, cum sacchari copia ad
consistentiam, quemadmodum Syru-
pus

pus byzantinus, de Mentha, sive ex solo radicum, corticum, florum, foliorum, fructuum & seminum, plantarumq; decocto, ut syr: de Arthemisia, de Prasio, de Hyssopo.

Quamvis Bauderonius Medicus & Pharmacopæus omnium exercitatisimus cap. proprio *de Syrupis in genere* sect. II. lib. I. dicat: Non adeo necesse esse Phamacopæo Etymologiam iuquirere, quæ spiritus solūmodo recreat, & nihil utilitatis adfert, quam parandi modū benè assequi. Tamen ego vestigijs priscorum insistens illam ad unguem cum Actuario cap. I. lib. V. enucleare tentabo.

Syrapiū igitur ab aliquibus à *Syria* & *Opos* cōpositū esse dicitur, quasi quis dixerit ex liquore Syriæ. Potest esse, quod istius regionis medici eum liquore primi in usu habuerint, eique tale nomē attribuerint. Ego tamen iudicarem (salvā aliorum sententiā) fyrupum ab ipso nomine *σῦρον* quod succus est, & à verbo *σύρω* quod trahō est, nomen assumpsisse. Syrupi sunt, qui ex succo, manu vel prelo expresso, saccharo addito, componuntur, quibus aliqui addunt radi-

PHARMACEVTICÆ. 47

radices, & herbas: alij folia, floresq;
nonnulli.

Cum plantæ multæ non semper præ
manibus sint, sed earum vel folia arue-
rint, vel radices tempore hyemis in
terrâ lateant, vel etiam earum vis post
flores & folia amissa perierit, & ta-
men urgente necessitate expetantur:
de illis aut succi extrahuntur, aut
decocta parantur, mellis aut sacchari
ut utriusque simul quantitate suffici-
ente condita, ut possint in tempus lon-
gissimum viribus integris manentibus
conservari, præcedente multa decoctio-
ne, ut syrupi consistentiam acquirant.
Hæc ratio est, quare syrupi compositi,
utque inventi sint, attest. Renod. lib. 3.
cap. 2. sive pharmaceutices,

Quod syrupi ab Arabibus inventi sint
docet Avicenna lib. v. fen. i. tract. vi.
appellantur *scarab*, vel *scrab*,

CAP. II

De Syrupis simplicibus in specie.

Satis abunde in genere de simplicibus
& cōpositis egi. Iam de specie aliquid
inchoo,

48 INSTITVTIONES

inchoo. Sunt ergo simplices, Syrupus Acetosi, Oxii saccharum, Acetositatis citri, Limonum, Omphacii, Granatorum, & è succo Oxalidis, quæ acetosa est, Oxychantæ, seu Berberes, Rybes, Arantiorum, & Cydoniorum. Qui omnes uno modo sunt componendi, ut infra patebit excepto syrupo acet. simp. qui hoc modo præparatur.

℞. Sacchari albi, lib. II.

Aquæ fontis lib. I.

Coquantur simul in vase benè vitreato, non æneo, (nam ob acrimoniam quandam contraheret æruginem) ad dimidias semper despumando, carbonibus accensis, aut flamma exigua, & sine fumo. Postea adde aceti vini clarissimi lib. I. Si valentius lib. III. deinde percoque in syrupum. Mesues hunc in lexta distinctione habet: differt ab illo, quem Galenus lib. 4. de san. tuenda descripsit, melle solo, nam tempore Galeni saccharum rarum carumque erat, ut idem author docet lib. de med. simp. facultate.

Error Pharmacopæorum, qui loco aceti fortis utuntur distillato, clarificationis causa, quod viscera, & intestinalia corrodit propter acrimoniam. Sa-

tis

PHARMACEVTICÆ. 49

Syrus clarus evadet syrupus, modo accipi-
tur saccharum bene rafinatum & ace-
tum limpidum, teſte experientia. Sic
illis committitur error, qui ſaccha-
rum cum aceto ſolo, & abſq; aqua co-
quant, præcipue cum aqua temperet
aceti acrimoniam.

CAP. III,

OXyſaccharum ſimplex a Nico-
lao Mirepſio conſcriptum ſect
xxxvii, cap. xii, lib. ant.

℞ ſacchari optimi lib. ℞.

Succi mali punici depurati : id eſt granat:

℥ iv.

Aceti vini albi ℥ ij.

Coquantur in olla bene vitreata in
ſyrupum.

baſi ſumitur nomen, nempe ſucco
granatorum, Cæteri Syrupi methodo
ſequenti componendi ſunt.

℞ Succi cujuſque depurati ſolo, & colo laneo
expreſſi, ſed ſponte ſua tranſmiſſi lib. iij.

℞ Sacchari optimi lib. v. Coque in Syrupum.

C

CAP.

CAP. IV.

Compositio è Rosis ficcis,

R. Ros. rubr. sec. lib. i.

Infunde horis xxiv. in aquæ lib. iv. supra cineres calidos. Sequenti die coque, ad tertiæ partis consumptionem: deinde expressum clarificatum, cum sacchari albi lib. ij. coque in syrupum.

Non omittenda est illa descriptio, quæ de rosis laxativis à Mesue describitur: nam illa docet ex utroq; genere rosarum rubrarum & pallidarum infusum facere.

CAP. V,

R. Foliorum rosæ floris rec. lib. vj.

Pone in vase vitreato angustî orificij, affunde aquæ calidæ lib. xv. obtura per octo horas, postea cola, ac deinde aliqualem rosarum copiam impone, cui priorem infusionem calefactam affundes: Obtura similiter, & denuo cola. Hac duplici infusione Mesues contentus fuit, quam Mucham rosarium appellavit: conservatur oleo affuso per

PHARMACEVTICÆ. 51

per integrum annum. Nostri Pharma-
copæi continuant ad infusiones no-
m, & cum sacchari lib. i. s, & infusi-
onis lib. i. in syrupum concoquunt, &
est syrupus optimus. Illud idem sen-
endum est de Melle Ros. cui addas
soco mellis eandem sacchari portio-
nem.

CAP. VI.

Syrupus violatus.

Sunt qui novem habent infusiones,
sed frustra. Efficacioris, qui ex dua-
bus constat, teste Bauderonio.

℞. Fl. *Violarum* ab ung: purg: pist: ℥ i v.
super affunde aquam tepidam, & ma-
nerentur parum, exprimantur tandem
tritoriter, & adde infusioni Sacchari
nam ad justam consistentiam aquâ purâ
octi lib. i. s, qui fervetur usui. Hic
modus est optimus, nam violas coque-
re malum est, ob florum imbecillita-
tem, quorum facultas facile resolu-
bilis, atque volatilis, quia sita in su-
perficie, est.

Illos puniendos dico, qui temere Sy-
rupum hunc more scelestorum adul-
C 2 terant,

terant, radice Iridis florentiæ, quæ violæ odorem fragrantissimum emendatur: ut ex paucioribus infusionibus paratus multiplices redoleat. Hic Syrus non refrigerat, aut humectat satis, sed contrarias plane sortitur facultates.

CAP. VII.

Syr. de pomis simplex.

R. *Succi Pomorum dulc: & acidorum lib. i, s.* Coquantur ad medietatem, deinde biduo residere permittito, donec clarescat, tunc cum Sacchari lib. i s. coletur, & fiat Syrupus secundum artem.

Poma seliguntur non modo fragrantia, sed etiam jucundissimi saporis, quæ ob suavitatem cor recreant, quæ sunt subacida, quæ propter acidulum, & gratum saporem non modo jucundum sumuntur, sed partes ad cordis cecotomiam attinentes exhilarant, putredinem arcent, & melancholicos humores temperant.

Quidam huic succo nondum per refrigerentiam purgato immergunt sericum crudum, Cocco bapico recentitino.

Etum

PHARMACEVTICÆ. 53

rum, donec rubescat, & Cocci & seri-
i facultatem receperit, ut præstantior
t; & alij succum Citri commiscent,
iuxta Mes. sententiam.

CAP. VIII.

Syrupus Buglossi:

℞. Succij ejus herbæ clarificati, &
adhuc calidi lib. ij.

Si vis infunde florum ejus M ij.
Sacchari albi, cum albumine ovi
conquassati lib. i. coque in Syru-
pum.

Si quis Syrupum de pomis habeat,
parere potest Syrupo Buglossato, at-
que Boraginis.

Sequentium Syruporum methodus
est eadem; nam ex succis depuratis
cum Saccharo coctis conficiuntur, ut
sunt

Syr. Intibi Sativi,
E succo Acetosæ,
Abinthij,
Lupulorum,
Nymphææ,
Betonicæ,
Portulacæ.

C 3

Syr.

54 INSTITVTIONES

Syr. Papaverinus excipitur, fit ille ex capitibus in aqua per horas aliquot maceratis.

Debent Herbæ illæ omnes colligi tempore Veris, mense Maij vel circiter antequam humiditas in viscositatem mutata sit, alioquin deberet addi aliquid aquæ, nam tunc succus difficilius exprimeretur. Auct. Bauderonio.

CAP. IX.

De Syrupis Glycyrrizæ & Hyssopi.

Totam Syruporum seriem hic transcribere mihi in consilium videtur, præcipuè cum Cordus, & Weckerus satis latè eos divulgaverint: sed quosdam magistrales adducam, qui illorum vires examinando supplere possunt. Cum dicantur hi compositi latè tractavi Cap. generali de Syrupis,

℞. Glycyrrizæ rasæ & contusæ ℥ j
Adianthi albi, seu Cap. vener. ℥ ss
Hyssopi sicci ℥ ij

Macerentur simul horis xxiv. in aqua pluvialis vel fontanæ lib. ij. coque ad humidias.

Expres-

PHARMACEVTICÆ. 55

expressum clarificatum cum mellis optimi, & despumati, sacchari albi, Penisearum ana. ʒ iij.

Aquæ Rosaceæ ʒ iij. coquatur in Syrum.

Nomen huic syrupo datum est ob Glycyrrhizam, quæ debet addi sub fine decoctionis, deinde colo transmitti. Saccharum, Mel, & Panidiæ cum decoctione simul ebullire, & postea ovi albumine clarificari, & denuo trahi, & ad consistentiam spissitudinem debet coqui. Leuete ab igne deposito adde aquam Rosaceam, & repone.

Si quis hunc syrupum habeat, carere potest de Tussilagine, de Capillis venenis, & similibus.

CAP. X.

Syrupus de Hysopo.

℞. Hysopi mediocriter sicca,

Rad : Apij,

Foeniculi,

Glycyrrizæ ana. ʒ. v.

Adianthi albi, vel Politrichon ʒ iij

Hordei mundi ʒ ij.

Sem : Malvæ,

Cytoneorum.

Tragacanthi ana. ʒ j β

C 4

Zyz

Zyzipharum, id est Iujubarum, Mixarum id est sebestenana n. xv. Passularum ab acinis mundatarum 3 vi.

Ficum pinguium.●

Dactill: ana n. v.

Coquantur ex s. q. aquæ puræ exacte, & in iure percolato, coque sacchari Penediati albi lib. i. & fiat Syrupus.

Aquæ mentio nulla fit, verum hæc facile potest addi, ut in sequentibus syru-
pis monstrabitur.

Hordeum primò per quadrantem horæ, vel ad crepaturam coquatur: deinde Radices incisæ coquantur, postea fructus omnes, mox semina Cy-
toneorum, Malvarum, Gummi Traga-
canthum, lenteo raro inclusa. Postre-
mo Hyssopus sicca mediocriter, & Ca-
pillus Veneris verus, sub fine decoctio-
nis Glycyrriza, quæ ab igne deposita
colantur. Colatura saccharo mixta cla-
rificetur albumine ovi & coletur de-
nuo pro syrupo.

Rationes, quare eo ordine, explica-
bo postmodum. Interea aggredior sy-
rupum de Absinthio.

Syrup-

PHARMACEVTICÆ. 52

CAP. XI.

Syrupus de Absinthio. D.M.

℞. Herb: Absinthij Roman. lib. β

Rosar. Rub. ℥ ij

Nardi Indicæ ℥ iij

Vini albi optimi antiqui,

Succi Cytoneorum ana lib. ij.

Macerentur simul per xxiiii. horas in vase vitreo supra cineres calidos, deinde coquantur ad medias, Colatum clarificatum cum facebari albi, vine Mellis despumati, ut sit jucundius, lib. ij. Coquantur in Syrupum.

Syrupos alios ut de Mentha majore, de Myrthis. D. Fern. de Symphito omnittendos sentio, quorum descriptiones apud Cordum patent.

Vos interea hanc nostram sequamini componendi methodum

CAP. XII.

De Syrupo Bysantino simplici & composito.

℞. Succi Intibi id est Endiviæ domesticæ.

Apij ana lib. ij.

Lupuli,

Buglossæ.

Boraginis ana, lib. j.

Cs

Succi

98 INSTITVTIONES

Succi simul ferveant, & paululo Mellis albi clarificentur, & purgentur, cujus colaturæ adde lib. ij. ꝑ Sacchari, si syrupum simplicem optes: si vero compositum compositurus es, adde succis depuratis sequentia.

CAP. XIII.

℞. Rosar. Rub. ʒ ij
 Glycyrrhizæ rasæ ʒ ꝑ
 Sem: Anisi.
 Foeniculi
 Apij ana ʒ iij
 Spicæ Nardi ʒ ij

Expressis, clarificatis, & aromatizatis Nardo Indica, inijce sacchari albi pondus præscriptum, nempe lib. ij ꝑ, coque in Syrupum. Sub finem, si addideris Aceti vini albi lib. ij. rursus in syrupi crassitudinem coquantur, hic supplebit vicem syrupi acetosi-compositi, ut eo carere possis.

Nominatur *Denarius*, vel *Byzanthinus*. Denarius apud Arabes, diureticus id est ureter^{es} purgans, & non a pecunea ut nonnulli autumant. Dicitur a Byzanthio, sive Constantinopoli, quia ibi valde

PHARMACEVTICÆ. 59

de in usu erat, vel quod prius inventus
Intybi, vel quod Mesues hunc syrupum do-
Saccharino à quodam Constantinopolitano ac-
ceperit.

Modus componendi patet in præscri-
ptis, & studio syrupum Intybinum com-
positum omitto. Incipio à *Syrupo Cicho-*
rij composito D.N. Florent.

CAP. XIV,

℞ Hordei integri à fordibus purgat.

℥ iiij.

Rad : Apij

Fœniculi,

Asperragi ana ℥ ij

Herb. intybi, lati folij, seu Endiviæ
fativæ,

Intybi angusti folij, seu Scariolæ
Cichorij erratici, flores purpureos
gerentis.

Taraxiconis, seu Dentis Leonis
ana M. ij

Cicerbitæ, id est Sonchi Lenis, seu
lactucæ Leporis,

Lactucæ fativæ

Lactucæ sylvestris vulgò Endiviæ

Lichenis, seu Hipaticæ,

Fumariæ,

C 6 . Lupuli,

60 INSTITUTIONES

Lupul. ana. M. j.

Adianthi albi, seu Capilli veneris,
Asplenij, seu scolopendrij, vulgo
Ceterach,

Glycyrrizæ parum contusæ,

Bacchar. Hileacacabi, id est fru-
ctus Alkakengi.

Summ: Cuscutæ ana. ʒ. vi.

Coquantur ut artis est in lib. xij.
aquæ, aut q. l. ad tertiæ partis con-
sumptionem. Colo clarificato dissolve
Sacchari albi lib. vi. quas coque in Sy-
rupum. Addunt nonnulli libris singulis
hujus Syrupi

Rhabarb: elect, ʒ. β

Nardi Indicæ ʒiij.

At duo sufficiunt ad illius facultatem
intendendam, levis, & potens cum
sit. Nonnulli contra mentem Aucto-
ris duplicant Rhabarbarum, alij qua-
druplicant, quod improbo: & utendi
tempore addendum iudico, si necessi-
tas cogat, & Medicus imperet: nam
hic Syrupus ad aperiendum meatus
reclusos & roborandum viscera est ac-
commodatus, non ita ad purgandum.
At hæc vis Rhabarbari purgatrix co-
ctione,

PHARMACEVTICÆ. 61

ctione, & diutina affervatione, abit
in auras.

Ad cuius præparationem Hordeum
primo coquatur per quadrantem ho-
ræ, tum Radices prius à matrice ex-
purgatæ, & lotæ diu coquendæ sunt.
Deinde herbæ; postea semina, & Ce-
terach: sub fine decoctionis adde
Glycyrrhizam; quæ unam alteramve
ebullitionem solummodo permittit:
de decocto expresso, adde saccharum,
clarificatum albumine ovi, & coque
in Syrupum.

De Rhabarbaro inquit Mesues, quod
non debeat coqui, quia levis, & vola-
tilis est: cuius facultas in fumum facile
dissipatur. In petia itaque ligandum,
Syrupo tepido submergendum, ad
usum servandum, sic caliditas pertran-
sit Rhabarbarum, cuius denique Syru-
pus attrahit facultatem, penetratione
quotidiana.

C 7

CAP.

CAP. XV.

Syrupus de Eupatorio D.M.

℞ Eupatorii Mes. vel Græcorum, seu
 Agrimonie nostratis,
 Rad: Intybi, seu
 Endivie Sativæ.
 Foeniculi
 Apij ana $\frac{3}{4}$ ij.

Glycirrhizæ recentis, & contusæ,
 Schenanthi, seu junci odorati, non
 flores.

Summ: Cuscutæ.
 Absinthij vulgaris

Rosar: Rub: an. $\frac{3}{4}$ vi.
 Capill: veneris, seu Politrisci,
 Bedegeris id est Spinæ albæ, vel
 fume Card: benedict: vel Came-
 leon Album Diosc.
 Suchabæ id est Spinæ Arabic. vel
 ejus penuria, spongiam Cyno-
 rhodi.

Florum, aut Rad. Buglossæ,
 Semin: Foeniculi,

Anisi,

PHARMA CEVTICÆ. 63

Anisi, ana 3 v

Rhabarb: optimi,
Mastichis, ana 3 iij
Spicæ Nardi,
Azari,
Fol: Indici ana 3 iij.

Coquantur ex aquæ puræ lib. viij. ad
tertiam partem consumptionem:

Sacchari albi, lib: iij
Succorum Apij,
Endiviæ depuratorum ana lib: ij
Percoque in Syrupum.

Syrupum Eupatorii examinare in-
cipiam, quem hoc loco ratione præpa-
rationis magis, quam usus statui. Vt
Tyrones omnium Syruporum compo-
sitiones ritè addiscant, quia compre-
hendit sub se herbas, multam, medio-
crem, & magnam coctionem sustinen-
tes.

Primo igitur, quæ majorem deco-
ctionem sustinent, injiciantur, deinde
quæ minorem, denique quæ mini-
mam. Quare injicito, ut sequitur. Pri-

Rad.

	Rad. Apij,
	Endiviae,
	Bedeguer, &
	Suchaha imponantur.
Secundò	Sem. Anisi,
	Fœniculi.
Tertiò	Squinantum.
Quartò	Abſinthium, &
	Eupatorium
Quintò	Maſtiche
Sextò	Azarum, & ſpica
Septimò	Cuſcuta,
	Cum flo: Bugloſſæ
Octavò	Capillus veneris.
Tandem	Rhavid: quod Rhabarbarum eſt.

Nota. Ne ebulliat, ſed infundatur, ut à nobis edoctum eſt.

Si quis veſtrum petat, cur hic Syrupus, qui minimam Eupatorii portio- nem in ſe habeat Eupatorius nuncupe- tur?

Pro ſolutione intelligat, quod o- mnia alia ſimplicia alios ingrediuntur Syrupos, & quod hæc Eupatorii quan- titas in hoc ſolo præſcripta ſit.

Brassa-

PHARMACEVTICÆ. 65

Brassavolus pro Eupatorio, Agrimonia præter Dioscoridis rationem statuit, lib: de Syrupo Eupatorij.

CAP. XVII.

Syrupus de Epythimo.

Hujus præparandi si quis modum bene noverit, facile omnes sequentes Syrupos componet.

Hic itaque apud Doctorem Mesuem præscribitur juxta methodum sequentem:

℞ Epythimi boni hortensis, 3xx.
Myrabulanorum Cytrinorum,
Indorum ana 3xv.
Cuscutæ,
Fumiterræ, ana 3x.
Calamenthæ,
Thijmi,
Buglossæ,
Myrab: Emblici,
Bellerici,
Lyquiritiæ,
Polipodij.
Agarici,
Stechados, ana 3vj.

Ros.

66 INSTITVTIONES

Ros: Rubrar:

Sem. Foeniculi

Anisi, ana ℥ij ℥.

Prunorum. n. xx.

Passularum enucleatarū, ℥ iiij

Tamarindorum, ℥ ij ℥.

Sacchari albi lib. iiij

Rob, quod Sapa est, lib. ij

Fiat Syrupus.

Magna est in hoc Syrupo ambiguitas, de ebullitione simplicium, & in qua quantitate aquæ debeant ebulliri.

Sunt, qui dicunt, omnia in Robub coquenda, secundum Mesuem, qui falluntur, nec non multi, qui omnia simplicia in tantam aquæ quantitatem infundunt, quantam satis putant, vel ut aqua simplicibus superemineat per diem unum, postea vero coquunt, & exprimunt, quod Mesuei opinionem oppugnat, qui non dicit, omnia simul infundi debere, sed jubet infundere, primo, quæ maiorem, secundo, quæ minorem, tertio, quæ fere nullam decoctionem patiuntur, ut monstratum est in syrup. præcedentibus.

Quantum ad aquæ quantitatem, sumamus

PHARMACEVTICÆ. 67

namus lib: x. quarum decoctio fiat ad
quantitatem lib: trium, quæ debent in-
gredi hoc modo: Habeant maceratio-
nem, Primò Polipodium, & Agaricus,
deinde Pruna, & Passulæ, Sem: Foe-
niculi, & Anisi parum concussi: hinc
fumus Terræ tufus parum, ut virtus fa-
cilis infusione extrahatur, Buglossa,
Rosa, Cuscuta, cum Epythimo, tunc
Myrabulani sine nucleis, postea Lyqui-
ritia, Tamarindi, Saccharum, & Rob;
coquantur in una parte decoctionis:
cui (postquam omnia benè colata sunt,
atq; ovi albumine clarificata) adde
paulatim residuum decoctionis, &
leno igne coquantur simul in Syru-
um.

Tamarindi parum coquendi: ad sum-
mum per unam alteramve ebullitio-
nem, in vase ex argilla confecto, & non
ex æreo, propter acrimoniam.

Appellatur una ebullitio, cum ebulli-
tio incipit, quousq; simplicia omnia si-
mul sursum, & deorsum semel revol-
vantur.

Dicunt aliqui, lib: xv aquæ esse su-
ficiendas, quod mihi jure meritò admi-
rationem adfert, quandoquidem nul-
lus est, modò limes hujus artis saluta-
verit,

68 INSTITVTIONES

verit, qui ignoret in hac cōpositione esse pauca, quæ multum aquæ imbibere possunt. Ideo multa aqua indiget minime. imo si experiaris octo aquæ libras esse satis deprehendetis.

Notate diligenter, quod si longam facere ebullitionem vultis, herbis infusis, toto coelo erretis: nam vires bona maceratione ab aqua attrahuntur, modo sit tepida, quæ aliter longâ coctione dilabuntur. Ergo à maceratione supra cineres calidos spatio xxiiij horarum exprimuntur omnia simul, quam fortissime. Expressum cum Sapa, & Saccharo, paulatim coquatur in Syrupum.

SECTIO. IIII.

CAP. I.

*De Eclegmatis
seu Loch in genere.*

QUOD Græci ἐκλέγματα & ἐλέγματα Arabes Loch vel Lodoch nominant, id a Latinis Linctus, vel Lambitivum appellatur.

Nomen

PHARMACEVTICÆ. 69

Nomen à lambendo sumitur. Medicina est liquida, majorem Syrupo, minorem conditis consistentiam habens. Inspissata valdè, & viscida, uttamen aptissima ad lambendum, & deglutiendum.

Horum sunt duæ species, quarum prima delectabilis, secunda vero gustui ingrata est, illa conficitur ex speciebus amaris, hæc verò ex dulcibus, semper iere cum melle componuntur: nam mel magis abstergit & aperit, adhæret & malefacit, quam saccharum.

CAP. II.

De Eclegmatis in specie.

Eclegma de Caulibus.

℞ Succi Caulium depurati lib. j.

Sacchari albi

Mellis despumati ana lib. β

Coquantur ad justam consistentiam, deinde adde Croci tenuissimi triti ℥ iij.

Fiat Eclegma. Auctor hujus Eclegmatis est D. Goddonius, ut patet, libr: iij, Praxeos

Praxis suæ, Cap : viij de Asthmatis curatione. A Base, nempe, Caule nomen sortitur : Hoc modo rectè conficitur.

Succus è Caule primò exprimendus est, expressus Sole vel igne depuratur, cum parua mellis portione, cumq; depuratus fuerit, adde Saccharum benè depuratum vel albissimum, & coque simul lento igne in formam debitam, deposito lebetè ab igne, addatur Crocus optime puluerisatus, ut reseruetur.

CAP. III.

Eclegma de Scilla simplici. D. M,

℞ Succi Scyllæ

Mellis despumati ana partes æquales.

Coquantur simul in Eclegmatis crassitudinem,

Æsculapius, ut Galenus refert, Cap. vij de Medicamentis, Secundum locos, hujus Lohoch compositionis auctor est, quam Doctor Mesues exscripsit, & in distinctione proponit. Basis patet ex nomine, Modus conficiendi enucleabitur. Sumantur veræ Scyllæ (vel eius loco Pancratium) Iulio
mense

PHARMACEVTICÆ. 71

menſe collectæ, quum folia illius, & caules exactè exaruerint, cortice adempto, fermento mundo, & maſſa farinacea circumlinitur: poſtea in calido cinere, aut furno uſq; dum farinacea maſſa in cruſtam indureſcat, relinquito: deinde extrahito, & à maſſa farinacea purgato, internas partes teneiores acceptas, eburno cultello, non ſhalybeato ſecato, piſtillo è ligno Guaiaco conſtructo terito, itaq; ſuccum exprimito, ſaccharoq; addito, coquito ſuo Eclegmate.

CAP. IIII.

Eclegma de Pulmone Vulpis.

℞. Pulmonis vulpis ficcati.
Succi Glyzeriſæ,
Adianthi albi, id eſt Capillus veneris.

℥m. Foeniculi

Aniſi ana partes æquales
Conſice cum ſaccharo in aqua Pimlaellæ ſoluto & cocto, vel cum ſucco Myrthino, ut valentius roboret.

Mefues hanc deſcripſit compoſitionem, non in Antidotario, ſed in ſua
Praxi,

Praxi, Cap: de Phthisi, eamque desump-
psit ab Avicenna, ut videre est, tertio
lib: fen: x. Tractatu, v. Cap. vj. Addidi
solum modo sem. Anisi & Rob ex Myr-
tillis. Nec Avicenna, nec Mesues men-
tionem fecerunt aquæ Pimpinellæ, sed
ille Gallorum ferè primus Iacobus Syl-
uius. De Medicamentorum præpara-
tione non multa, nam facilis est. Sed
quomodo pulmo vulpis præparetur do-
cebitur.

PRÆPARATIO.

Sanie & sordibus abjectis, vino odo-
rifero tamdiu eluatur Pulmo, donec vi-
num non amplius inquinetur, sed limpi-
dum maneat. Elotus, & quadrifariam
scissus supra clybanum aut in hypocausto
(non alio in loco) probe exsiccatur.
Et si nulla tunc utendi necessitas fue-
rit, in vitro aliquo stricti orificij siccatu-
(orificio vasis cera accurate clauso) re-
ponatur. Sic etiam Pulmo, sicut flo-
res, recentissimè servabitur, Absinthio
ut à plerisque fit, non involvendus, cum
ingratum inde saporem & odorem
contrahat. Primo Semina & succus
Glycyrrhizæ: secundo Pulmo vulpis in
eneo mortario in pulverem subtilissi-
mum

PHARMACEVTICÆ. 23

num redigantur. Deinde Capillus
Veneris, vel ejus loco Polytrichon,
quod est Adiantum nigrum viride, in
mortario marmoreo pistillo ligneo
pistetur, cui pulveres prædicti admis-
ceantur, qui Syrupo jam cocto ex sach-
charo, & aqua Pimpinellæ, vel Scabio-
re mixti, Lohoch efficiunt.

CAP. V.

Eclegma sanum & expertum D. M.

℞. Uvarum passarum ab arillis pur-
gatarum;

Ficum recens siccatarum.

Dactylorum pinguium ana ℥ ij.

Jujubarum, Sebesten ana N. xxx.

Sem, fœnugræci ℥ v. Lini, Anisi, Fœ-

culi ana ℥ ss. Nonnulli codices, ho-

min trium, habent ℥ ss & non ℥ ss sed
quor codicem antiquum.

Herb: Hyssopi

Cinamomi:

Glycyrrhizæ,

Calaminthes,

Ireos ana ℥ ss

Capill. Veneris M. ss

Coquantur primo in quatuor libris
D aquæ

aquæ ad dimidias, colatum coque cum
 Penidiorum lib. ij. ad mellis, crassitu-
 dinem, tunc adde sequentia pulverisa-
 ta.

R. Pineorum recentium depella-
 torum 3 v.

Amygdalarū à cortice mundat.
 Glycyrrhizæ mundatæ & pul-
 verisatæ,

Gummi Tragacanthi,

Arabici, Amiliana 3 iij.

Rad. Ireos 3 ij. Fiat Eclegma.

Siquis Eclegma hoc recte compo-
 fuerit, absque ulla difficultate reliqua
 parabit.

Ante omnia coquantur Rad. Ireos
 in parres scissæ in lib. iij. aquæ: cumque
 ebullierint adde iis semina præscri-
 pta in panno ligata; post ebullitionem
 fructus omnes ut Passul. Dactyl. Iujub.
 Sebest. &c. postea herb. Hyssopi. Capill.
 Ven. Calaminthæ. Tandem Glycyrr-
 rhizam cum Cinamomo, quæ largam
 decoctionem non tolerant, ideoque so-
 lummodo ferveant. Quod cum factum
 fuerit define evaporare, & adde cola-
 turæ lib. ij. sacch. Penidiati, quæ denuo
 coquantur ad syrupi consistentiam,
 tunc ab igne depositis, & ad bonam
 deco-

PHARMACEVTICÆ. 75

in coctionem coctis, adde nucleos Pi-
lis, crabs, & Amygdalas à pellibus nuda-
as, & benè tritas. Imo ipsum Traga-
mum, & Arabicum Gummi cribro
transmissum, non liquore aliquo ma-
neratum, ut nonnulli volunt. Postea
pulveres Ireos, Glycirrhizæ & Amyli,
sed separatim omnia.

SECTIO V. CAP. I.

De speciebus Aromaticis in genere.

Lacet de pulveribus Aromaticis in
genere hoc loco incipere. Faxit ille
argutatis, bonitatisq; fons, atq; ori-
o, ut ad ipsius honorem, atq; ma-
orem gloriam de iis in specie benè fi-
ciam.

Qui fiunt ex optimis, selectissimisq;
medicamentis plus minusve tritis, pro
medicamenti natura, & exigentia rei
pulveres dicuntur: quos Arabici in tres
species distinctius designant, ut *Alkool*,
qui tenuissimus est: *Suffus*, qui levis est
& crassiusculus: *Sief* qui præparatus
atq; subtilissimè tritus est. Hic in for-
mam Trochiscorum cum aquis stillati-
ijs foeniculi, Ros. plant. vel alijs con-
venientibus malaxetur, & custodiatur.

D 2

Tres

76 INSTITVTIONES

Tres sunt scopi triturationis, quorum primus, ut alijs medicamentis exactè commisceantur, secundus, ut ipsis nova facultas acquiratur, ut Gal. 4. de Sanit. de Azaro, & Rhabarbaro. demonstrat. Medicamenta grosso modo trita ventrem laxant, quæ verò urinam educunt, subtilissimè pulverisanda sunt. Ratio, cur omnia non uno modo in pulverem reduci debeant, est, quod illa quæ ventri respondent, & intestinis, aut quæ ad flatus solvandos parantur, non tantam ferre debent trituram, quantam quæ pro hepate, liene, Renibus, vesica, utero & alijs Opilationibus assignantur. Quæ pro oculis, debent levissimè teri ratione tunicæ adnatæ, & conjunctæ, ut Gal. lib. Secundum locos docet, ut citius in actu sint, quod potestate esse dicuntur, id est, ut celerius vires suas exerant.

Terantur autem parum, quæ raram texturam, & virtutem facile dissipabilem habent, nam multâ tritura exolvuntur, ut flores penè omnes. Dura medicamenta, crassa, solida, nervosa, & fractu contumacia, quæq; malignam qualitatem participant, ut Colocynthis, quæ cum leviter trita sumitur,

et. vid. extracta ad finem

ejus

ius portio crassior, gyris intestino-
um inhærens ea exulcerat, atque dy-
enteriam movet) multam patiuntur
rituram, probante Renodeo lib. 2.
harm. cap. ix. quæ medocri substantia
onstat, ut aromata multa: moderate
erenda sunt, ne tenuior portio, ac ma-
is odorata exhalet, atque dissipetur.
ad electuarium, vel alicujus confe-
tionem sumantur, tunc tenuissime le-
ganda. Radices, & herbæ siccæ non
irides pro electuariis contunduntur,
sed possunt in varios usus, vel siccæ, vel
octæ, vel crudæ teri.

Quæ coquenda mediocriter teren-
a. Major tamen Radicibus quam so-
is debetur tritura, fructibus minor,
eminibus mediocris: medio siquidem
modo inter herbas & radices semina
teri debent.

Plura de trituratione habentur apud
Mes. cap. ultimo Theorematis: Apud
ylvium lib. 2. pharmaceutices cap. de
ritura. Quantum ad dosin sacchari, vel
mellis potest sesqui uncia specierum
b. i. mellis, vel sacchari addi. Quod si
ividatur per uncias: habebitis pro
naquaque sacchari uncia Drachmam
nam specierum.

D 3

Si

78 INSTITVTIONES

Si de amaris agatur, addantur un-
ciæ sacchari scrupuli duo specierum, &
erit conueniens ægris.

C A P. I I.

De speciebus aromaticis in specie.

Pulvis Dianthos Nicolai Salernitani.

℞. Florum Roris marini ʒ i.

Violaria,

Ros. rubrarum,

Glycyrrhizæ, ana ʒ vi.

Cariophyllorum,

Nucis muschata,

Spicæ nardi,

Galangæ,

Cinamomi,

Zinziberis,

Sem. Anethi,

Anisi, ana ʒ iiij.

Sacchari albissimi aquâ Betonicæ so-
luti q. s. concinnetur Elect. ad ta-
bellas.

Triturationis modus.

Primo pistetur lignum aloes, au-
Santalum Citrinum, ejus succidaneum.
quod cum parum fuerit contusum cri-
bretur leviter. Tunc residuo adde ra-
dice

PHARMACEVTICÆ. 79

ices Glycyrrhizæ, cum Cariophyllis,
 & Cinamomo. Tandem semina, Ma-
 is, & Nuces Muscatæ pistentur, id
 quod pertransit cribrum bene cooper-
 tum reservabitur; Residuo adde rosas
 seccas, Anthosficcum, & flores Viola-
 rum. Hæc simul subtilissime pulveri-
 za, quæ cribrata reseruentur usui, in vi-
 tro bene cooperto, ut necessitate po-
 tuitulante formentur in tabellas cum
 saccharo.

Nicolaus Myrepsius est auctor hujus
 descriptionis, ut patet lib. 1. Antidotar.
 cap. 4. Nomen ab Anthos, (quod La-
 tinis flos Roris marini est) sumpsit. Quid
 Anthos proprie sit cap: de conserva
 Anthos late explicavi.

Lignum aloes sit crudum & non co-
 cctum ut monet Avic. canone 2. sui libri,
 cum aliter est corpus sine anima. Plura habet
 Matthæus Sylvaticus in prima sectione
 luminaris majoris cap. de elect. in quo
 ait: Quod submergitur est optimum: quod na-
 te privatum est vita, optima diagnosis resistit
 colore, qui debet esse fuscus, & obscuri colo-
 re; neque non in odore, dum comburitur, si fu-
 um boni reddat odoris, si facit spumam in sa-
 ore, sique amarum sit.

D 4

CAP.

CAP. III.

Diatragachantum.

℞. Penidiarum ʒ j. ꝑ
 Gum. Tragachanthi albi ʒ j.
 Gummi Arabici ʒ v.
 Amyli ʒ ij.
 Sem. Papaveris albi ʒ j. ꝑ
 Sem. 4. frig: majorum inunda-
 torum.
 Glycyrrhizæ rasæ ana. ʒ j.
 Camphoræ ʒ ꝑ

Sacchari aquæ rotati, vel violati sol.
 q. s. Fiat electuarium concinnandum
 in tesseris.

Primo ordine pulverisanda sunt gly-
 cyrrhiza incisa, semen Papaveris: sed
 separatim Amidon, Camphora, & Pe-
 nidia, similiter separatim Gummi Tra-
 gacanthi, & Arabici: hisce ita pulveri-
 fatis, perque cribrum trajectis addi
 debent semina 4. frigida majora à cor-
 ticibus mundata, minutissime scissa,
 quæ dein misceantur ut artis est.

Si quis species has longo tempore
 sine aliqua corruptione servare deside-
 rat, nec sem: 4. frigida, nec semen Pa-
 paveris, speciebus hisce addat, sed tam
 diu

PHARMACEVTICÆ. 31

liu separatim seruet, dum à medico
pharmacopæo imperatum sit: si enim
simul misceantur, trium mensium spa-
tio vix dilapso, rancidus atque ægris
ingratus reperitur.

Si quis sciscitetur de iusto pondere
seminum addendorum, hunc modum à
me infra scriptum sequatur, eumque
facilem, & breuem iudicabit.

Tota descriptio tenet uncias tres, &
seminis pulverum, & grana v. Semina
quatuor, & papaveris ponderant quin-
que drachmas, & semis. Ergo si uncia,
crupuli duo, seminum boni ponderis
addantur, (quod facile fieri potest) ha-
bebis species tempore necessitatis gra-
uissimas.

Auctor Diatragacanthi est Nicolaus
Myrepsius, qui addit hordeum, quod
nos auctoritate Salernitani prætermi-
imus.

C A P. I V.

Dia-Iris simplex.

℞. Ireos florentiæ $\frac{3}{4}$ j.

Pulv. Diatragachanti frig.

Sacchari Cristallini ana. $\frac{3}{4}$ ℞

Fiat pulvis.

D 5

Primp

82 INSTITVTIONES

Primo conterantur radix Ireos, & saccharum candidum separatim: postea ea misceantur pulveres speciei Diatrachacanti frigidi, qui in olla vitrea bene conserventur.

Dico *conterantur*, hoc differt à *tero*, nam *conterere* est dividere aliquid in partes subtilissimas; *terere* vero, in partes grossas. Si quis ergo scripserit, *terantur* vel *conterantur*, debet in superscriptis vel infrascriptis modum hunc servare.

Author compositionis incertus est.

Pro Electuario in Tabellas.

Libra sacchari pro unaquaque uncia pulveris sumenda est: aliquando tamen uncia duæ sacchari pro singulis pulverum drachmis præscribuntur; sicque gratius, sed inefficacius fit. Fernellius octo solummodo uncias ponit, pro omni compositione. Alii verò duas libras, sed ego pro pulveris drachma, sacchari tantum unciam acciperem ad conficiendum electuarium.

CAP.

PHARMACEVTICÆ. 53

CAP. V.

Diamargaritum Frambosarij.

℞. Margaritarum splend.

3 iij,

Trium fantalorum

Ros. rubrarum,

Florum Violarum,

Buglossi,

Nymphaeæ,

Bacch. Myrthæ, ana 3 ij.

Rad. Angelicæ,

Spicæ Nardi,

Cort. Citri mali,

Cinamomi,

Caryophyllorum,

Croci, ana 3 j

Lap: Saphyri,

Hyacinthi,

Smaragdi,

Sardæ,

Granatorum,

Coralli albi, & rubri,,

Succini præp:

Scobis Eboris, vel spodij,

Sem. 4. frigid. majorum mund:

Endiviæ,

Oxalidis, ana 3 ſ

D 6

Serici

84 INSTITVTIONES

Serici crudi
Fol. Auri ana ꝑ j
Ambræ ꝑ f
Camphoræ gr. v.
Moschi gr. ij.

Fiat omnium pulvis.

Hanc formulam compositionis, quæ tam variæ est descriptionis, ut vix quicquam constet de ejus auctore, placuit hoc loco præ oculis ponere, quâ præcipue necessaria breviter recenscam.

Plura simul recipit, quorum species invenire difficile foret, ideo jure meritoq; dicere ausus sum, si quis statuto tempore, ac loco hæc colligat, dein rite præparet atq; misceat (nam in hisce totus cardo rei versatur in arte Pharmaceutica) quod illi & titulus Magistralis, & diploma promotionis exhiberi possint.

Modus præparationis.

Forcipibus Sericum crudum scindatur, ut Serapius docet lib: Simpl: Cap; 29. Non uratur ex sententia Avicennæ: nam urendo vis cardiaca reprimitur, & acquiritur astringentia. Teratur ante omnia sequentia aliquamdiu, cui deinde adde Santala, Nardum forcipibus scissam.

PHARMACEVTICÆ. 85

scissam: Dein Rad: Angelicæ, Corti-
ces Citri.

Cinamomum denique, cum Gario-
phyllis: mox semen Oxalidis, & Endi-
viæ: quæ post contusionem per cribrum
trajiciantur, pulvis transmissus reser-
vetur in vase vitreo, vel Papyro bene
clausa, ne virtus exhaletur, donec om-
nes lapides per se contriti, atque præ-
parati sint. Hoc facto sem: quatuor â
cortice mundata, & in minutissimas
partes cultro conscissa, imponantur
mortario, & parum pistentur, additis
per intervalla pulveribus lapidum pre-
ciosorum, & specierum, atque Foliis
Auri, ad formam pulveris.

Quod in Capite de pulvere Diatra-
gachanti de mixtione Seminum frigi-
dorum dixi, idem de Camphora, Mos-
cho, & Ambra faciendum judico, id est,
ne, antequam â Medico præscribantur,
cum prædictis pulveribus misceantur.

Diamargaritum aliud est frigidum,
aliud calidum, quod raro â Pharmaco-
pæis præparatur.

Dividitur etiam in simplex, & com-
positum.

Simplex est, quod ex solis Marga-
ritis fit, diciturque manus Christi, aut

D. 7

Saccha-

86 INSTITVTIONES

Saccharum Parlatum.

Hoc nostrum de quo egimus, compositum vocatur.

Nomen ab ipsis, (quæ Basis est) Margaritis procedit. Margaritæ eligendæ sunt Orientales, & pellucidæ. Probantur candore, leuitate, seu pondere, rotunditate, & magnitudine.

Quæ ponderosæ, ac crassæ, magisque compositæ, seu conclusæ sunt, præstant quidem, sed propter raritatem, & valorem medicas compositiones vix ingrediuntur, ob multorum Pharinacopæorum avaritiam, qui maiorem rationem lucri sui habent, quam conscientia.

Earum Preparatio.

Purgatæ à sordibus & pelliculis adhærentibus lavantur aqua rosarū, deinde siccatae teruntur in mortariò lapideo, pistillo ligneo, postea exacte pulverisatæ deponantur supra lapidem planum ac marmoreum seu porphyrium, cui pistilli loco apponitur parva mola marmorea, quæ manu mota omnes terendo medicamenti facile aptas facit. Hoc modo cæteri lapides preciosi, Coralla, Succinum, Borax & alij debent levigari,

PHARMACEVTICÆ. 87

levigari, donec nulla digitis inæqualitas percipiatut.

Cum Spodium variè apud authores usurpetur, videndum est, quidnam Nicolaus de eo judicaverit. Non est, inquit ille, Spodium Græcorum, neque Arabum (quod aliqui spodium cannarum vocant) quod accipiendum est, dum neutrum ad ea medicamenta, quæ per os ingeruntur, usurpetur: ideo accipiendum est in hisce specierum compositionibus ebur ustum, facultate astringendi pollens, secundum Plateariorum sententiam. Ejus conficiendi præparandique modus hic à me ponitur.

Præparatio spodii.

℞. Eboris in partes secti lib. j. conficiatur in novum, & non crematum fictile, tegatur operculo, & figulino lutoto oblinatur, ut bene clausa penes se virtutem eboris retineat: deinde imponatur figile furno. Ebur ubi jam crematum fuerit, in tenuissimum pulverem teratur, & cribretur, inque patinam vitream injiciatur, ei affundantur stillaticij rosarum liquoris lib. ij, æque cum ebore pariter exsiccari permittantur: deinde secundo teratur, & stillaticij Ros. liquoris exsiccato ebori denovo lib. j. affundatur, pariter rursum

88 INSTITUTIONES

sum exsicceetur, ultimo teratur in tabula marmorea durissima, deinde fingantur pastilli, qui in denso vase, ne exspirent, reponantur.

Quod si ebore destitutus fueris, vice ejus sume cornu cervinum similiter paratum, ut monstrat Leon. Fuchius lib. ij. de comp. med. fol. 758. cap. de Ebore.

Ebur, ut inquit Platearius, & ejus successores, sunt ossa Elephantis combusta, ut dictum est.

Notandum quod neq; Arabum spodium Cannæ per os ingerendum erit, quamvis Avicenna, varijque Arabes in roborandis corde & Iecore id plurimum commendant, sed de eo noster Coryphæus consulendus lib. simpl. cap. 7.

Si quæ defunt ex medicamentis simplicibus, locum implebitis hisce succedaneis: si desit lignum Aloes sume Santalum citrinum, sed ego malle corrices Citri eligantur, ut docuimus cap. de Anthos. Pro Been albo & rubeo, sumite radices Buglossi, & Boraginis secundum sententiam acutissimi Bauderonij.

CAP.

CAP. VI.

Aromaticum Ros. Gabrielis.

℞. Ros. rubrarum ʒ xv.
 Glycyrrhizæ rasæ ʒ vii.
 Cinamomi opt. ʒ v.
 Ligni Aloes
 Santali Citrini ana. ʒ iiij.
 Gummi Tragachanti
 Arabici ana ʒ ij, ʒ ij.
 Gariophyllorum
 Macis ana. ʒ ij. ʒ
 Nardi ʒ ij.
 Nucis muschatae
 Galangæ
 Cardamomi ana. ʒ j.
 Ambræ cineritiæ ʒ ij.
 Muschi Orient. ʒ j.

Fiat pulvis.

Lignum aloes, & santala in parvas
 partes craffiusculè conscissa primo lo-
 co pulverisentur exquisitissimè, tunc
 adde hisce radices Glycyrrhizæ, & spi-
 ram Nardi forcipibus minutim con-
 cissam: dein Gariophillos, nuces Mu-
 schatae, Cardamomum, & folia Macis:
 tandem Rosas ab unguibus albis pur-
 gatas: postquam triturate, & per cri-
 brum

90 INSTITVTIONES

brum transjecta sunt, ferva tamdiu bene cooperta papyro, quamdiu gummi terantur, quæ debent prius pulverisari in mortario, cum pistillo calido, & postquam parum igne calefacta fuerint, admisceri. De Moscho satis atque Ambra. Aromaticum autem dicitur ab Aromatum quibus constat, fragrantia. Rosarum à rosarum qualitate & quantitate repellentibus. Cognominatur vero à Gabriele, nescio quo, forsitan illius auctore, aut Mesues amico.

C A P. V I I.

Exbilarans Nicolai.

Rx. Fol. Ocimi

Croci

Zedoariæ

Xylobalsami, vel succidanei,

Gariophyllorum,

Cort. Citri mali,

Calangæ,

Maceris,

Nucis muschatae.

Styracis calamitæ ana. ʒ ij β,

Anisi,

Fol. Ros.

Eboris præp:

Thymi,

PHARMACEVTICÆ. 91

Thymi,
Epithymi, an ʒ j.
Camphoræ,
Moschi, Ambræ,
Margaritarum,
Offis è corde Cervi ana. ʒ ʒ,
Argenti ʒ ʒ.

Fiat pulvis.

Præparatio pulveris hujus in tritura præcedentis descriptionis consistit: Offis è corde Cervi comburentur, ut dictum est de Ebore. Levigantur mola versatili supra lapidem porphyreum. Hisce peractis, pulveres in mortario misceantur: sed Camphora, ne adhærescat, impediatur vel oleo Amygdalarum, vel aqua rosarum.

Os è corde Cervi medicina est insignis, reperitur in sinistra parte cordis Cervi, ubi quædam cavitas est, ad quam splen receptaculum habet, & emittit superfluitatem, quæ propriam siccitatem cordis imitatur in osseâ substantia. Os illud est instar cartilaginis, subbruffum sanguine cordis tinctum. Discernitur à cartilagine, quæ in pectore caprarum reperitur, qua utuntur indolenti pharmacopæi: quia non habet carnem, neque ita subruffum, sed album & mollius

mollius est. Limetur prius & pulveri-
 setur cum ligno aloës, radicibus Ze-
 doariæ, Santalis. Argentum scribit au-
 ctor, nobis omnibus satis notum, sed li-
 maturâ sumere suadet Albucasis in fine
 lib. j. legatur Avicenna s. canone de con-
 fectione Hyacinthi, ubi docet liquefieret
 aurum, & argentum. Nomen lætifi-
 cantis habet ab effectu, quod cor lætin-
 cet, & confortet. Falluntur qui Gale-
 no ejus inventionem tribuunt, cum in
 ejus operibus nec nominetur, nec ille
 Muschum, Camphoram, Ambram,
 Margaritas noverit: quæ continentur
 in descriptione auctoris incerti. Duæ
 sunt hujus pulveris confectiões, una
 Rhasis, quæ raro paratur, altera incerti
 authoris, quam ex Nicolao Præposito
 damus, ut præstantiorem. Plura habet
 Manlius in commentariis supra Lumi-
 narium majus sect. prima cap. de læ-
 tificante.

CAP. VIII.

Diarrhodon Abbatis D. Nicol.

℞. Ros. Rub. ℥ β
 Sacchari cristallini ℥ j.
 Sant: albi & rubri ana. ℥ ij.
 Gummi

PHARMACEVTICÆ. 93

Gummi Arabici,
Tracaganthi,
Spodii ana. ʒ ij.
Azari,
Spicæ Nardi,
Mastiches,
Cardamomi,
Crocī,
Xylō aloes,
Gariophyllorum,
Cinamomi,
Galliæ Moschatæ. sunt
Troch: de quibus cap. de Tro-
chiscis latè scripsi.
Succi Glycirrizæ
Sem. fœniculi, Anisi
Ocimi, id est, Basiliconis,
Oxiacanthæ: id est Barberum,
Sem. frigid. majorum,
Scar o'æ, Portulacæ
Papaveris albi ana. ʒ j.
Offis è corde Cervi,
Margaritarum ʒ ss
Moschi gr. iij.
Camphoræ gr. ij.

Fiat, ut artis est, pulvis.

Modus præparationis satis clarè in
llatis capitulis monstratur. Ideo hoc
num hic norandum, quod gummi pul-
verisari

94 INSTITVTIONES

verifari debent in mortario, pistillo ca-
 lido separatim, ut etiam Spodium, &
 Mastich: sed cū gutta aquæ ros. vel Bo-
 raginis, etiam Trochisci, Galliæ mo-
 schatæ, Rhabarbarū, saccharum candi,
 Camphora muscus, & c. Perlæ sub lapi-
 de porphyrio cum mola parva, ut de
 spodio docuimus, terendæ sunt. *Varia*
 hujus est descriptio, multosque casti-
 gatores habuit. Nicol. Myrepsius hanc
 formulam lib. de antid. fol. 34 tradidit
 quam Cronenburgius sequitur lib. 1. de
 comp: med. fol. 190. Renodeus lib. iij.
 sect. 1. de pulveribus cardiacis cap. viij.
 Frambosarius fol. 1044. lib. de Comp.
 med. Bauderonius lib. 1. sect. iij. fol.
 192. Auctor fuit Abbas alicujus collegij.
 Semina quatuor frigida ut supra nota-
 vimus, quia brevi tempore rancescunt,
 aptius utendi tempore commiscebun-
 tur. Bauderonius & Fuchsius pro Rha-
 pontico utuntur Rhabarbari fecibus,
 quæ ab infusione relinquuntur. Ratio-
 nes sunt datæ: quia non requiritur vis
 purgatoria, sed confortatoria, ideo hoc
 substituendū sentiunt, præcipue cum
 Rhabarbarum laxativum sit. Quamvis
 illi ita statuunt, tamen ego pace illo-
 rum Ravedsennum caperem non ex-
 tractum,

PHARMACEVTICÆ. 95

tractū, quod in tali quantitate, & in tanta medicamentorum serie seu multitudine vires catharticas dilatare nequit.

CAP. V.

Dia Trium Santalorum.

℞. Trium santalorum ut { Sunt Rubrum
Ros. rub. Citrinum
Album.

Fl. violarum ana ʒ iij.

Rhabarb. opt.

Spodij,

Glycyrrhizæ ana ʒ ij

Gummi Arabici,

Tracaganthi,

Melonum,

Citrulli,

Cucumeris,

Cucurbitæ,

Portulacæ ana ʒ iiij

Camphoræ ʒ ss. Fiat pulvis.

Santala primo pulverisentur, tum Rosæ, Sem. Intibi, Portulacæ, Violæ cum Rhabarbaro & Glycyrrhizâ: Spodium, Gummi, Camphora separatim, quæ simul in mortario post bonam triturationem misceantur, usuique reponantur. De seminibus quat. supra satis copiose.

96 INSTITVTIONES

piose. Optime solvitur camphora oleo
Amygd. vel aqua rosar; ut antea. Nom
impertitum est à trium fant. genere, u
asserit Salernitauus. Santalaa dvehun
tur ex India Orientali, & Occidentali
Camphora omittitur à Rondel. Fuch
sio, qui ejus loco flor. Nenupharis sta
tuunt.

C A P. X.

Diaspermatos, sive de seminibus.

℞. Milij Solis

Succ. Glycyrrhizæ ana. ʒ iij.

Sem. 4. frig. majorum & mino
rum quæ sunt

*Lactucæ, Portulacæ, Endiviæ, Sca
riolæ.*

Seminis Asparagi,

Pimpinellæ,

Ocimi,

Petroselinii,

Granorum Halikakabi

Cinamomi, Macis ana. ʒ j.

Fiat omnium pulvis.

Pulverisentur simul Cinamomum,
Macis Semina, Milij solis; Petros:
Ocimi, Pimpinellæ &c. exceptis semi
nibus majoribus, à corticibus mundatis,
& Gly-

PHARMACEVTICÆ. 97

& Glycyrrhiza, quæ omnia simul mixta reseruentur usui. Nomen à feminibus sumpsit, Auctor est Fernelius.

Modus præparandi sanguinem Hirci.

Hircus primum quadrimus, aut paulo senior, vel junior seligendus, & jugulandus est; sanguis medius effluens olla fictili excipiendus, nam qui primus fluit, tenuior, qui ultimus, crassior esse solet: Tum linteo raro tectus soli exponendus, coagulatus teratur, quod ichorolum est, abjiciatur, conservetur in vase vitreo. Poterit Hircus hic longo tempore herbas Pimpinellæ, Saxifragiæ, & Apij comedere, iisque nutriri. Sunt qui sanguinem arteriosum colligunt: quod quidem non malum, tamen parum prodest: nam ita nutritus habebit facultatem efficacem satis ad calculos expellendos. Eadem est præparatio de sanguine leporis.

SECTIO VI.

CAP. I.

De Electuariis in genere.

Satis abunde de speciebus, vel pulveribus. Iam recto ordine Electuaria
E purgan-

98 INSTITVTIONES

purgantia absolvam. Electuaria dicuntur, quia ex multis variisque medicamentis selectissimis conficiuntur. Hæc autem multum inter sese differunt: nam quædam dulcia sunt, ut Diacassia, Lenitivum, Dia-Carthamum: alia amara, ut Hiera Pycra, Hiera Dia-Colocynthidos: alia acetosa, ut Diaprunum, Dia-Tamarindum, & quod ex Dactylis aceto maceratis componitur. Sunt hæc vel solida, vel liquida; solida, Diacarthamum, El. de succo rosæ: de quibus in præsentiarum agetur.

C A P. I I.

Elect. de Succo Rosæ.

℞. Succo Ros. Rubr. depurati,
Sacchari albißimi ana lib. i. \mathfrak{z} iv.
Diagridii \mathfrak{z} j. β .
Trium Santalorum \mathfrak{z} vi.
Spodij \mathfrak{z} iij.
Camphoræ, \mathfrak{z} j.

Fiat El: per tabellas, ut artis est.

Hæc omnia separatim præter Santala, quæ simul contundi possunt, terantur. Tunc saccharo cum succo rosarum ad consistentiam Electuarij lento igne cocto

PHARMACEVTICÆ. 99

cocto, excipiantur, & fiant tabellæ.
 Quaderem Diacridium sub fine infundi,
 ne grumescat ratione caloris nimij.
 Hoc autem sustinet apud Mes: medio-
 rem coctionem, & trituram. Hoc
 lectuarius est duplex, unum solidum,
 aliud liquidum à Mesue compositum,
 quod haberi debet ab ijs qui uti volunt
 pillulis Aggregativis, & Hermoda-
 tylis.

Auctor est Nicolaus Alexandrinus.
 Dicam aliquid de Scammonio. Quid
 sit, & quomodo extrahitur videndum
 apud Lobelium, Dioscoridem, & Do-
 monæum. Præstantissimum autem illud
 est, quod ex incisa radice superna ex-
 trat, & maxime quod ex Antiochia
 refertur: dein Armenium, Europæum,
 sed nigrum omnium pessimum. Vt ve-
 ro sit optimū, debet esse nitidum, splen-
 didum, clarum, Gummi modo subal-
 bum, rarum, fungosum tenuissimis fi-
 brillis, spongiosum, cito liquefscens, te-
 nerum, friabile, non valde pondero-
 sum, nec odoris tetri, licet non suavis,
 sed proprij, & taurino glutini similli-
 mum. Ab his notis quod longe recedit,
 pessimum.

Castigatur apud Mesuem lib. 2. simpl.

E

2

cap. 1.

100 INSTITVTIONES

cap. i. In malo Cydoneo excavato, clibano decoquitur, pasta undique circumlita, præsertim additis quibusdam seminibus, ut Apij, Fœniculi, Dauci. Vfitatior tamen correctio fit ex solo Cydoneo, vel succo rosarum. Iam correctum & bene castigatum Scammoneum, Diacridium, quasi lacrymula dicitur, & in officina corrupto vocabulo *Diagridium* nuncupatur.

CAP. III.

Diacharthamum Auct. de villa nova.

℞. Sacchari albi ℥ x.
 Sacchari Crystallini
 Mellis rosati,
 Carnis cydoniorum ana ℥ j.
 Turpethi gummosi ℥ vj.
 Medullæ Sem : Charthami,
 Hermodactyllorum,
 Diatracaganthi frig. ana ℥ iiij.
 Diacridij ℥ iiij.
 Mannæ,
 Zinziberis albi, ana ℥ ij.
 Fiat El: per tabellas.

Primo medullæ Charthami scalpel-
 lo minuuntur, eo modo, quo sem. 4.
 frig.

PHARMACEVTICÆ. 101

frig. passim in officinis teruntur, ut docui, nec pistillo quassentur, ne exudet, oliosa intus latens substantia, quæ facile corrigitur Tutpetho. Zinziber, Hermodactyli, si per interval- la addantur, eandem efficaciam eos adferre, nobis à priscis clare edoctum est.

Scammonium, correctum per se (quod frequenter præceptum) frica- tur: Manna melle Rosaceo dissolu- ta, per cribum trajicitur; Diatracagan- tho recenter comparato additur. Mis- ceantur omnia simul, excepto scam- monio, quod sub fine addi debet, ut mixidiximus. Saccharo aquâ Foeniculi so- luto, & ad justam consistentiam cocto, excipe omnia, & fiant tabellæ. Potest hæc compositio tam in formâ solida, quam liquida parari. A semine Char- thami nomen accepit, quod Græci Kni- cum, Arabes Kartam, & multi Crocum Sarafenicum nominant.

Auctor est Arnoldus de villa nova, qui tempore Erasmi Roterodami, Martini Lutheri, & Petri Aponinsis vixit, anno Salvatoris nostri 1520, ut ille testatur tract. 2. Summa 2. di- stinctione 1. Cap. 17 de Hemitritea.

E 3

Nota.

102 INSTITVTIONES

Nota. Ut vero Turbith ventrem turbare definat, eum corrige, & infunde lacti recenter mulso; deinde Turbith iterum benè exsiccatum in medicamentum recipe.

S E C T I O V I I.

De Electuarijs liquidis.

CAP. I.

El. Diacatholicum D.N. ex Baud.

℞. Radicum Polipodij quercini,
Fol. Senæ mund. ana ℥ iiij.
Rhāba: electi ℥ iiij.
Pulpæ Cassiæ fistulæ,
Tamarindorum ana ℥ ij.
Fl. Violarum, Anethi ana ℥ j.
Sem. foeniculi ℥ vj.
Cinamomi, Glycyrrhizæ,
Pinidiorum,
Sacchari candefacti,
Sem. 4. frigid. majorum mundat: ana ℥ ij, cum Sacchari albi lib. ij. Fiat Elect.

Primum Polipodium quernum contusum

PHARMACEVTICÆ. 103

usum cum semine Foeniculi coque in
lib. iij aquæ ad medietatis consum-
ptionem, & cola; in duabus partibus co-
laturæ coque Saccharum ad Syrupi
crassitiem: pulpæ Cassiæ Tamarindo-
rum humectentur ex alia colaturæ par-
te, ut citius cribrum transeant. Tunc
cum Syrupo, facto tepido, misceantur:
hisce benè mixtis adde cribratos pul-
veres: & fiat Electuarium.

CAP. II.

Diaprunum Solutivum.

℞. Pruna Damascena dulcia ac
matura, aqua sufficienti deco-
quenda ad pulpæ lib. i. extra-
hendam,

Pulpæ Tamarindorum,
Medullæ Cassiæ fistul. ana ʒj.
Violarum ʒvj.

Pulverisanda sequentia sunt.

Rhabarbari,
Santali albi & rubri,
Spodij præparati ana ʒiij,
Rosarum rubrarum,
Sem. Portulacæ,
Intibi, Oxyacanthæ,
Succi Glycyrrhizæ,

E 4

Gummī

64 INSTITVTIONES

Gummi Tracaganthi ana ℥ ij.

Sem. 4. maj. frig. mund. ana ℥ j.

Semina per se secundum nostrum institutum præparanda, cum Sacchari albi lib. ij. Fiat Electuarium. Vbi impense Solutivum reddere volueris, adde Scammonij præparati (quod jam Diacridium est) ℥ is in singulas libras.

Ponantur pruna in vase stanneo, & tantillo aquæ bene cooperta coquantur cum ebullitione coctionis, donec dissolvantur, tunc ab igne deponantur: Quando jam frigere incipiunt, ab aqua eximantur, ac per cribrum fricetur, donec nihil præter interiores lapides, ut vocant, & cortices in eo remaneant. In aqua autem illa, in qua decocta fuerint pruna, ponantur flores Violarum, quiparum fervescent: mox expressis violis, applicetur Saccharum, & coquatur in Syrupi consistentiam. Ab igne deposito dissolvitur pulpa Prunorum, Cassiæ, Tamarindorum. Vbi jam bonam acquisiverint substantiam, sive crassitiam, adduntur dicti pulveres, postea Scammonium, & servantur ad usum.

Dux sunt hujus compositionis species.

NES
PARMACEVTICÆ. 105
cies, nempe simplex, & composita.
Simplex illa est, quæ Diacrydium non
recipit: Composita, quæ purgationis
causa scammonium admittit, teste
Bauderonio. Ejus auctor est Nicolaus
Myrepsius. Nomen datum à prunis, quæ
basis sunt. Nicolaus Alexandrinus Da-
mascenam hanc appellavit.

CAP. III.

Electuarium Diaphœnicum.

Descriptio ejus ex lib. iij. Mesues de Anti-
dotis.

℞. Dactylorum Fulvorum, aceto
per triduum maceratorum
℥. C. vel ℥ xij ss.

Pinidiorum hordeatorum. 3. L.

Amygdalarum. 3. xxx.

Turbith: 3. xxxv.

Scammonij, 3. xij.

Gingiberis,

Piperis longi,

Foliorum Rutæ siccorum,

Cinamomi,

Macis,

Ligni Aloës,

Sem. Anisi,

E 5

Foeni-

Foeniculi,

Dauci Cretici,

Galangæ, ana ʒ ij ſs.

Tere omnia probè. Melle despumato ſufficienti excipe.

Præparatio.

Per triduum macerentur Daſtyli ab offibus, & lanugine illa intrinſeca mundati, qui quo ſicciores ſunt, eo diutius macerandi. Poſtquam bene humectati fuerint, ſuperflua Aceti quantitas exprimatur, donec omnino emollefcent: tunc per incerniculum cochleari ligneo colentur, ac manu ſubigantur: quibus Pinidias ex optimo Saccharo elaboratas, & hordeacea aquâ humectatas, & parum liquefactas admisce. Deinde Amygdalas excorticatas, ſcalpro ſutorio, minutiffimè conciſas: poſtremo ſpecies: ſed Scammonium per ſe tritum ſit: Quæ omnia melle despumato excipiantur.

Cronenburgius lib. duas mellis: Framboſarius lib. unam, ʒ xij: at Cordus triplum mellis, hoc eſt, lib. i. ʒ iiij. ʒ vj. ſtatuenda putant. Eſt proſecto hæc diſcrepantia aliquo modo exorbitans, attamen non ita, quin Bouderonij docu-

PHARMACEVTICÆ. 107

documentis facile concilietur, qui ad libras singulas pulpæ Dactylorum, Pinidiarum, Amygdalarum, & mellis depumati, ℥ iij pulveris admiscet.

Diaphœnicum à palmulis, quas hodie vocant officinæ Dactylos, nominatur. Nam *poivis* testante Dioscoride, libro primo. cap: 125 à Græcis palmula dicitur, velejus fructus. A Iuberto improprie Diaturbith nominatur, tamen ratione differentię nos Diaphœnicum nominabimus.

Basis purgativa est Turbith potissimum, deinde Scammonium, seu Diarridium. Datur ab aureis tribus ad sextem. Ita Mesues, ex quo cæteri depumserunt, huius compositionis Auctor.

CAP. IV.

Confectio Hamech.

℞. Myrabulanorum Citrinorum

℥ iv.

Chebularum,

Nigrarum seu Indarum,

Rhabarbari boni,

Epithymi ana ℥ ij.

Agarici,

Colocyntidis in panno ligati,

E 6

Poli-

Polipodij querni recentis ana

3 xviii.

Absinthij,

Thymi,

Senæ ana 3 vj.

Violarum recentium 3 j β.

Aut (si defint) Sacch. Viola-
ti duplum.

Sem. Anisi,

Foeniculi,

Ros. Rubr. ana 3 vj.

Pruna n. sexaginta.

Passul. enucleatarum, 3 vj.

Succi Fuinariæ lib. i.

Omnia infunde in f. q. feri lactis, in vase vitreato angustioris bene obturato, per quinque dies: sic tamen ut primo die infusioni credantur, quæ diuturniorem coctionem sustinent. Ut Polipodium: secundo Myrabolani, Pruna, Passulæ, & Colocynthis: tertio Absinthium, Agaricus, Sena, Thymus, Anisum & Foeniculum: quarto Rhabarbarum: quinto denique flores Rosarum, Violarum, Epithymum. Eo ordine præmacerata simul coqui possunt. Vnica ebullitione tantum facta, colantur, in cuius colatura dissolvantur

Pulpæ Cassiæ 3 iiij.

Tama-

PHARMACEVTICÆ. 109

Tamarindorum ℥ v.

Mannæ ℥ ij.

Sacchari boni albi lib. j β.

Coquantur cum residuo ad justam mellis consistentiam: tunc adde syrupo sequentes pulveres optime pulverisatos, ab igne lebeti deposito, factoq; tepido.

℞. Scamonii ℥ j β.

Quinque Myrab: generum, ut

Cytrinorum,

Chebulorum,

Indorum,

Bellericorum,

Emblicorum ana ℥ β.

Rhabarbari,

Sem. Fumariæ ana ℥ iij.

Spicæ Nardi,

Anisi, ana ℥ ij.

Confice secundum artem.

Auctor est Hamech Arabs, qui à Me- sue in scriptis suis Zachariæ filius nuncupatur, atque filius Zesar. Parens ejus fuit Rhafis, qui Regi Persarum medicos libros conservavit: sed Bauderonius Hamech putat esse filium Heli, qui Rex fuit Damæ civitatis celeberrimæ olim in Syria. Possunt diligentiores recreationis

E 7

tionis

IIIO INSTITVTIONES

tionis ergo, hanc rem ulterius inquire-
re. Ego ad alia transeo.

C A P. V.

Benedicta laxativa.

℞. Turpethi electi,
Sacchari ana ʒ x.
Hermodactylorum,
Scammonij præparati,
Ros. Rubrarum ana ʒ v.
Salis gemmæ,
Cariophyllorum,
Zinziberis,
Macropiperis,
Macis,
Spicæ Nardi,
Galangæ,
Crocī,
Sem. Apij,
Fœniculi,
Asperagi,
Rusci,
Carvi,
Saxifragi,
Lythosparmi,
Amomi,
Cardamomi ana ʒ j.
Cum mellis despumati lib. i. ʒ.

Fiat Electuarium.

Pulvis

PHARMACEVTICÆ. III

Pulvis ficcus in vase vitreo diligenter obturato, seruetur, citra mellis admixtionem, ad usus necessarios.

Terenda sunt ordine primo Turbith, Hermodactyli, Zinziber, Nardus Indica, forfice minutim concisa, & Galanga. Hisce ex dimidio tritis adde Semen, Caryophyllos, & Piper. Tandem saccharas, postea Macem, Sal gemmæ persæ. Sic Diagridium, & Crocus cum saccharo, quæ omnia in mortario misceantur, & melle despumato simul excipiantur pro Elect.

Nomen Bened. lax. fortitum est, quia benignè laxat. Aliqui Esulam adhibent, sed non ex Nicolai Alexandrini auctoritate, ideo eam prætermittimus.

Turbith, Hermodactyli, & Scammonium leviori pistillo debent teri, ob maiorem purgationem, sed alia subtilissimè, ut magis penetrent. De præparationibus satis.

C A P. VI.

Elect. Lenitivum.

℞. Passularum enucleat. \mathfrak{z} ij.
Herb. Adianthi nigri,

Herb.

INSTITVTIONES

Herb: Violariæ,
 Hordei mundati ana M. j.
 Iujubarum,
 Sebesten ana n. xx.
 Glycyrrhizæ ℥ ss.
 Prunorum enucleatorum,
 Tamarindorum ana ℥ vj.
 Fol. Senæ,
 Polipodij, ana ℥ ij.
 Mercurialis M. j ss.

Decoquantur secundum artem in f.
 q. aquæ puræ, cola, dissolve colaturæ
 Pulpæ Cassiæ,
 Pulpæ Prunorum,
 Pulpæ Tamarindorum,
 Sacchari optimi,
 Sacchari violati ana ℥ vj.
 Pulveris Senæ ℥ iij ss.

Fiat Electuarium.

Etsi dubium sit de auctore hujus
 compositionis, plerique tamen eam Ni-
 colao Alexandrino adscribunt; sed ego
 Cordo consecravi. Modus præparatio-
 nis talis est. Hordeum ex duabus bulliat
 aquæ libris, ad dimidias; tunc addan-
 tur Rad. Polipodij, Passulæ exossatæ,
 nec non Iujubæ, & Sebesten, cum Pru-
 nis enucleatis: tandem Adiantum,
 cum Violis, & Mercuriali, sub fine Ta-
 marindi.

PHARMACEVTICÆ. 113

marindi, & folia Senæ. Hisce ab igne remotis adde Glyzyrrizā, quæ quidem infusionem sed minime coctionem tolerat. Cola: in parte una colaturæ Cassiæ, Pruna, & Tamarindi madefiant, ut facilius per cribrum transeant. Coque residuum decoctionis, cum præscripto saccharo ad mellis consistentiam, & adde huic Pulpas, foliaque Senæ pulverisata, & fiat Elect: usui reponendum.

C A P. V I I I.

Hiera simplex Galeni.

℞. Aloes purissimæ non lotæ, ʒ C.
seu ʒ xij β.

Cinamomi,

Spicæ Nardi,

Croci,

Rad. Azari,

Xylo-Balsami. Fernelius ejus loco statuit folia Macis.

Mastiches ana ʒ vj.

Mellis despumati lib. iiij. ʒ iiij.

Fiat Electuarium.

Simul terenda sunt lignum Aloes, Spica Nardi, Rad. Azari, & Cinamomum. Per se Aloes, Crocus & Mastiche, quæ simul misceantur: postea melle

114 INSTITVTIONES

le despumato excipiantur, vel pyxide custodiantur usui. Galenus lib. 6. methodi hanc Hieræ descriptionem habet.

Græci compositiones purgatorias, Hieras, hoc est sacras, nominabant: sic etiam antiqui, & addidere pycram, quod amarū significat, propter aloem, à qua basin & purgatricem vim habet.

C A P. V I I I.

Hiera Diacolocyntidos.

℞. Colocyntidos,
 Agarici levis & albi,
 Marubij,
 Camedrios,
 Stæchados Arabicæ ana ʒ x.
 Oppoponacis,
 Sagapeni,
 Aristologiæ rotundæ,
 Sem. Petroselini,
 Piperis albi ana ʒ v.
 Cinamomi,
 Spicæ Nardi,
 Polij,
 Croci, Myrrhæ ana ʒ ij.
 Mellis despumati q. s.
 Fiat Electuarium.
 Oppo

PHARMACEVTICÆ. 115

Oppoponax, Sagapenum, & Myrrha, primo in vino malvatico, vel hydromellite liquefiant, & tunc per lintheum exprimantur, & coquantur ad consistentiam mellis: iis adde mel depumatum, pulveres per ordinem tritos, & ferva usui. Scribonius Largus cap. 97. libri sui de comp: med. inquit: Pacchium hanc Hieram felicissimo successu agris exhibuisse, & pro secretorum secreto usque ad obitum sibi reservasse. Eo mortuo delata est juxta formulam descriptam ad Tyberium Cæsarem, à quo habuit Scribonius. Hanc Hieram Oribasius lib. 3. Synopses tribuit Ruffo. Paulus Egin. lib. 7. cap. 8. Archigeni: cui consentit Aëtius cap. 114. text. 10. serm. 10.

SECTIO VIII.

De Opiatis.

CAP. I.

De Opiatis in genere.

Opiata Electuaria sunt liquida. Nomen vel ab ipso Opio, vel ejus colore sortiuntur. Licet angustiori significato

116 INSTITVTIONES

ficatu Opiata tantum dicantur à veteribus medicamenta, quæ Opium admittunt, cuiuscunque sint consistentiæ, vel solida, ut pillulæ de Cynoglossa: vel mollia, ut Philonium Romanum: jam tamen latius pro quibusvis confectionibus molliusculis usurpantur, siue cardiacæ alterantes purgantesque & narcoticæ sint: etiam si Opium admittant, ut Theriaca: siue cardiacis, & alterantibus consent, ut conf. Alkermes, de Hyacintho: siue purgantibus, ut Triphera, Diaprunum, & similia, quæ tamen frequentius Electuvariorum, & confectionum nomine designantur. Quærat fortasse curiosus aliquis, cur inventa? Responso in promptu est (ut Galenus testatur cap. 2. lib. 2. de locis affectis, *SÆlius* cap. 12. lib. 2 de signis & causis morbi diuturnorum) ad sævitiam dolorum leniendam. Ante sextum mensem non sunt sumenda ex Opio Opiata composita, teste Avicenna, fen. 4. cap. 30. Gal. 3. simpl. cap. 18. & 19. ob fermentationem. Vt Eva ex costa Adami formata est, ita Theriacam ex Mithridatii compositione ab Andromacho compositam esse traditur, idemque affirmat antiquitas. Variæ apud Galenum

PHARMACEVTICÆ. 117

num libro primo de Antidotis inveniuntur descriptiones hujus Mithridatij, quarum una Andromacho; Antiopatri, & Cleopatris altera; Damocrati tertia Iambico carmine decantata adscribitur. Theriaca similiter triplex est, sed consulo (salvo aliorum judicio) ne familiam Theriacæ confectionem, quam ab Andromacho heroico carmine (ut facilius memoriæ inhæreret) descriptam, à filio ejus oratione soluta explicatam, ab Avicenna etiam dicto loco retentam, sequamini.

CAP. II.

Mithridatium ex Damocratis Græco carmine in Latinam linguam translatum, & à Marantha correctum.

℞ Myrrhæ Arabicæ troglodytidis,
Crocī ex Anglia optimi,
Agarici albi levis & friabilis,
Zinziberis albi, non corrofi,
Cinamomi, cujus loco interjoris
cortices canellæ,
Spicæ nardi, sit levis, & larga,
gerens comam, colore flavo,
odorata,

Thuris

Thuris clari albi, levis, lenis,
 rotundi, granis concreti,
 Thlaspios Cappadociæ,
 Umbelliferæ ana 3 x.
 Siseleos Massiliensis,
 Opobalsami Indici,
 Scœnanti,
 Stæchados Arabicæ,
 Therebinthinæ,
 Galbani,
 Costi,
 Piperis longi,
 Castorij Pontici,
 Succi Hypocistidos,
 Styracis pinguis, flavi, resinosi,
 albicantibus granis,
 Oppopanacis,
 Folij Malobatri ana 3 viij.
 Cassiæ nigræ, cuius loco, Canel-
 læ crassioris.
 Polij montani,
 Piperis albi,
 Scordij,
 Dauci Cretici,
 Carpobalsami, cuius loco Cu-
 bebæ,
 Troch: Cypheos, Vide Tracta-
 tum de Trochiscis,
 Bdellij ana 3 vij,

Nardi

PHARMACEVTICÆ. 119

Nardi Celticæ,
 Gummi Arabici,
 Petroselini Macedonici,
 Opij Meconij,
 Cardamomi minoris,
 Sem. Foeniculi,
 Gentianæ, sunt radices,
 Florum Rosarum Rub.
 Diptamni Cretici ana ʒ v.
 Sem: Anisi,
 Rad: Azari,
 Succu Glycyrrhizæ,
 Acori,
 Phu, seu Valerianæ majoris,
 Sagapeni ana ʒ iij,
 Meu Athamantici,
 Acaciæ,
 Ventris Scinci veri,
 Fructus Hyperici, ana ʒ ij ʒ.
 Vini, quantum sufficit, succis
 & liquoribus dissolvendis.
 Mellis optimi albi, & despumato
 ti lib. ix. ʒ iij.

Mithridates horum medicaminum
 virtutes excogitavit fere ante bis mille
 annos. Qui cum devictus in Ponto erat,
 a Pompejo Magno ducitur, ut
 hoc medici spolio triumphum augeret.
 Qui ubi illud intellexit, statim venenum
 hau-

haufit, & plus etiam, quam satis effer, ebibit, non tamen mori potuit. (nihil enim regibus magis inhonestum videbatur, quam in triumphum rapi) Filias vero ipsius, quæ cum patre vitam finire prorsus decreverant, atque ideo ex eodem quoque veneno hauserant, celesiter occubuisse, tradunt. Mithridates igitur, qui mori tardaret, eo quod Antidotus, quam præsumpserat, venenum redderet irritum, unum ex amicis, nomine Bistocum, cui mandavit, ut se jugularet, vocavit. Is autem opus veneri ferro absolvens Mithridatem violenta morte confecit, ut aperte Plinius recenset lib. 23. nat. Hist. cap. 9. Vnde quam præstans sit contra omne venenum hoc antidotum, si Galeno fidentum, invenietis, illud contra omnes venenosorum animalium morsus, statim sumentibus singulare esse remedium: quod hisce carminibus testatus est Andromachus:

At qui calcati morsu serpentis anhelat,

Ignarusve doli toxica nigra bibit:

Et cum mane novum, Et cum se sol abdidit
undis,

Sumat ab æquali pondere, tutus erit.

Idem præstat Theriaca; nam qui sa-
ni,

PHARMACEVTICÆ. 121

si ipsam biberint, non facile pestilen-
tiâ capiuntur, ut cantat Galenus lib. I.
de Ther: ad Pisonem:

*Neu te dira lues, neu lædat noxius aër,
Hanc cape, cum prima est sole reuēta dies.
Probat idem virtutes Theriacæ la-
us in vita M: Antonii, & aliorum.*

C A P. I I I.

*Theriaca Andromachi senioris, è carmine
elegiaco translata.*

Quam cum absolvero, succedanea &
modum conficiendi breviter demon-
strabo: nam nemo tam ignarus est, quā
postquam priora perceperit, sequen-
tia non facile præparet, atque misceat.

℞ Trochisc: Scylliticorum, ʒ xlviij,
Trochisc: Theriacorum,
Piperis longi,
Liquoris Papaverini, id est, Opij,
Magmatis Hedicroi, ana ʒ xxiiij.
Flo: Ros: ficcarum,
Iridis Illyricæ,
Succi Glycyrrhizæ,
Sem: Buniadis,
Scordij,
Liquoris Balsami,
Cinamomi,

F

Aga-

Agarici ana 3 xij,
Myrrhæ,
Costi,
Crocī Anglici opt,
Cassia lignæ,
Nardi Indicæ,
Iunci Arabici,
Thuris,
Piperis nigri,
Piperis candidi,
Comarum diptamni,
Marubij,
Rhei Pontici veri,
Stæchados,
Sem: Petroselini Maced.,
Calaminthi montani,
Lachrimæ Therebinthi,
Zinziberis,
Rad: quinque folij ana 3 vj,
Polij montani,
Chamæpityos,
Styracis,
Mei,
Amomi,
Nardi "galliaticæ", seu Celti-
cæ,
Rubricæ lemnia,
Phu Pontici,
Chamedrios vera,

Fol.

PHARMACEVTICÆ. 123

Fol. Malabattri,
Chalcitidis toftæ,
Rad. Gentianæ,
Sem: Anifi,
Succi Hypociftidos,
Fructus Balsami,
Gummi fplendidi,
Sem: foeniculi,
Cardamomi minoris,
Sifeleos tenuis,
Succi Acaciæ,
Sem: Thlafprios
Florum Hyperici,
Sem: Amnios,
Sagapeni ana ꝓ iiij.
Castorii non pinguis,
Aristolochiæ tenuis,
Sem: Dauci Cretici,
Bituminis,
Liquoris Oppopanacis,
Centaurij minoris,
Galbani pinguis ana ꝓ ij,

Confice cum vino & melle ad for-
mam Opiatæ, repone & ferva, vafculis
non ligneis, fed vitreis, argenteisque
hoc corneis, non ftanneis aut cupreis, fed
staceis, denfis tamen.

Hoc fenfere Andromachus, Pam-
pil, Hali, Abbas Serapio, Nicolaus

F 2

Præ-

224 INSTITVTIONES

Præpositus, Paulus, Myrepsius, Avicenna, Aëtius, quos legite per otium. Vas minimè replendum, ut coctione exhalare, exspirareque fuliginosa excrementa queant: cum Paulo singulis diebus semel aperiatur. Suadet Aëtius illud mense integro non movendum, sed male: nam quod in superficie est, & quod vasi contiguum est, ejusque lateribus adhæret, exarescit. Itaque suaderem, bis terve (ut explicat Avicenna) in septimana, splendente sole, agitando usque ad decimum mensem. Recte illa conficitur diebus canicularibus, quia tum temporis sol probe excalefacit, & diutius apud nos perdurat, Ratio nominis nihil profecto, aut certe parum ad rem ipsam facit: sed cum sint, qui putent, illam nomen à Tiria accepisse, quod prædita sit facultate vincendi morsus animalium venenosorum; alij propter Viperarum carnes admixtas (quas τὰ δῖερα Græci vocarunt) tale nomen medicamento huic impositum fuisse contendant; alij verò aliter statuunt, operæ pretium fore putavi breviter hoc examinare.

Observandum ergo ante Andromachum, atq; Mithridatem omnia medicamenta

PHARMACEVTICÆ. 125

menta morſibus ferarum aduerſantia
appellata *Theriaca*, ut ſcribit Nicander
de Alexapharmacis. Poſt Nicandrum
ipſum Galenum id non latuit, qui lib. 6.
in 6. Hipp. epidem: Com: 5 inquit: *Quæ*
ferarum morſibus medentur, Theriaca vo-
cantur. Quod apparet lib. 12. *meth. med.*
cap. ult. Sic & Oribafius ſentit, refe-
rente Aëtio Tetrab: 4. ſerm. 3. cap. 14.
qui ex Centaurio compoſitum empla-
ſtrum aduerſus ferarum, & rabidi canis
morſus *θηριακὴν* appellavit. Multi hanc
compositionē Galeno tribuunt, ſed fal-
ſo, ut videndum eſt lib. 1. de Antidotis
cap. 1. Pluribus de nomine diſputare
inutile iudico: ideo de ſuccedaneis &
de mixtione breviter nunc dicam.

Succedanea.

Pro Cinamomo ſume cortices inte-
rioris canellæ.

Pro Opobalfamo Oleum Nucis mo-
ſchatae, aut Caryophyllorum.

Pro Coſto, rad. Zedoariae.

Caffia quæ venditur, eſt Pſeudo-Ca-
ſſia, ejus loco Cinamomum duplex.

Pro fructu balfami, Cubebas.

Pro Nardo Celtica, ejus radices.

Pro Aro, Azarum.

Pro Acacia ſuccum Prunorum ſylve-
ſtrium.

F 3

Pro

126 INSTITVTIONES

Pro Rheo Pontico, Rhabarbarum parum exsiccatum.

Pro Schænanthe, Iuncos, & non flores cape cum Cordo.

Pro Sigillo Lemnio, Bolum Armenum.

Pro Malabatro Macem, sed nos ob eandem facultatem spicam, ut refert Galenus, lib. 6 de simpl. Avicenna vero post Spicam Epithymum præscribit, sed ejus rationem prorsus ignoro.

Cum autem hæc omnia bene collegeris, & optime præparaveris, ita ut quisque Medicorum tuam laudem prædicet ob diligentiam, restat compositionem aggrediari, quæ tritura absolvitur; hæc eadem est ut coctio, sicuti in ea considerandum est, quæ majorem, mediocrem, & minimam sustinent decoctionem, sic in trituratione, quæ longam, mediocrem, & minimam ferunt trituram. Hoc recte considerato contendantur omnia duriora; denique mediocria. Tandem ea quæ forcipibus inciduntur, ut Schinci, Iunci, & plura. Per se Thus, Bdellium, Myrrha, Galbanū, Sagapenū, Opium, vino Malvatico dissolvuntur, & per cribrum trajiciuntur. Hisce probe peractis Styra
in

PHARMACEVTICÆ. 127

In guttis mortario & pistillo calentibus
dissolvitur, cum melle calido, & paucis
Therebithinæ Venetæ, quæ optime a-
dargitabis, & per Setaceum mittes. Dein-
de melle illo solve Troch: Cypheos,
in quibus adde residuum Therebinthinæ,
& Opobalsamum, vel succidaneum e-
ius, & misce simul quam diligentissi-
me: tunc adde hisce gummi soluta, &
tandem mel, deinde pulveres pro com-
positione Theriaces. Recentis & anti-
quæ utimur, prima frigidior est, itaque
ad morbos calidos convenit: antiqua
vero frigidis opitulatur, quæ mediæ
ætatatis morbis medio modo se habenti-
bus confert.

Hæc de Theriaca, quæ persequi no-
bis libuit: plura reperiuntur apud Ga-
lenum lib. 1. ad Pisonem, qui ejus facul-
tates optimè describit.

C A P. I V.

Confectio Alkermes D. M.

℞. Succi Pomorum odorif.

Aquæ Ros. ana. lib. 1. ℞.

Serici crudi, succo granatorum
recenter tincti lib. 1. ^{hinc}

Infundantur simul horas xxiiij, dein-

F 4

de

128 INSTITUTIONES

de coquantur, donec rubeant liquores:
quos expresso & abjecto serico, coque
cum saccari optimi 3 CL. vel lib. i
3 vj ad mellis crassitudinem, ab igne
depositis, & adhuc calentibus misce

Ambrae crudae minutim concisae
3 lb.

Qua liquata injice pulverem sequen-
tem.

℞. Ligni Aloes crudi optimi, vel san-
tali Citrini.

Darcheni, id est, Cinamomi el.
ana 3 vj.

Lap: Cyanei, id est, Lazuli usti &
loti,

Margaritarum alb: præp. ana 3 ij.

Fol. Auri Opt. concisi 3 j.

Moschi Orientalis optimi 3 j.

Fiat electuarium, vase vitreato dili-
genter obturato, reponendum. Tritu-
ra à durioribus, ut sæpe docui, inchoan-
da.

Præparatio lapidis Lazuli est talis.

Vritur in crufibulo, quo utuntur au-
rifabri, seu olla parva fictili: dum au-
tem fere frigidus fuerit, teritur & af-
funditur aqua communis, qua abluitur
tam diu, donec aqua limpida post lotio-
nem maneat: postea cum mola sub la-
pide

PHARMACEVTICÆ, 129

vide porphyrio molitur, additis aquis
cordialibus, iterumque exsiccat: hoc
bis terve facto, iterum teritur, atque
miscetur cum margaritis, cæterisque
polveribus. Hisce ita simul mixtis, ad-
de syrupum ad justam consistentiam
coctum, una cum Moscho, & Auro, u-
troq; in partes scisso. Fit Electuarium.

Mesues inventor est, ut probat part.
2. 1. dist. A fructibus Kermes ipsi no-
men est, & Basis, qui Arabibus & Se-
rapioni sunt grana tinctorum,
quod à Græcis Coccum appellatum est.
Plura Diosc. Lobelius & Dodonæus de
granis Alkermes scribunt.

C A P. V.

Philonium Romanum, seu Magnum.

℞. Piperis albi,
Hyosciami albi, ana ʒ v.
Opii ʒ ij ss.
Cassia lignea aromaticæ,
Cinamomi, ana ʒ j ss.
Sem: Apii,
Euphorbii, quod abjiciunt non-
nulli: sed si hujus loco parum
Castorii posueris, Basis erit e-
mendatior.

F 5

Costi

130 INSTITVTIONES

Costiana 3 j.
 Sem: Petroselin,
 Fœniculi,
 Dauci Cretici, ana ʒ ij. ḡ v.
 Nardi Indicæ,
 Pyrethri,
 Zedoariæ, ana ḡ. xv.
 Croci Orient. ʒ ss.
 Mellis optimè despumati,
 Omnium triplex pondus.

Ex arte paretur Opiatum, usui
 asservandum.

Per se Crocus, & Euphorbium separatim pulverisanda sunt, alia ut diximus, quæ cum mixta fuerint, excipiantur melle, & seruentur ad usum.

Nomen est ab auctore Philonio Medico, & Philosopho Græco Thercenti, loco natali S. Pauli Apostoli, Praxin exercente Romæ. Addidit Galenus distinctionis causa Magnum: nam reperiuntur multæ diversæque Philoniorum compositiones, ut patet lib. 9 de Med. loc. cap. 4. Basis Opium est.

C A P. V I.

Requies Nicolai.

℞. Ros. Rub.

Flor. Violaria, ana ʒ iiij.

Meconii, id est Opii,

Sem.

PHARMAŒVTICÆ. 431

Sem. Hyosciami,
Papaveris albi,
Intibi, seu Scariolæ,
Lactucæ,
Portulacæ,
Psyllii,
Cort: Rad: Mandragoræ,
Nucis moschataæ,
Cinamomi,
Gingiberis ana ʒ j ss.
Sacchari Candi ʒ j.
Trium Santalorum,
Spodii,
Gum. Tragacanthi ana ʒ ij gr. v.

Technice fiat omnium pulvis, usui
reponendus, vel cum Iulapio rosato
præparetur Opiatum usui.

SECTIO IX.

De Pilulis.

CAP. I.

De Pilulis in genere.

ANtidota, atque Electuaria à veteri-
bus vocata, à nobis, ut potuimus, bre-
uissimè tradita sunt, & eorum pertun-
dendorū modos edocuimus. Iam dein-
cepse pilularum (quas Græci coccus
quasi granula, ac Catapotia vocant)

F 6

com-

132 INSTITVTIONES

compositiones eodem ordine expone-
mus. Dicta autem sunt *δρό τῆ καλαμνέϊν*.
quod *devorare*, *deglutire*, vel *bibere* est:
nam id genus non editur, nec lingitur,
nec diluitur, sed usurpatur integrè, ut
testatur Scrib. Largus const. 87. ac
Marcellus vir illustris & Med. cap. 14.
Hos Romani globulos, orbiculosve vo-
cant, ab orbiculari figura, & diminuta
pilæ forma: glomeramina à Quinto
Sereno dicta sunt, cap. 55. ut patet his-
ce versibus.

*Dilue præterea glomeramina, quæ gerit
intus*

*Clausula Aries, inter geminæ coxendicis
umbram.*

Notandū, quod grossiori modo, quam
alia medicamina debeant pulverisari, ut
eorum substantia in ventriculo manens
longius ex partibus distantibus poten-
tius trahat, & expurget. In massam
reductæ Pilulæ per annum unum, vel
alterum incorruptæ servari possunt.
Lege Serap. tract. 7. cap. 34.

C A P. I I.

In specie de Pilulis Aggregativis.

℞. Aloes optimæ,
Turpeti gummosi ana 3vj.

Scam-

PHARMACEVTICÆ. 133

Scammonii 3 v.

Rhabarb. el.

Myrabalanorū Citrinorum ana
3 iiij.

Succorum Eupatorii

Absynthii ana 3 iiij.

Agarici albiſſimi,

Colocynthidos præparatæ,

Myrab: Gebularum

Indarum,

Rad: Polipodiiquerni ana 3 ij.

Epithymi Cretensis,

Salis gemmæ,

Mastiches Chia,

Fol. Ros. Rubrarum,

Sem. Anisi,

Zinziberis ana 3 j.

Syr. Ros. pro Electuario Ro-
fato, q. s. Fiat massa.

Mesues duas sub hoc nomine Aggre-
gativo comprehendit compositiones,
vel descriptiones, scilicet maiores, &
minores exusuales. Absynthij tamen
succus media hyeme haberi potest: si
autē succo Absynthij hyeme indigeas,
collige mensē Majo herbam, tere eam,
& torculari exprime per linteum, im-
pone vesicæ, quæ soli exponenda est,
vel phiolæ, donec justam acquirat cras-
sitiam,

F 7

sitiam,

fitiem, & servabitur per duos annos. Eadem ratio est de succo Eupatorii, alijsque succis.

Turbith, Polipodium, Zinziber, Rhabarbarum, Myrabolani, Oleo Amigdalino parum fricata, terenda primo. Semen Anisi, Epithymum secundo. Aloes perse. Sic Diacridium, Trochisci Alandal, mastich, sal gemma, & Agaricus: sunt qui Trochiscos facilioris triturationis causa addunt, sed nos ob plurimas rationes cum senioribus crudum addimus. Hisce simul junctis, cum succis misceas oportet: quibus, si in unum corpus redigi non possunt, adde El. rosatum Mesuæ, vel Syrup. Ros. solutivum, authore Frambosario. Hæc diverso modo iterum ab authoribus descripta mihi in mentem venit. Nihilominus hanc Mesuei accipiendam sentio. Quæ ab illo ita describitur.

℞ Succi Ros: completi lib. iiii.

Sacchari albi lib. i. ℞.

Tereniabin puri & rec. ℥ vj.

Coquantur omnia cum facilitate super ignem, donec habeat spissitudinem mellis; Syrup. ab igne remoto adde

Scammonij per se triti ℥ j. ℞.

Troch.

PHARMACEVTICÆ. 135

Troch. de spodio ʒj.
Troch. Galliæ,
Croci ana ʒij.
Troch. de Berberes ʒ iij.
Fiat El. in vase vitreo reponendum.

C A P. I I I.

Pilulæ, sine quibus esse nolo, D.N.

℞. Aloes Rosatæ ʒ iiij.
Scammonij probè triti, ʒ vjß.
Myrab: omnium, nempe quin-
que,
Rhabarbari,
Fol. Senæ,
Agarici, Troch:
Mastiches, Absynthij,
Rosarum Rubrarum,
Violarum,
Cuscutæ ana ʒ j.

Succi foeniculi cum melle cocti q. s.
Fiant pilulæ.

Aloes succo Ros. lota intelligitur:
Modus lotionis sequitur. Cape si quan-
tatem Aloes, quam tere, post tri-
urationem pone in vase vitreo, su-
perinfunde succum Rosarum pallida-
rum, ratione majoris purgationis, &
sege crassiori panno, quod exsiccetur,
cum

136 INSTITVTIONES

cum exsiccata fuerit, iterum redige in pulverem & ferva.

Hic verus modus ablutionis est. Ne abluatur aquâ, ut plurimi faciunt, testante Galeno lib. 7. de art. curat. loquens de Hiera lota, & Dioscorides lib. 3. Cap. de Aloe.

Hic dubium occurrit: debeatne Aloe sæpe lavari aquis, & ab ijs purgari? Respondetur, Non: nam lotio in Aloe aufert, quæ subducunt, & quanto lotiones magis multiplicantur, tanto minus subducens efficitur. Ratio est, quia in omni ablutione tenuiores partes auferuntur, atque ejiciuntur; unde quanto plures sunt ablutiones, tanto plures tenues partes abeunt, quæ basis & fundamentum sunt ejectionis. Quid agendum igitur? lavanda leviter, & permitendum, ut resideat, inde aqua leviter abijcienda, & soli exponenda, ut de succis exsiccandis dixi.

CAP. IV.

Pilulae Aureæ.

℞. Aloes optimæ,
Scammonij præp: ana ʒv,
Ros. Rub.

Sem:

PHARMACEVTICÆ. 137

Sem: Apij ana ʒ ij ʒ.

Sem: Anisi,

Foeniculi ana ʒ j. ʒ.

Troch. Colocynthidos,

Mastiches, Croci, ana ʒ j.

Mellis Ros. pro Muschilagine Tra-
gacanthi q. f. Fiat massa.

Nota, quod author solam pulpam Co-
locynthidos à seminibus inundatam in-
telligat, authore Mesue cap. de Tro-
chiscis Alandal, dum jubet, Colocyn-
thidem esse purgandam à seminibus.

Nicolaus Præpositus, Arnoldus Villæ-
novanus putant, nomen extitisse ab ex-
cellentia: dicunt illi, sicut inter metal-
la Aurum est præstantissimum, ita est
massa pilularum aurearum inter pilulas
præstantissima.

CAP. V.

Pilulæ de Fumaria.

℞. Aloes ʒ vij.

Scammonij præp:

Myrab: Citrinorum,

Indarum,

Cebularum ana ʒ v.

Trita omnia ter imbuantur succo
Fumariæ, & toties exsiccentur, sed
melius

138 INSTITVTIONES

melius cogantur in massam cū melle expumato, in quo idem succus coctus est, nam Cronenburgius inquit: uno alias mense non solum lapidis duritiem contrahunt, verum etiam rimas, & fitum rancidum ostendunt. Avicenna lib. iv. fen. 7. cap. 7. de curatione scabiei, de hisce pilulis agit.

Eximantur à Myrabulanis nuclei, qui fricentur oleo violato, vel Amigd. dulcium, partim ad corrigendam asperitatem, partim etiam ad lubricandum.

CAP. VI.

Pilulae de Agarico.

℞. Turpethi opt. gummosi ʒ v.

Pil: Hieræ picræ Gal. ʒ iiij.

Agarici albißimi ʒ iiij.

Colocynthidos,

Sarcocollæ ana ʒ ij.

Radiciß Ireos,

Herb: Prassij albi,

Myrrhæ electæ ana ʒ j.

Cum sapa compone usui reponendam massam.

Radiciß Ireos, & Turpethi pulverisatis ad dimidium, adde Prassium album siccatum: simul tere & per cribrum

PHARMACEVTICÆ. 139

trum traijce. Agaricus per se cum Rob,
vel vino pistatur, & exsiccat, denuo
levigatur, deinde adde cœteros pulve-
res, nempe Myrrham, Sarcocollam,
&c. quæ cum Robus excipienda pro
massa sunt. De Agarico vide Galenum
lib. 4. de simplicibus, Paulum septimo,
Plinium decimo sexto. Eligendus est
colbissimus, frangibilis, minime lignosus,
aut perforatus: nigrum densum, durum
gravē, & qui in fragmētis suis veluti fila
nervorum habet, authores improbant.
Ejusmodi inter noxia medica-
menta reposuit Dios: lib. ~~iii~~. Mesues,
quatuor annis servari posse, vel quin-
que cum Dauco, levistico, & Polipodio
refert. Mediocrem fert trituram.

Sarcocolla quid sit docet Dioscori-
des lib. 3. cap. 8. Sit Thuri similis, rufa,
rustu amara, asserente Galeno libro
octavo de simplicibus. Mesue cap. 18
asce Pilulas descripsit, & Avicenna
libro 3. tractatu 1. cap. 40. ad Asthma.

CAP. VII.

Pilula Cochiae Rhasis.

℞. Pulv. Hieræ Picræ ʒ x.
Turpethi optimi,

Stæcha-

Stæchados Arabicæ ana ʒ v.

Colocynthidos præp: ʒ iij ʒ j.

Scammonij præp: ʒ ij lb.

Cum syrupo de Stæchade, vel succo Absynthii à Mesue in sua praxi præscripto, forma massam.

Author harum Pilularum Rhafis est cap. 1. lib. 9. Nomen à Coccis, quod granum significat, desumpsit. Si ex Helboro eas conficere libitum fuerit, adde ʒ j massæ pilularum, ʒ ij pul. Helbori castigati, id est correcti, & forma massam. Corrigitur vino malvatico per noctem infuso, mane expresso, atque lento igne siccato.

CAP. VIII.

Pilulæ de Hermodactylis D:M.

℞. Hermodactylorum,
Aloes succotrinæ,
Myrab. Cytrinarum,
Turpethi optimi,
Colocynthidos,
Bdellij Thebaici,
Sagapeni, vulgo serapini ana
ʒ v.
Castorij,
Sarcocollæ,

Euphor-

PHARMACEVTICÆ. 141

Euphorbij,

Opoponacis,

Sem: Rutæ,

Apij ana ʒ iij.

Croci optimi ʒ j ss.

Cum succo Bratlicæ depurato
forma massam.

Gummi succo caulium dissolvantur,
& denuo ad mediocrem consistentiam
coquantur, iisque adde pulveres recto
ordine tritos, & cum succo caulium
fiat massa, Oleo amygdalino hume-
facta.

Euphorbium non valde pulverisan-
dum est, ut inquit Mesues, quia offen-
dit stomachum & hepar, ob vehemen-
tem virtutem. Hæc est ratio, cur Dr.
Fernelius illud non admittit.

Animadversio.

In omni compositione, in qua Gum-
mi genera ingrediuntur, considerare
oportet, an Gummi in pulverem redigi
possint absque alia vehementiori ex-
siccatione, an non: si sine illâ non pos-
sunt redigi, dissolve illa vino Malvati-
co, vel alio vino generoso; sed Mastiche
excipitur, quia per se semper teritur.

CAP.

CAP. IX.

Pilula foetida D. M.

℞. Sagapeni,
 Ammoniaci,
 Oppoponacis,
 Bdellii,
 Colocynthis,
 Sem: Pagani, id est Rutæ a-
 grestis,
 Aloes Succo-trinæ,
 Epithymi Cretensis ana ʒ v.
 Turpethi optimi ʒ iiij.
 Scammonii Antiocheni ʒ iiij.
 Alsceram, id est, Ezulæ præp.
 Hermodactylorum ana ʒ ij.
 Zinziberis ʒ j.ß.
 Cinanomi,
 Spicæ Nardi,
 Croci,
 Castorii ana ʒ j,
 Euphorbii ʒ ij,

Gummi cum succo Porri, ut diximus,
 solvantur, & coquantur ad formam
 massæ.

Preparatio Ezulæ.

Ezulæ radicis cortex probatur re-
 nuis, levis, fractu facilis, Cassiæ fistulæ
 modo rubescens, Vt Turbith lacte, sic
 Ezulæ

PHARMACEVTICÆ. 143

Ezula aceto corrigitur, quæ per diem
ac noctem aceto acerrimo maceratur,
mane acetum abjiciatur & exsiccetur
Ezula.

C A P. X.

Pilulæ de lapide Lazuli D. M.

℞. Hieræ picræ, ʒ xv.
Agarici albissimi,
Polipodii quercini,
Epithymi Crētensis ana ʒ viij.
Lapidis Cyanei loti ʒ vj.
Caryophyllorum,
Sem: Anisi ana ʒ iiij.
Scammonii Antiocheni,
Ellebori nigri,
Salis Gemmæ, pro Indo ana
ʒ ij β.

Cum succo Intybi, id est Endiviæ
purificato vel cum Syrupo de Pomis for-
ma massam.

Omnia cum cæteris habet, sed no-
tur præparatio lapidis Lazuli: qui
non ut in conf. Alkermes uratur, sed
vetur: lotionem descriptam apud
rassavolum vide lib. de pil. fol. 93.
lapidem hunc, qui à Latinis Cyaneus
nuncupatur, in tenuissimum pulverem
redigo,

144 INSTITVTIONES

redigo, postea accepto lapideo mortariolo hunc pulverem injicio, & aquam stillatitiam Buglossæ, Ros. Violaria superingero; mox pistillo in circulo ducto, aquam & pulverem simul commisceo, hocque facio vehementi agitatione; postea permitto, ut resideat: quo facto aquam hanc abjicio, & aliam superingero: iterum vehementi agitatione commisceo, & idem facio terve, quaterve, donec nullus color, sapor, vel odor supersit; si autem nihil horum superfuerit, statuo lotionem esse perfectam. Modus lotionis legitimus iste est, salem gemmeum pro Indo, quo caremus, substituiimus.

Vt pulveres commodius excipiantur, atque massa tutius servetur, suadeo, ut pro succo Intybi sumatur Syrupus Regis Saboris. Monet Rondeletius, ne pro Helleboro nigro capiatur Aconitum illud venenosum, quod fere similia folia, radicesque habet. Si de eo quis dubitet, relinquat id, & substituat ex auctoritate hujus magni Doctoris radices Hellebori albi. Patet præparationis Methodus.

Nomen sumpsit à lapide Lasuli, qui Galiso nomine ab Avicenna, & Serapione

PHARMACEVTICÆ. 145

ne Armenus, seu Armeniacus dicitur:
 eorum diffident inter sese: Hic siqui-
 dem aureis stellulis, & velut radiis emi-
 rat cœruleo flavescentibus; ille maculis
 multis & viridibus, cœruleis, & quibus-
 dam subnigris distinguitur. Attamen
 ideo affines sunt, ut consensu Medico-
 rum alter in alterius locum facile sub-
 titui possit. In fodinis reperitur æra-
 riis, & aureis. Plura apud Dioscori-
 em. Auctor est Mesues.

C A P. X I.

*Pilula Stomachica, Corroborativa vel ante
 cibum D. M.*

℞. Alces optimæ, 3 x.

Mastiches Chia,

Ros. Rubrarum, ana 3 ij.

Cum Syrupo Absynthites cogantur
 in massam. Aloes, Rosæ, & Mastich
 ter se terantur, simulque mixta Syru-
 o excipiantur.

C A P. X I I.

Pilula Ruffi.

℞. Aloes electæ, 3 ij.

Myrrhæ optimæ, 3 j.

G

Croci.

Croci, \mathfrak{z} β .

Cum vino rubro fiat massa.

Communes, Pestilenciales, atque
Ruffi appellantur. Ruffus Ephesius di-
citur auctor hujus descriptionis, qui
Romæ tempore Imperatoris Trajani,
& Adriani vixit. Multi de illo dubitant,
& Rhafi tribuunt, sed falso: nam Rha-
fis & Galenus longo tempore post vi-
xerunt, sub Marco Aurelio, Commo-
do, & Antonino, ut confirmant Sueto-
nius, & Plutarchus. Rhafis transcripfit
eam lib. 4. cap. de peste. Paulus Ægi-
neta adjunxit Ammoniacum, ut patet
lib. 2. cap. 36.

C A P. XIII.

Pilule de Affaret.

\mathfrak{R} . Aloës optimæ, \mathfrak{z} j.

Pulv. Hieræ picræ, \mathfrak{z} β .

Myrabal. Citrinarum,

Mastiches Chix ana \mathfrak{z} ij.

Cum Syrupo de Stæchade cogan-
tur in massam.

Pulverisa quæ pulverisanda suat, &
serua. Auctor est Avicenna lib. 5. Fen. 1.
tract. 1. cap. 29. Basis est Aloes.

C A P.

PHARMACEVTICÆ. 14

C A P. XIV.

Pilula de Eupatorio.

℞. Aloës Optimæ, 3 v.
Rhab. electi, 3 iij ℥.
Myrabal. Citrinarum,
Suc. Eupatorii,
Absynthii, ana 3 iij.
Mastiches Chia, 3 j.
Crocī, 3 ℥.

Syr. de Cichorio q. s. ad forman-
dam massam.

Primo pulverisanda sunt Myrabola-
na, & Rhabarbarum : succos sole in-
spissatos in minutissimas partes scissos
per intervalla iis adde, vel addito vino
rubro, lento igniculo dissolve. Aloes,
Mastich & Crocus per se pulverisen-
tur. Hisce mixtis cum syrupo mala-
nentur.

Duæ species compositionis Eupato-
rii sunt, quarum prima Major est, à me
descripta. Secunda Minor appel-
latur à Mesue, non est in usu. Loco Eu-
patorii utimur ex communi consensu,
succo Agrimonii.

148 INSTITVTIONES

C A P. XV.

De Hiera cum Agarico.

℞. Aloes optimæ, ℥ j.

Hieræ simp.

Agarici Troch. ana ℥ ss.

Melle Ros. colato formetur massa.

Si quis desiderat pilulas hieræ simplices, in promptu habeat species ejus in officina, & melle misceat hæc, tempore præscriptionis: tunc enim habebit præparatas.

C A P. XVI.

Pilulæ de Cynogloss.

℞. Myrrhæ, ℥ vj.

Thuris Masculi, ℥ v.

Rad. Cynoglossi,

Sem. Hyosciami,

Opii, ana ℥ ss.

Croci,

Castorii, ana ℥ j ss.

Cum syrupo violato, vel de Ferfara fiat massa.

Possunt omnia simul in pulverem terri, exceptis Croco, & Myrrha. Opium malaxetur syrupo, eoque pulveres addantur, & formetur massa. Mesues il-
lorum

corum auctor est: qui eas nominat pilulas ad Catharrum, Corysan, Tussim, ploniosque id genus affectus.

Satis abunde de Pilulis egi: loquor ipsaque cum Nicolao Præposito: Omnia libro meo comprehendere, & in officina servare Medici non imperant, nec morbi, nec Pharmacopola jubeant. Ideo cum selectioribus, probatoribusque definam, & de Trochiscis ultimò agam.

SECTIONO X.

De Trochiscis.

CAP. I.

De Trochiscis in genere, eorumque usu.

Trochisci sunt quædam rotundæ confectiones, cum quadam de-pressionione ad modum Lupini; quandoque in longitudine quadam, & rotunditate. Græcis appellatur *πρόχασκος*, id est, rotula, nec non *κόκλιςκος*, quod circulus seu orbiculus est, etiã *αφίσκος*, quod parvum panem, seu pastillum demonstrat, quod ad hoc tempus ubiq; observatur.

Ratio compositionis eorum inventa est, ut species intrantes diutius & melius conservarentur. Differunt primo

G 3

cum

150 INSTITVTIONES

cum Pilulis in figura, quia hæ omnino sunt rotundæ ad formam pilæ, ut ante diximus. Secundo, in operatione, quia Pilulæ omnes aut laxant, aut leniunt: sed Trochisci multoties neutrum illorum faciunt. Tertiò, quia non sunt ingrati ad sumendum, sicut pilulæ.

Nota tamen, quod Trochiscus non detur in propria forma, quia talis ad deglutendum est ineptus; sed in pulvere, Electuario, Confectione, Decoctione: secundum quod Medicus intendit, aut etiam in pilulis, maxime quando dantur ad capitis dolorem.

C A P. II.

Trochisci de Agarico.

R. Agarici albissimi, ferra præcisi quantum volueris, maceretur sæpe vino albo, cui infusum est Zinziber, & cogatur pistando in Trochiscos.

Sunt qui huic correctionis causa adjiciunt sal gemmæ, aliqui mannam, sed non ex auctoritate Galeni. Cronenburgius eximios Trochiscos describit lib. 6 de comp: med. Mesues auctor est Agarici; electio monstrata est supra.

C A P.

PHARMACEVTICÆ. 151

C A P. III.

Trochisci Alhandaal. D. M.

℞. Pulpæ Colocynthidos albæ, levis, à granis purgata, ℥ x.

Forcipibus incidantur minutissime, & fricentur Olei Rosacei ℥ j. deinde accipe mucoris Tragacanthi, Gummi Arabici, vel Bdellii infusorum aqua rosacea ad triduum, ana ℥ iij. Formentur Trochisci.

Infundantur gummi aquæ Ros. duorum dierum spatio, interea mundetur Colocynthidis, quæ forcipibus incidatur crassiusculè, misceaturque cum glutine, & fiant Trochisci in umbra ficcandi. Post iterum pulverisentur exquisitissime, & denuo eorundem glutine permisceantur, quod ter, quaterve fiat pro compositione Trochiscorum.

Alhandaal apud Arabes est, quod Colocynthidis apud Latinos. Quid sit docet Dioscorides lib. 4. cap. 18.

C A P. IV.

Troch: Bechicæ, seu Albæ, vel sub lingua. D. M.

℞. Sacchari albissimi, lib. β.

G 4

Sacchari

152 INSTITVTIONES

Sacchari Candī,

Pinnideorum, ana ℥ ij.

Rad. Ireos Florent. ℥ j.

Amyli albiſſimi, ℥ vj.

Muſcilaginis Tragacanthi ex aqua roſarum factæ, q. ſ. ad Trochiſcorum conformationem.

Omnia pulveriſari debent perſe, deinde excipi cum muſcilagine Tragacanthi ut dixi. Dicuntur Bechicæ à verbo græco βήχων, quod medicamen contra tuſſim ſignificat. Idem inquit Tral-lianus lib. ij. cap. iij. Hanc compoſitionem Meſue cap. de tuſſi deſcribit.

CAP. V.

Troch. de Myrrha D. Rhafis.

℞. Lupinorum ℥ v.

Myrrhæ ℥ iij.

Fol. Rutæ,

Mentaſtri,

Pulegij,

Cumini,

Rubiæ tinctorum,

Aſſæ ſœtidæ,

Sagapeni,

Oppopanacis ana ℥ ij.

Cum ſucco Arthemifiæ formentur paſtilli. Primo ordine pulveriſandæ radices

PHARMACEVTICÆ. 153

Indices Rubiæ, deinde Semina Cumini
& Lupini, tandem herbæ. Per se Myr-
rrha, & Castorium; Gummi liquanda
sunt in decocto vel succo Arthemisiæ,
vel Iuniperi, ut Rhasis. Deinde linteo
forti traijcienda, ad aquæ humiditatis
dissipationem, & consistentiam mellis.
Hisce postea addenda sunt reliqua sim-
plicia, ut artis est, puluerisata, ad for-
mandos pastillos.

Duo Lupinorum sunt genera, affir-
mante Diosc: lib. 2. cap. 102. Rhasis
lib. 9. cap. 83. hanc descriptionem ha-
bet, Basis est Myrrha.

C A P. VI.

Trochisci de Capparibus D.M.

℞. Cort: Rad: Capparum,
Sem. Agni casti id est Viticis
ana ʒ vj.
Gummi Ammoniaci ʒ iiij.
Aristolochiæ rotundæ,
Rad. Acori,
Fol. Rutæ,
Calamenthes Montanæ,
Sem. Malanthij, vulgo nigellæ,
Rom.
Nasturcij,

G ʒ

Succi

INSTITVTIONES

Succi Eupatorij ana ʒ ij.

Cyperij,

Scolopendrij ana ʒ j.

Eorum ac superiorum eadem est ratio parandi. Ammoniacum, dissolvitur aceto, coquiturque ad consistentiam mellis, & eo pulveres subiguntur, addito Syrupo de Byzanthijs, vel de Fumaria, & formabuntur Trochisci. Si efficaciores volueris, inquit Plantius, & carere Trochiscis de Lacca, adde hisce gummi Lacce, Rubiæque tinctorum.

CAP. VII.

Trochisci de Absynthio D. M.

℞. Comarum Absynthij,

Ros. Rubrarum,

Seminis Anisi ana ʒ ij.

Rhab: electi,

Succi Eupatorij,

Rad: Azari,

Apij,

Amygd: amararum à cort. purg.

Spicæ Nardi,

Mastiches,

Fol. Indici ana ʒ j.

Cum succo Intibi formentur Trochisci, qui umbra sunt ficcandi.

CAP.

PHARMACEVTICÆ. 155

CAP. VIII.

Trochisci Gallie Moschatae.

℞. Ligni Aloes crudi & non cocti,
nam alioquin corpus mortuum
est ʒv.

Ambra ʒij.

Moschi ʒj.

Cum muscilagine gummi Traga-
canthi, ex aqua Ros. extracta, fiant
Trochisci figura folij Myrthei, figil-
luntur vase vitreo, & reponantur.

CAP. IX.

Troch: Cyphi Damocratis.

℞. Vvæ passæ pinguissimæ à cortice
& ab acinis mundatæ, & probe
levigatæ,

Terebinthinæ puræ ana ʒxxiiij.

Myrrhæ selectæ,

Scenanthos ana ʒxij.

Cinamomi ʒiiij.

Bdellii lacrimæ,

Spicæ Nardi,

Cassia nigræ aromaticæ,

Cyper,

Baccharum Iuniperi,

G 6

Calami

156 INSTITVTIONES

Calami odorati ana ʒiij.

Aspalati, ejus loco, Zedoarij
ʒij. ʒ.

Croci ʒj.

Mellis Narbonensis, aut alterius optimi, pro Attico & vini generosi q. s. ad formandos Pastillos.

[Preparatio nec difficilis, nec laboriosa.]

Myrrha & Bdellium in vino generoso primum deducenda, quibus addenda Therebinthina, deinde pulpa Passularum mundatarum, & per cribrum trajectarum, denuo pulveres: omnia tandem melle despumato & probe cocto excipienda, & in massam cogenda, ex qua formentur Trochisci, in umbra ficcandi, olla vitrea, aut fictili reponendi servandique.

Nomen Cyphi odoramenta & suffimenta significat, teste Gal. cap. 75 de simpl: med: fac. Sacerdotes Ægypti ob suavem odorem ex eo candelas construebant. Magnus ille Rex, de quo in compositione Mithridatica, hujus compositionis author est, quam postea Damocrites carmine descripsit. Tempore dispensationis Mithridatij hosce confice.

CAP.

CAP. X.

Troch: de Viperis D. Andromachi.

℞. Carnis Viperarum cum Anetho
& sale in aqua coctæ ℥ viij.

Hæc in mortarium coniecta valide
pistillato iusculo, in quo viperæ fuerint
coctæ, ad mollitiem cum panis triticei
medullæ, albissimi exsiccati, & tenuis-
sime pulverisati ℥ ij. pistentur simul:
ex ejus massa formentur pastilli, mani-
bus primò Opobalsamo, aut succeda-
neo unctis, in umbra ficcandi.

Vipera serpens est, quam recentio-
res Medici Tyron vocant. Hinc est,
quod præsentem pastillum è Tyro in-
scribant. Vipera non in Belgio, sed in
Italia copiose invenitur, Frambosario
teste. Eligenda est vipera colorem
subflavum, collum maxime protensum,
oculos subrubentes, inuerecundos, ven-
erem crassiorē, caudam acervatim in-
venitatem abeuntem, habens. Capien-
sæ autem sunt viperæ, non quovis tem-
pore, sed desinente vere, aut principio
statis, quo tempore consueto cibo,
& aëre aliquamdiu fuerint recreatæ.
rite præparentur, prius virgis ce-
dantur

158 INSTITVTIONES

dantur ipsarum capita, & caudæ præci-
dendæ: nam præterquam quod hæ par-
tes virulentiores esse videantur, etiam
duræ, & modicæ carnis existunt. Eli-
gendæ sunt fœminæ, & mares relin-
quendi, quorum caro in tenuitatem
sensim abit. Mas discernitur corporis
tenuiori trunco, ex crassiori collo,
angustiori capite, habetque tantum
duos dentes: fœmina vero quatuor, ut
medicorum vates cecinit Nicander.

Mas geminis notus virus ructare caninis.

*Dentibus, his autem fert fœmina Vipera
plures.*

Si plura de ijs desideras, lege Mathio-
lum, in Dioscoridem lib.6. cap.50.

CAP. XI.

Trochisci scillitici D: Andromachi.

℞. Scillæ assatæ partium interna-
rum lib. i.

Farinæ Erui ℥ viij.

Terantur hæc simul valide in mor-
tario, & ex massa formentur Pastilli,
qui in umbra siccandi. Modus assationis
patet cap. de Eclegmate Scillitico.

Ne cape loco Erui radices Dipta-
mni, quia nō sunt rarę, ideo præstat cum
Androm:

PHARMACEVTICÆ. 159

Androm: & Galeno genuinam descrip-
tionem admittere, quam sine neces-
sitate aliquid substituere, & mentem au-
thoris de fraudare: sit candidum, & ruf-
seum, quod minus amarum, & magis
Alexiterium est.

CAP. XII.

Trochis: Hedicroi Andromachi.

℞. Rad. Acori veri, vice amomi ʒxij.
Malabattri, Nardi Indicæ,
Cassia aromaticæ,
Myrrhæ selectæ,
Crociana ʒvj.
Calami Aromatici.
Iunci odorati,
Costi,
Phu Pontici,
Cinnamomi,
Seminis lentisci pro Xilobalsa-
mo,
Olei Macis pro Opobalzamo ana
ʒ iij.
Sant. Rubri, pro Aspalatho,
Azari,
Mari,
Amaraci ana ʒ ij.
Mastiches Chia ʒ j.

Cum

160 INSTITUTIONES

Cum vino generoso formentur Pa-
stilli. Primo radices, & ligna, dein aro-
mata, postea reliqua terenda sunt: sed
Mastich, Crocus, Myrrha seorsim, quæ
simul miscenda sunt cum oleis, & vino
Malvatico pro Trochiscis.

Galenus horum pastillorum descrip-
tionem carminibus edidit. Multæ variæ
que descriptiones reperiuntur lib. j. de
Antidotis.

Ab autore Andromacho, & Galeno
vocantur Hedicroi, ab Arabibus vo-
ce *Alvi Daracaron* & per Metaphoram
Magma, quod optima selectissimaque
medicamenta, ex quibus exprimitur,
significat. Nomen Hedycron colorem
gratissimum, nitidissimumq; designat,
sicuti *ἡδυχρον μίον* unguentum gratissi-
mum à Dioscoride est.

CAP. XIII.

Trochisci de Spodio D. M:

℞. Ros: Rub. ʒ xij.

Spodii præp. ʒ x.

Sem: Acetosæ ʒ vi.

Coriandri ex aceto, & torre-
facti,

Pulpæ Sumachi ana ʒ ij ʒ.

Amyh

PHARMACEVTICÆ. 161

Amyli affati,

Fl. Balauftiorum,

Bacch: Berberes ana ʒ ij,

Gummi Arabici affi ʒ i ʒ.

Omphacij, id est, succi uvarum
immaturarū, quantum sufficit.

Forma Pastillos, quibus utere cum
succo aliquo astringente.

Spodium quid?

Spodium Græcum derivatur à spodos, quod cinerem significat, sed illud particulariter de illa materia dicitur, quæ ad exteriora fornacum latera adhæret, in quibus argentum à plumbo separatur.

Certe non illud, neque Antispodium græcorum intra corpus assumere liceat, neque Arabum spodium per os ingerendum erit, quamvis Avicenna & alij Arabes ejus usum in roborandis Corde & Iecore plurimum commendent: sed laborandum est, ut habeantur ossa Elephantis combusta, sive ebur ustum, nam hoc pollet astringendi facultate, sis cautus, & cave ne tibi tradantur ossa bouum, vel canum, ejus loco. Si plura desideres revolve lib. i. Fuschii de comp: fol. 189. de vero Spodio officinarum.

CAP.

CAP. XIV.

Trochisci de Carabe D. M.

℞. Succini præp: ʒ i.
 Cornu Cervi usti,
 Coralli combusti,
 Papaveris nigri tosti,
 Gummi Arabici assati,
 Tragacanthi,
 Acaciæ,
 Hypocistidos,
 Balauſtiir,
 Maſtiches,
 Laccæ ana ʒ ij ʒ ij.
 Thuris,
 Croci,
 Opij ana ʒ ij.

Cum Muſcagine ſeminis Philly, aqua
 Plātaginis macerati forma Trochiſcos.

Opium, Acacia, Hypociftis debent
 minutim primum incidi, dein cum Ba-
 lauſtijs pulverifari, tum & Gummi, Per
 ſe Crocus, & Thus; tandem omnia
 uſta hiſce addi, & cum pſilly muſcagine
 formari Trochiſci debent.

Nota quod Renodæus cap. x. lib. 3.
 ſect. 3. improbat medicamenta aduſta,
 ſed vult ponantur cruda, nam ut inquit:

Me-

PHARMACEVTICÆ. 163

Medicamen non deterius, sed præstantius erit: si quid enim eximie virtutis habet cornu Cervi, aut Corallum, hæc ipsa potius habere cruda, quam adusta credibile est. Quid uestio medicamentis conferat, quid ab his auferat, quid adferat, minime sum nescius, sed multa vix hunc patiuntur apparatus, sine magno virium dispendio. Vrat tamen, qui voluerit, modò expetitas cum cineribus retineat vires. Huc usque ille.

Ambra flava ab Arabibus dicitur Karabe, quod est paleas rapiens, à Græcis *ἐλεστρον* quod *fusticas* colligat, & ad se trahat: succinum à Latinis, quia ex pingui terræ succo concretum est.

Rondeletius pro Lacca statuit, sang. Draconis, qui gummi est arboris Draco nomine, in insulis Canariis luxuriantis: quod à colore sanguinis Draconis nominatur.

C A P. X V.

Trochisci Alkekengi D. M.

℞. Bacc. Halikakabi, seu Alkekengi, ʒ iij.

Sem. Citri,

Melonis,

Cucurbitæ, ana ʒ iij ℞.

Boli

164 INSTITVTIONES

Boli Armeni,
 Gummi Arabici,
 Thuris,
 Sanguinis Draconis,
 Sem: Papaveris albi,
 Amygd. amararum,
 Succi Glycyrrhizæ,
 Tragacanthi,
 Amyli,
 Nucleorum Pineorum, ana 3 vj.
 Sem: Apii,
 Hyosciami albi,
 Succini, vulgo Carabæ,
 Opii, ana 3 ij.

Compone pastillos cum succo Halikakabi, quos repone usui.

Semina Alkakengi, Apii Hyosciami, Papaveris, facile pulverisanda sunt cum succo Glycyrrhizæ. semina 4 frigida, Amygdalæ & Pineæ cultro concisa cum seminibus misceantur facile. Gummi pistillo calido pulverisari debent, vel cum seminibus parum sicari. Bolus, Succinum, sanguis Draconis, Thus per se. Opium dissolvatur succo Alkakengi ad formandos Trochiscos.

Duas habet Præpositus descriptiones, quarum prima Mesuei, secunda Nico-

PHARMACEUTICÆ. 165

Nicolai est, sed prima (quæ magis in usu est) tenendam censeo. De qua in præsentiarum.

Halikakabus geminus est, peregrinus, & vulgaris, officinis satis cognitus, depravata voce *Alkakengi* nominatur: utimur succo, & foliis.

C A P. X V I.

Trochisci albi Rhasis.

℞. Cerusæ aqua ros. lotæ, ʒ x.

Sarcocollæ crassioris, ʒ iiij.

Amyli, ʒ ij.

Gummi Arabici,

Tragacanthi, ana ʒ j.

Camphoræ ʒ ss, cum Sylvio, qui albiore sunt, quam qui conficiuntur cum Opio.

Singula per se pulverisata, & mixta excipiuntur aqua rosarum, vel lacte, cum Rhasi, & formantur Trochisci parvi, qui siccati reponuntur usui. Opium utendi tempore addi potest. Notandum verò, Rhasin auctorem hujus compositionis non meminisse Amyli, sed Mattheum de Gradibus ejus interpretem addidisse.

Modus lavandi Cerusam facilis est.

Bis,

il.

166 INSTIT. PHARM.

bis, terve lavatur, & aqua abjicitur:
postea supra lapidem exsiccat, &
mola in subtilissimum pulverem duci-
tur. Quare hoc fiat cap. de pulveribus
in genere demonstratur.

F I N I S

Libri Primi.



LECTORI S.

Postquam Dei beneficio libellum meum ita ad finem perduxì, placuit tibi, candide Lector, nunc exhibere alterum non minus utilem ac necessarium; cum veram methodum miscendi Cerata, Emplastra, Unguenta, & Olea exactè doceat. Complures quidem doctrinà, ingenio, & judicio præstantes viri facem nobis in hac materia scriptis suis præluserunt. Attamen, si fatenda veritas est (absit invidia dicto) perfectum ea conficiendi modum vel intactum reliquerunt, vel parcè attigerunt, vel incertas vias insistentes multis obscuritatibus rem involverunt. Quæ omnia cum tyronibus difficilia spinisque obsita, ex meo ipsius ingenio jam tunc, cum primò hanc artem colere incepti, judicarem, aggressus sum ordine clariori ac breviori ad imitationem expertissimì viri Iohannis du Boys materiam hanc pertractare, illiusque præscripta artis Pharmaceuticæ studiosis proponere, ne erretur, sed ritè procedatur in eo, unde ægroti solatium ac levamentum expectant, quodque à Medicis unice desiderant. Salve.

CERATVM est medicamentum, aggregatum ex stirpium partibus, metallicis, mineralibus, terra, & animalium partibus, cum cera ad formam solidam. Proportio autē Cerati est, vt pro unciiis tribus olei ponatur ceræ semūcia, specierum verò drachmæ duæ, vel tres. Si liquidius vis habere Ceratum, quarta pars ceræ est ponenda: si solidius, tertia: si ad formam Emplastrum secunda: differtque ab Emplastro tantum mollitie, quia minus ceræ recipit, quam Emplastrum, nomenque habet à cera. Emplastrum verò medicamentum esse dicemus aggregatū ex metallicis, mineralibus, terra, & animalium partibus simul mixtis, durum valde, & solidū, quia plus ceræ recipit. Nam in Emplastri cōpositione ponitur ceræ vncia vna dimidia, olei drachmæ sex, si nulla alia ingrediantur, siue hyeme, siue æstate. Atque hæc quidem satis sint admonuisse de quantitate ceræ, & olei. Nuuc dicendum est in genere, quæ sit illorum materia, & quomodo in Ceratis, Emplastris, & Vnguentis apponatur: deinde modum conficiendi, seu miscendi, præscribemus.

Cerata,

Stirpiū par-
tibus, vt

Mucaginibus, quæ
ex radicibus & fe-
minibus cōficiūtur;
Gūmi generibus,
vt lacrymis omni-
bus, liquoribus cō-
cretis, & nō cōcre-
tis, vinctuosis, & a-
quosis, radicibus,
corticibus, herbis,
floribus, femini-
bus, & cōsimilibus.

Metallicis,
Minerali-
bus, &
Terra, vt

Lithargyrio vtro-
que, Cerusa, Sāda-
racha veterū, Cin-
nabarj, ære usto, æ-
ruginis speciebus,
flore æris, plumbo,
ponpholyge, bolo
armena, & cōsi-
milibus.

Animalium
partibus, vt

Cera, ladano, ax-
ungis omnibus, æ-
sypo, butyro, Se-
porum generibus,
melle, moscho,
ambra, zibetta,
glutine pisciū, ster-
core omni, osse
Sepiæ, cranio hu-
mano, mumia.

H

Mucagines

Mucagines coctæ adduntur in Emplastris post nutritionem, & perfectam coctionem lithargyrii paulatim affundendo, sicque coquantur ad ipsarum consumptionem, ut videre licebit infra in Emplastris diachymi magni, & parvi. In quibusdam unguentis postquam cera est cum oleis, axūgiis, adipibus liquata, & ab igne deposita, frige facta semper spatula movēdo injiciūtur: ut in unguento resumptiuo, & in omnibus unguentis, quæ quotidie à medicis præscribuntur.

Gummi, quæ sunt partes Stirpium, & lacrymæ, liquores concreti, & non cōcreti quædam spatio sex horarū super cineribus calidis macerantur, proprio, & convenienti liquore, (sœpissimè in aceto forti, vel vino, ut paulatim solvantur) deinde igne lento, ad humidi non radicalis consumptionem continua agitatione coquantur, cocta & consumpta humiditate cum terebinthina (si ea addenda veniat) conjunguntur, in Ceratis, Emplastris & Unguentis permiscētur, prius tamen cera, axungia, sepo, medulis &c. liquefactis & refrigeratis, ut

Ammoniacum,	Opopanax,
Galbanum,	Assa foetida
Sagapenum,	Bdellium, si molle sit.

Gummi alia genera, ut Thus vtrumque,
Mirra, Mastiche, Lacca, Hædera, Sarcocol-
la,

PHARMACEVTICÆ. 171

Juniperinum, Belzoi, Euphorbium vetus,
aloë separatim in pulverem tenuissimum
educuntur, ordinéque sub finē iniiciuntur.

Gummi alia calore modico cum oleis se-
paratim vel simul cum axūgiis, adipibus, se-
ois & butyro, vt & Terebinthina, Resina
utraque, Colophonia, pice vtráque, spatula
semper ducendo solvuntur, & initio, ali-
quando in medio, aliquando in fine ponun-
tur, vt in Emplastro gratia dei, & in vn-
guento Basilico minori, & in Emplastro pro
stomacho.

Gummi alia dissolvuntur calore mediocri
cum humore convenienti, vt opium cum
pauca aqua rosacea, in vnguento rosato
Mesuæ, (si requiratur) tragacanthum arabi-
cum, in vnguento resumptivo, hypocistis,
acacia (si admittantur) omnia ante infusio-
nem, vel asperisionem pulverum, Ceratis, &
Vnguentis induntur.

Radices, cortices, herbæ, flores, aliæ-
que stirpium partes, aliquando recentes, a-
liquando siccæ necessariae sunt. Recentes
omnes á corde interno separatim inscin-
duntur, & pistillo ligneo in mortario lapi-
deo contunduntur, quæ vbi contusæ fuerint
igni lento vna in vino (vt in Cerato Ioannis
de Vigo, in vnguento Neapolitano) aut in
oleis (vt in vnguento Agrippæ) aut in axun-

H 2 giis

giis & adipibus (ut in unguento populeo
 infunduntur, & continua agitatione co-
 quuntur, ut infra videre licebit: scilicet quæ
 vino maceratae sunt, ad medias: deinde co-
 lantur. Colata vero cum cera, oleis, axun-
 giis, & adipibus ad humidi peremptionem
 eodem igne coquuntur, & in Ceratis, Em-
 plastris, Vnguētisque primum locum oc-
 rinent. Quæ vero in oleis, axungis, & adi-
 pibus infunduntur, igne leui, spatula semper
 ducendo, ne vrantur, coquuntur, donec nihil
 humidi remaneat: deinde linteolo rudi ex-
 torquendo transcolantur, & quod siccum
 est, abiicitur: & hæc in Emplastris, & Vn-
 guentis etiam primum locum habent. Ra-
 dices, cortices, herbæ, flores sicci, secun-
 dum suam substantiam ordine, vel per se
 in pulverem tenuissimum reducuntur, & ul-
 timo ordine in Ceratis, Emplastris, & Vn-
 guentis permiscuntur.

Metalla vel Mineralia separatim super
 porphyrio molula porphyrica, liquore con-
 venienti asperso, ducuntur, eousq; dum in pul-
 verem reducta sint: ut Cerusa, Lithargyrū
 utrūq; Alij in mortario æreo Cerusam, Ly-
 thargyrū utrumq; lavando tractant (ut in
 modo miscendi dicemus) quæ deinde cum
 oleis solis, aut axungis, & adipibus igne len-
 to, spatula assidue ducendo, aliquot horis nu-
 triuntur, & coquuntur: cocta secundum in

En pla-

PHARMACEVTICÆ. 173

Emplastris, & vnguentis obtinent lo-
um, & aliquando primum, scilicet cum
est magna eorum quantitas.

Metalla ut Sandaracha veterum,
Cinnabaris, æs ustum, Pompholygis ge-
nera, &c. pulverata, cum in Emplastris
& Vnguentis quantitate parva ponun-
tur, debent poni, cum cera liquata est
cum oleo, vel cum axungjis, & adipibus
tam refrigeratis, ut videre licebit, in
Emplastro contra rupturam, & Vn-
guento diapomphyligos.

Alia extinguuntur, & cum massa Em-
plastri, vel vnguenti refrigerata est, in
ne ponuntur, ut argentum vivum, &c.

Animalium partes liquantur ordine,
quædam perse, aut cum oleis, ut Cera,
ladanum, calore moderato: & sunt in
quibusdam Ceratis, & Emplastris præ-
cipuum corpus, ut in Emplastro pro
matrice. Quædam separatim, vel unâ
aliquando cum oleis liquantur calore
modico, nivis ac grandinis modo, ut
axungia & adipēs omnes, oesypus, bu-
tyrum, seporum genera, & mel, quæ in
Ceratis, & Emplastris ponuntur, post-
quam cera erit liquefacta, vel cum Li-
nargyriū decoctum est in modum un-
guenti. In unguentis vero primum ob-

H 3

tinent

174 INSTITVTIONES

continent locum dempta oesypo, quæ
 fine Cerati, Emplastri, & Vnguëti ser
 per poni debent. Aliæ verò cum liqu
 ribus minime unctuosus in mortario di
 solvuntur, ut moschus, ambra (quam
 tamen facile calore modico liquari po
 test) Zibetta, gluten piscium, sterc
 omne, & in Ceratis, Emplastris, & V
 guentis initio quidem ut gluten pisci
 stercus omne, in fine vero moschus, am
 bra, zibetta admiscuntur, sed rarò nisi
 Medicis præscribantur.

Hactenus breviter liquationes, dissol
 lutiones, coctiones, & triturationes
 quæ conueniunt ad Ceratorum, Em
 plastrorum, Vnguentorum, & Oleorum
 confecturam, expedivimus. Reliquum
 est, ut ordine illorum conficiendorum
 methodum præscribamus.

S E C T I O P R I M A.

C A P. I.

Ceratum Sandalinum. D. M.

℞. Rosarum rub. exungatarum
 3 xij.

Santalorum rub. 3 x.

Santal

PHARMACEVTICÆ. 175

Santali albi,

Citrini ana ʒ vj.

Boli Armenicæ ʒ vij.

Spodij Arabici aqua plantaginis
loti, ob acrimoniam, ab igne
contractam, ʒ iiij.

Camphuræ, ʒ ij.

Ceræ albæ ponticæ, vel nostræ
facticiæ, ʒ iiij ʒ vj.

Olei Ros. immaturi lib. i.

Conficiantur & administrentur S. A.

Nonnulli ceram & oleum lavant & po-
stea permiscunt, quod approbo.

Santala omnia frustatim divisa simul
in mortario contundes, aquam rosa-
ceam (ne subtilior pars effluat) asper-
gendo: cumque ferè, vel omnino erunt
pulverisata, rosas addes, ut simul cum
reliquo pulvere santalorum perfectè
tundantur: deinde tenuissimo cribro
transmittes, nec non servabis, donec
bolum armenicam, & spodium in pul-
verem redegeris separatim tenuissimè
ut alcooch. Deinde cum aliis pulveri-
bus antè paratis paulatim permiscebis,
& ad usum servabis. Postea ceram con-
fractam in lebetè cum oleo, cineribus
calidis aut balneo mariæ liquabis: dein-
de ubi erit liquata, & oleo commixta,

H 4

aq

176 INSTITVTIONES

aqua rosacea lavabis ter aut quater
semper abjiciendo aquam, & aliam im-
novando (quanquam revera, si ceram
albam bene depurata, & recentem
habeamus, oleumque recens, non est
opus ablutione) deinde igne lento sic-
cabis, ne humiditas ex lotionem rema-
nens rancorem, & putredinem tempo-
ris intercapedine causetur. Postea fini-
to frigesce, & pulveres prædictos,
quos ad usum servaveris, immisce: de-
mum caphuram in mortario cum pistil-
lo calido paululo aquæ rosacæ solutam
(quam alij cum paucis oleo terebinthi-
næ liquant, quod minimè fieri debet,
cum terebinthina pro scopo compo-
sitionis videatur calidior) totumque pro-
be commixtum ad usum reconde.

CAP. II.

Ceratum Vigonis.

℞. Olei chamæmeli,
Olei anethi,
Olei de spica,
Olei de lilio, ana. \mathfrak{z} iiij.
Olei de croco \mathfrak{z} ij.
Pinguetudinis porcinae, lib. ij.
Pinguetudinis vitulinae, lib. j.
Euphor-

PHARMACEVTICÆ. 177

Euphorbij rec. 3 x.

Thuris Masc. 3 xx.

Olei laurini, 3 iiij.

Ranas viventes. Nu. xij.

Pinguedinis viperæ, 3 v.

Lumbricorum lotorum in vino.
3 vij.

Succi radicis Ebuli, &

Inulæ. ana. 3 iiij.

Schœnanthi.

Stœchados Arabicæ.

Matricariæ ana M. ij.

Vini odoriferi, lib. iiij.

Bulliant omnia simul usque ad
consumptionem vini, deinde
colentur, cui colaturæ addan-
tur

Lithargyrij auriloti lib. ij.

Terebinthinæ claræ, 3 iiij.

Et cum cera alba sufficienti ad
ignem fiat Ceratum ad mo-
dum Sparadrapi, addendo in
fine cocturæ

Styracis liquidæ, 3 iiij.

Deinde ab igne, baculo agitan-
do, donec tepidum fuerit, post-
modum addentur

Argenti vivi extincti cum saliva.
3 viij.

H 5

Iterum

178 INSTITVTIONES

Iterum agitando baculo donec
argentum vivum optimè in
corporetur.

Debent lumbrici terrena exinaniri
face, & aqua fontana ter aut quater
semper abjiciendo aquam, & aliam in
novando leviter ablui, ut quicquid ter-
ræ illis adhæserit, auferatur: debent
quoque illo vino, quod hanc composi-
tionem ingreditur, macerari, cum quo
his & eodem vino ranæ adhuc vivæ in-
coqui, ad tertiæ partis consumptionem.
Tunc Matricariam quoque incisam in-
jicies, deinde Schænanthum incisum
ac parum contusum, & Stœchadem ad
semilibræ coquendo consumptionem,
ut ex quatuor primis libris duæ tantum
remaneant. Postea permittes omnia si-
mul ita inacerari, donec decoctum pe-
nitius refrigeratum sit: deinde colabis
per pannum cannabinum rudem, velo-
citer extorquendo, servabisque quoad
tandem lithargyrium nutriatur, agi-
tando baculo, vel spatula lignea, xij ho-
rarum spatio, in lebetæ amplo cum O-
leo chamæmelino, anethino, de lilio,
croco, & axungiis porcinis, vitulinis,
& viperinis. Alii postquam lithargy-
rium spissitudinem unguenti cum oleis
adeq.

PHARMACEVTICÆ. 179

adeptum fit, tunc axungias paulatim omnes addunt, iterumque cum lithargyrio ad mellis crassitiem coquunt. Omnibusq; his post nutritionem peractam mixtis, fiat decoctio lenta, donec lithargyrium spissitudinem unguenti acquirat, nec fundo vasis adhæreat, quod quidem veræ mixtionis iudicium erit (quæ vulgò incorporatio appellatur) in quod lithargyrium ita paratum, & decoctum, semilibram prædictæ decoctionis infundes, ab igne illud auferendo, ne repentino novarum rerum contactu effluat, & elabatur: posteaque iterum igni forti ad coquendum appones, donec prima injecta humiditas tota absumatur: sæpiusque idem factitabis, reliquas partes prædictæ decoctionis paulatim injiciendo, donec universa humiditas consumatur: ita ut unaquæque decoctionis infusio, non excedat semilibram. Statim his peractis succos ebuli, & inulæ campanæ minimè defæcatos in lithargyrium ita paratum infundes. Tunc igne adaucto lithargyrium perfectius ad sacchari rosati formam concoques, vel ad consumptionem dictorum succorum, alias non aservaretur sine putredine. Posthæc ab

H 6

igne

180 INSTITVTIONES

igne sepones, & quamprimum ceram
 minutim incisam (si desideretur) conjici-
 es, qua liquata, totum refrigerare
 permittes. Deinde Thus, Euphorbium
 semotim in modum alcooh pulverisa-
 tum desuper insperges. Demum argen-
 tum vivum prius defæcatum agitatione
 & maceratione in aceto albo facta:
 postmodum transcolatione duplici vel
 triplici facta per pannum densum vel
 corium comprimendo, ut quicquid ter-
 rei vel plumbei inest, auferatur, extin-
 ctumque cum saliva humana una cum
 terebinthina, Styrace liquida, oleo
 laurino, & de spica commixtum & in-
 corporatum conjicies ac subiges, mag-
 daleonesque finges. Cæterum, ante-
 quam hanc aggrediatur pharmacopola
 emplastri compositionem, debet dili-
 genter animadvertere, ut olea pelluci-
 da habeat, pariterque pinguedines u-
 num diem vetustate non excedentes:
 alii vetustissimas pinguedines accipiunt
 pro scopo compositionis.

Præterea modus ab auctore scriptus
 minime approbandus mihi videtur, cum
 vult axungias seu pinguedines, Thus,
 Euphorbium cum cæteris aliis simul
 concoqui. Nam si ita fieret, totum me-
 dica-

PHARMACEVTICÆ. 181

dicamentum coctione corrumpetur:
Quædam enim longiori, alia breviori
coctione indigent. Quare consulerem
secundum modum à nobis descriptum
potius faciendum esse, quam secundum
aliud modum ab auctore descriptum.

Ping. porcinae.

Ping. vituli.

Ping. viperæ.] Hæ autem duæ
primæ pinguedines sumi ex animalibus
vigente autumno debent, cum per hoc
tempus animalia sint graciliora & præ-
cipue circa renes. Sed viperina finiente
vere, nondum tamen æstate inchoata,
& maxime circa Zirbum, id est, circa in-
testina. Debentque quoque in hunc
modum præparari. In largiori aquæ fri-
gidissimæ copia, tunicis exemptis, con-
venit pinguedines confricari, deinde
firmiter expressas ficcari, subindeq; alia
recenti aqua lavari & exficcati ut prius:
hæcque ablutio debet ter aut quater re-
peti, semper abjiciendo aquam, & aliã
innovando, donec ultima aqua conspi-
ciatur sincera, & nitida. Deinde eas o-
portebit in minutissimas partes divide-
re, & vase duplici liquefacere, spatula
lignea aliquoties agitando: eliquatas
colo transfundere in aquam, donec fri-
gescant:

182 INSTITVTIONES

gescant: quibus refrigeratis, aqua lentè
& guttatim injicienda, & in idem vas
alia infundenda, ut leviter iterum eluā-
tur, unde manu comprimi debent, quo
facilius fæculentum, virus pessum eat.
Posthæc in pilam spongia nitida made-
factam transfundantur, ubi coire cæpe-
rint, residētes in imo sordes eximantur.
Cæterum alii sine aqua eliquant, & abs-
que duplici vase, ut magis durent, eo
quod illarū humiditas superflua lique-
factione ista magis tollitur, quā si in du-
plici vase liquefcerent, Eliquatas vero,
& ita paratas fictili optime clauso, loco
frigidiſſimo reponunt: alii in ædibus fic-
cis, & editis, plane humoris expertibus,
cum foliis lauri aridis sine juglandis in-
volucro, five in nova charta cōdunt. Sic
etiam cæteræ pinguedines, & exungix
sunt parandæ & reponendæ. Sunt autē
permulti, qui in harum præparatione &
ablutione salem in aquam conjiciunt,
postea iterum in alia aqua sine sale ab-
luunt, idque faciunt, ut mutetur odor
axungiarum & adipum, ac insipidæ re-
maneant. Nonnulli, dum eas recondunt,
iterum aliquid salis aut Sacchari (se-
cundum auctoritatem luminaris mayo-
ris, in descriptione unguenti pectoralis)
admiscent,

PHARMACEVTICÆ. 183

admiscent, ne putrescant aut rancidæ
fiant. Porro autem si quis quærat, possit-
ne aliquod discrimē reperiri inter pin-
guedinem, & adipē, paucis respondebi-
mus, dicētes: pinguedinem liquidiorē
esse, quæ si semel dissolvatur, non facilè,
ubi liquata, vel dissoluta fuerit, concre-
scit, ac cogitur. Fit autē à sanguinis par-
te magis oleosa, estque maxime parti-
ceps igneæ & aëreæ substantiæ, & aquæ
minime. Dum enim liquefcit, nullū cre-
pitum edit, & in locis calidis animalium,
quæ utrinque dentata sunt, & cornibus
carent, ut in hominibus, suibus, canibus,
ursis, & ejusdem generis pluribus gi-
gnitur, Adeps vero crassior est, magisq;
terrestri substantiæ: nam si calore dis-
solvatur, vel fundatur, statim concre-
scit, celerrimeq; coit, ac congelatur,
multumq; apparet pinguedine durior:
& dum liquefcit, crepitat. Gignitur au-
tem maxime in partibus nimis calidis,
& in animalibus, quibus cornua insunt, &
dentes in superiori mādibula deficiunt:
cujusmodi habētur boves, capræ, cervi,
& arietes, & hujusmodi plura. Sed (ut
verum fateamur) in quacumq; parte gi-
gnatur pinguedo, & adeps, à frigiditate
coalescere videtur. Hæc autem nomina
sæpissimè

scæpissimè apud probatos authores confunduntur.

RANAS VIVENTES] Quas Ranas intelligat non exponit auctor. Sunt enim varij generis ranæ: sed rubetæ tamen videntur accipiendæ, cum Galenus, lib. 7. de composit. medicā. secund. gen. capit. 12. & reliqui medici in acopis parādīs eas potius elegerint. Sed si non habentur majores ranæ, quas ipse Galenus rubetas vocat; quæ in paludibus & aquosis scrobibus degunt, accipiendæ sunt. Et licet quæ in frutetis sepiibus & rubis degunt, videantur rejiciendæ, quia lethiseræ sunt & venenatæ, secundum Dioscoridis mentem: & quia tamen agitur hic de medicamento externo, non interno, nihil prohibet secundum Galeni mentem eas eligere.

LITHARGYRII AURI] Lithargyrium nostrum usitatum probatur foliatum, colore aureum, debétque à plumbo & scoria purgari, antequam aliquod emplastrū ingrediatur. Quod facile præstare poteris, si subtilissimè in mortario, pistillo friando ipsum contundas, deinde aquā desuper infundas, & tunc quod sæculentum erit, cū aqua in aliquod vas conjicias: deniq; id quod
in

PHARMACEVTICÆ. 185

in mortario remanet alia aqua infusa,
 eaque vehemētissimè agitata, cumque
 turbulenta exstiterit, cum præcedenti
 in idem vas refuderis, idque toties fa-
 ctitaveris, donec videas plumbum so-
 lum & fœces in mortario sublidere, om-
 nemque subtiliorem substantiam cum
 aqua assumptam esse, quā quiescere per-
 mittes, quousque sublidere videas li-
 thargyriū, ac tum demum aquā gutta-
 tim effuderis & pulverem lithargyrij in
 fundo sublidentem acceperis, eamque
 paulatim & pedetentim super marmo-
 re duxeris, donec ita levigatum sentias,
 ut si eum manibus & digitis tractes, aut
 linguæ imponas, nullā prorsus asperita-
 tem percipias. Atque ita parato lithar-
 gyro trito uti poteris in Emplastris &
 Vnguētis. Galenus de composit. medi-
 camēt. per genera in lotionē lithargy-
 rij, lavat illud secundum scopū & effe-
 ctum necessarium: videlicet si scopus sit
 deficcare, & non mordicare, licet illud
 cum aqua fontana æstate, diebus cani-
 cularibus lavare: si vero vis deficcare &
 mordicare, cum vino aut aceto: aliquā-
 do cum aqua maris Galenus id lavat. Sic
 autem & cœtera metalla, aut mineralia,
 quæ in Emplastris & Vnguētis appo-
 nuntur,

186 INSTITVTIONES

nuntur, ante usum debent lavari in liquore proprio secundum scopum compositionis, & levigari. Sunt qui aliam rationem habent lithargyrij præparandi. Sed hæc mihi facilior & usitatio videtur. Quod si plura expetas ad lithargyrij præparationem, lege Mesuen lib. Servitoris.

Ceterum notabit Pharmacopola, cum simpliciter in descriptionibus Emplastorum, & Unguentorum leget lithargyrium, aureū esse intelligendum, non quod fiat ex auro, sed quia auri colorem referat. Quid autem sit, & de generibus & illius electione, & unctione infra dicemus, in Sectione 2. de unguentis cap. 2.

CAP. III.

Infrigidans Galeni.

℞. Cerae albæ. ℥ j.

Olei rosati omph. ℥ iiij.

Et sit radix olei oleum omphacinum aquæ fontium claræ, & proprie vehementis frigoris quantum sufficit. Oleum multoties & bene lavetur, lavationibus pluribus & quo magis elaboratur in lavando, fit excellentius. Ultimo vero concassetur cum aceto albo claro & paucò.

In

PHARMACEVTICÆ. 187

In diplomate ceram frustatim diuisam, una cum oleo rosato, facto ex olivis immaturis, & rosis minime expensis, aqua frigidissima pluribus vicibus antequam rosas recipiat loto (quoniam pacto lavari debeat, lege infra sect. 3. cap. 3.) liquefac, ut unum corpus sumant. Totum liquatū refrigerare permitte in vase aquæ frigidissimæ pleno: refrigeratum in mortario marmoreo cum aquæ fontanæ, paulatim affusæ tanta copia, quam in se dum mollitur, ac subigitur, admittere potest, tere & agita: in fine vero parum aceti albi & clari ℥ β. admisce: eoque recenter parato utere, ne vetustate calorem acquirat. Attendant autem Pharmacopœi, cum hoc ceratum ægrotis apponunt, ne id supra corpus dimittant tamdiu, donec calefiat: (ut docet Galenus lib. 11. meth. nisi aliter imperetur à medicis propter causas certas) sed continuo mutant: quod pauci hoc tempore advertunt.

C A P. IV.

Emplastrum Diachylum parvum D.M.

℞. Lithargyrii, ℥ vj.

Olei veteris clari, lib. i.

Mucag.

188 INSTITVTIONES

Mucag. psyllii, ℥ iiij.

Mucag. hyoscyami, ℥ j β.

Mucag. lini seminis,

Mucag. radicis malvæ, ana ℥ ij

Cujus operatio est sicut operatio alterius: hoc est qui antecedit, in lib. Mesuæ.

Sic emplastrum conficies. Accipe lithargyrium tritum, & præparatum, ut in præcedenti emplastro Ioannis de Vigo docuimus, misce cum oleo prædicto in vase æreo, agitando spatio xij horarum ad minus: deinde igni lento exponatur, eousque dum coctione perveniat ad mellis crassitiem, & fundo vasis non adhæreat: hoc enim signum est incorporationis. Tunc ab igne auferes, & mucaginum prædictarum seminum & radicum, separatim factarum, & coctarum, simul mixtarum, partem aliquam, nempe ℥ iiij in lithargyrium injicies, ac quam celerrime spatula agitabis, quousque subsideant: iterumque igni expones, donec ea injecta mucaginum quantitas consumpta videatur: deinde ut prius, reliquum mucaginum conficies, ab igne agitando: postea ad decentem consistetiam concoques, donec bullare & subsidere lithargyrium conspicias,

PHARMACEVTICÆ. 189

incipias, quod signum est perfectæ con-
coctionis: denique refrigerare per-
mittes. Demum $\frac{3}{4}$ duarum magdaleo-
nes conficies, & loco convenienti re-
servabis. Quamquam tamen nonnullis
videretur ad usum & scopum dicti em-
plastri emollientis, si tota mucago non
absorbeatur coctione: nihilominus ne
manente mucagine humidius reddatur
emplastrum, & putredini obnoxium,
deo voluit auctor integram eorū con-
sumptionem. Addit Galenus lib. 1. se-
cundum genera initio emplastri aliquid
quæ claræ cum lithargyrio, ante-
quam coquatur: vultque emplastra al-
ba fieri in loco claro, aperto, soleque
adiacente: nam aër obscurus reddit em-
plastrum nigrum, sed lucidus & clarus
maxime juvat ad albedinem: propor-
tio autem aquæ & olei par erit, hoc est,
sint lithargyrii $\frac{3}{4}$ vj. olei $\frac{3}{4}$ ix. toti-
dem aquæ erunt sumendæ.

Mucag. psyllii.

Mucag. hyoscyami.

Mucag. lini.

Mucag. radicis malvæ.] Mu-

agines ut conficias, sic est operandum.
Semina omnia exquisite eliges, sepa-
ratimque ponderabis, ac leviter conte-
res

190 INSTITVTIONES

res dempto semine psyllii, lini, & fœ-
nugr. quæ nunquam conteri debent, nisi
à medicis præscribantur, quia absque
contritione mucaginē viscosum etiam
cumulate reddunt: radices vero om-
nes electas & à terra repurgatas minu-
tim conscindes, ac in mortario lapideo
cum pistillo ligneo ad invicem conte-
res, per seque in fictilibus vasis spatia
duorum vel trium dierum super ignem
lentum aut potius super cineres calidos
in quantitate sufficienti aquæ tepidæ
macerari permittes, aliquando tamen
spatula lignea movēdo, ne fictilibus in-
ter macerandum & coquendum adhæ-
reant, sumendo videlicet pro una libra
seminum aut radicū, aquæ tepidæ libras
iiij. (non desunt tamen qui mucagines
quosint magis viscosæ, libram unam &
semissem seminum aut radicū sumant)
deinde maceratione facta si tibi fortas-
se haud satis viscosæ & coctæ videan-
tur, adhuc eodem igne coquendas re-
linques, donec perfectam coctionem
fuerint assequutæ. Signum autem per-
fectæ & absolutæ coctionis erit, cum a-
qua in seminibus & radicibus ipsis ma-
cerata non amplius aquæ, sed viscosita-
tis illius, ut albuminis ovi retinuerit, aut
paulo

PHARMACEVTICÆ. 191

paulo plus: quinetiam si prædictæ macerationis pars frigido marmori velut in declivi imposita lente & crasse defluat, tum veræ & perfectæ coctionis earum indicia habebis: deinde coctione peracta intorquendo per se exprimi debent, quibus postea cum volueris tuto poteris uti. Ad mucaginē autem in hoc emplastro conficiendam, volui quantitatem seminum, radicum, & aquæ describere, ne tironibus aut in arte parum versatis erroris occasionem præberem: sumenda autem erit uncia una seminis psyllii, ad uncias quatuor aquæ ad summum sex, seminis hioscyami ℥ iij. aquæ ℥ j ℥. seminis lini & radicis malvæ sylvestris ana ℥ ℥. aquæ vero ℥ iiij. Alii mucaginibus factis ex seminibus fœnugræci, lini, radicibus malvæ agrestis, & ibisci mucagines in hoc parando emplastro utuntur, sed id fit propter diversitates morborum. Venum hæc nostra descriptio, quæ in usu quotidiano est, recipit mucaginem factam ex semine psyllii: sed in mucagine psyllii conficienda, minime semen contundi debet, ut paulo ante dictum est, cum medulla sit calida & cortex frigidus, unde calidam, & frigidam fortitur

192 INSTITVTIONES

sortitur facultatem ac qualitatem secundum Mesuæ mentem. Itaque cum in hoc non desideretur calefaciendum sed tantum molliendi cum levi refrigeratione facultas, conteri minime debet, neque diu multo calore macerari nec fortiter exprimi, ne substantia calida foras extrahatur.

Cæterum in hoc emplastro conficiendo cavendum, ne ignis vehementior fiat initio coctionis lithargyrii, nam compositio nigrescat adustione: sed ignis augeri debet pro industrii pharmacopæi sententia, ubi prima peracta est concoctio. Hoc præterea notandum semen psyllii intelligendum, ubi simpliciter psyllium legitur sine aliqua additione.

CAP. V.

Emplastrum Diachylon magnum D.M.

℞. Lithargyrii mundi triti & cribellati, ℥ xij.

Olei Irini,

Olei Chamæmelini,

Olei Anethini, ana ℥ viij.

Mucag. seminis lini.

Mucag. ficuum Ping.

Mucag.

PHARMACEVTICÆ. 193

Mucag. passularum,
Mucag. seminis fœnugræci,
Succi ireos radicis,
Succi Scyllæ,
Glutinis alchannæ,
Oesypi humidæ, ana ʒ xij. ʒ.
Terebinthinæ, ʒ iij.

Resinæ pini,

Ceræ Citrinæ, ana ʒ ij.

Conficiatur sicut diximus, hoc
est, tali modo, quo usi sumus
præcedenti, istud conficiatur.

Debet lithargyrium præparari, ut in
prædictis emplastris monuimus. Nam
præparatum ac coctum cum oleis
uerit, in id paulatim mucagines con-
cies seminis lini, fœnugræci, ficuum,
& passularum separatim & arte factas:
uibus concoctis & cum lithargyrio
consumptis, statim succum ireos &
scyllæ injicies, & ad horum consum-
tionem decoques. Posthæc gluten al-
channæ dissolutum, eo quo præscribe-
mus modo, immittes: quod cum pri-
mum coctum & consumptum fuerit,
cera minutim incisa injicienda erit, quæ
postquam liquata fuerit, resinam pini
confractam addes: qua liquata totum
in igne depones, & statim terebinthi-

I

• nam,

nam, paulo post æsypum admiscebis, e
 eaque massa frigida magdaleones a
 usum conficies.

Mucag. ficuum Ping.

Mucag. passularum.] Ficus & passu
 læ raras mucagines faciunt: sed qui
 earum decoctio inspissata ad forma
 lyrei, hoc est, sape, mucaginis confister
 riam obtinens, vim habet emolliend
 secundum scopum emplastri, ideo cum
 mucaginibus & succis lentis voluit au
 ctor remisceri.

Succi scyllæ.] Scylla debet eligi suffi
 cientis magnitudinis, non admodum
 magnæ, & enormis, bene habita, & nu
 trita, alba, & recenter ex terra de
 sumpta, cum caulis & folia exacte arue
 rint. Mesues illam cæteris præfert de
 Simpl. lib. 2. capit. 6. quæ est saporis
 dulcis, acris, & amari, squammis depur
 gata, in loco libero prope alias educata.
 Cum igitur triplices ei sapores assigne
 Mesues, vult illam triplici constare sub
 stantia, aërea scilicet, terrestri & ignea
 ab aërea dulcem, à terrestri propter ad
 ustionem amaram, ab ignea, quæ maxi
 me in superficie est, acrem qualitatem
 habere, ex illa autem succus in hun
 modum extrahitur.

Scyl.

PHARMACEVTICÆ. 195

Scyllam, qualem jam descripsimus, lectā accipe, eamque cultello ligneo, vel eburneo, corticibus purgatam, & incisam, in mortario lapideo, pistillo ligneo fortiter contere, non ferro, ut annotat Sylvius in illius præparatione: ubi optime contusa fuerit, in vase fictili clausa argillaque circumlita, in ibano modice calido, spatio sex horum reponatur, ut maxime caleat: posthæc in forti panno calido exprimar. Verum non desunt qui ad succi scyllæ præparationem diversis modis utuntur. At hæc ratio à nobis præscripta, cæteris faciliior ac præstantior existat. Ex unica autem succus supererit, qui ad hanc confectionem sufficiet.

Glutinis alchannæ.] Conficitur glutin alchannæ sic. Accipe alchannam, seu Icthyocollam, hoc est cetacei ventrem candidam, natione ponticā, subaeram, minime scabram, & quæ ce-rrime liquescit (hæc Dioscorid. lib. 3. cap. 86.) eamq; in minutissimas partes divide, & in novo fictili repone, & de-ber aquam claram infunde, donec vas impleatur pro ratione ictthyocollæ, diu-ter calide macerari finito ante coctio-nem non aliter dissolveretur, deinde

I 2

igni

196 INSTITVTIONES

igni lento coquatur eousque, dum i
cremorem abierit, & cum refrigeratu
fuerit, ad similitudinem pultis consp
cietur.

OESYPI HUMIDÆ.] Oesy
pus lanarum ovium succidarum est pin
guedo. Diosc. cap. 7. lib. 2. Modus au
tem eam preparandi talis est. Lanæ suc
cidæ ut ab ovibus, & arietibus, sumuntur
è collo, feminibus, & femoribus ovium
Harum accipe libras circiter 60. vel
quavis satis magna quantitate : & fe
venti aqua octo horarum spatio maco
ra, agitandò, & commiscendo, spatula
vel baculo rudi: deinde fac fervesco
re, donec omnem suam pinguedinem
in aquam deposuerint. Deinde lanam
fortiter expressam à decoctione remo
ve : tunc aquam pinguem & sorditam
lanarum imbutam ex alto infundito in
aliud vas, multoties iterando, donec
spumescat: tum spumam finito subside
re, & aquæ innatantem pinguedinem
collige, iterumque lava in aqua. Exa
gitetur donec rursus spumescat, tum
spumam ceu pingued. colligito: illud
tamdiu facito, donec aqua amplius non
spumescat, semper colligendo spumam
ceu pinguedinem, collectā vero in aqua

pung

PHARMACEVTICÆ. 197

pure tandiu lavato, & manibus agitato, donec perluceat & linguæ admota nihil mordax habeat, sed parum astringat. Quibus peractis pinguedinem in fictili denso, loco frigido, ad usum reposito. Sed hæc omnia fieri debent fervido & æstuante sole. Servitor, & Præpositus in lavando addunt parum aquæ marinæ, ut aqua magis spumescat.

Animadvertite porro Mesuen in hoc emplastro resinâ pini expetere, & eam intelligere, quæ è pino sponte fluit, quæ quidem apud Præpositum rafa appellatur. Probatur autem ponderosissima & viscosissima, verum de his resinarum differentiis, satis abunde in sequenti capite dicetur. Præterea maxime observandum, cum mucagines injicientur; tum enim lithargyrus ab igne auferri debet, quod maxime notandum, ne repente novarum rerum contactu exardet.

C A P. V I.

Emplastrum Gratia Dei Præpositi.

℞. Terebinthinæ, lib. β.

Resinæ lib. i.

Ceræ albæ. ℥ iiij.

℥ 3 Mastiches,

198 INSTITUTIONES

Mastiches, $\frac{3}{4}$ j.

Foliorum verbenæ,

Foliorum betonicæ.

Foliorum pimpinellæ, ana M. j.

Herbæ pistētur, & vino forti bulliant usque ad consumptionem tertiæ partis colentur, & inde substantia herbarum abjiciatur, & cera, resina, & masticha cum colatura ponātur, nec non bulliant agitando, donec optime incorporentur tunc deponantur ab igne, & addatur turbinthina, totumque agitetur cum spatula, & fiat emplastrum.

Virides herbæ præscriptæ & præcipue earum summitates, loco temporeque conveniēti, legi debēt, nec lavari: deinde incidī, & in mortario lapideo, pistillā ligneo contundi. Posthæc in vino rubro quam optimo & odorifero (eo quo vulneribus & ulceribus magis convenit quo Hyppocrates in lib. de vulneribus & fracturis frequenter utitur, Galenus in lib. secund. gen. in coctione herbarum emplastra ingredientium) quantitate sufficienti ad partis tertiæ consumptionem decoqui: quæ cum decoctæ fuerint, parumper infundi permitte, ut tota facultas cum vino, in quo decoctæ fuerint, remaneat. Deinde ad

huc

PHARMACEVTICÆ. 199

huc calidæ colentur, massaque herba-
 rum abjiciatur. In colatum ceram mi-
 nutim incisam adjicies, & una cum de-
 coctione concoques igne lento, spa-
 tula assidue movendo, ad humidi vel
 colati consumptionem: qua humiditate
 exhausta, resinam confractam, ut lique-
 scat cito, addes: qua liquata, & ab igne
 remota, terebinthinam, ut dissolva-
 tur, admiscebis, cumque omnino te-
 puerit, & refrigeratum fuerit, ma-
 stichen quam tenuissime pulverisatum
 desuper insperges, manibus tractan-
 do. Hac enim methodo fortior erit
 ipsius emplastri operatio, neque co-
 ctione corrumpetur, cum ordo sim-
 plicium decoctionis diligenter obser-
 vatus fuerit: quod Præpositus non ad-
 vertit. Proinde maximo ingenio, sum-
 maque industria uti debemus in hujus
 emplastri confectione, ut veram & le-
 gitimam inveniamus methodum. Hic
 enim modus à Præposito confusus,
 pace tanti viri dixerim, nobis vide-
 tur. Vult siquidem ceram, mastichen,
 resinam, terebinthinam omnesque her-
 bas sine distinctione poni & ordinis no-
 ta, quod sane absurdum videtur. No-
 vit profecto Præpositus terebinthinam,
 I 4 resinam,

200 INSTITVTIONES

resinam, & mastichem nullam penitus
sustinere decoctionem propter essentiali-
tenuitatem: ceram vero maiorem pro-
pter suæ substantiæ crassitiem. Quar-
quantum in nobis situm fuit, voluimus
verum conficiendi modum hic describe-
re, ne medicamentum ita coctum cor-
rumpatur, & illus operationis propri-
etas minuatur.

Cera, & Propolis quid?

CERÆ ALBÆ.] Hoc in loco
ceram naturaliter albam, & ponticam,
acrimonia carentem intelligit Præpo-
situs: vel illam quæ ex novis favis sepa-
ratur, vel quæ præ foribus aut præ spi-
raculis alveariorum reperitur, artificio
dealbata & acrimonia spoliata, & ab
apiariis, & aliis, à quibusdam modernis
authoribus cera virginea appellatur. Ab
antiquis verò propolis dicitur ea. Pro-
batur autem propolis antiquorum flava,
odore styracem referens & in vehe-
menti ariditate mollis, & mastiches in
modum ductilis. Quam si habere non
possumus, utendum erit præ illa nostra
factitia alba, quæ pluribus lotionibus
præparata est, & quæ acrimoniam à
melle contractam deperdidit, ut Gale-
no

PHARMACEVTICÆ. 201

no placet libr. 2. simpl. capit. 15. Tandem
 vero inquirendum erit, utrum propolis
 idem sit, quod cera virginea alba: quod
 equidem nō puto. Abluitur autem pro-
 polis antiquorum, ceu cera virginea
 modernorum secundum Galenum loco
 prius citato, hunc in modum. Primum
 modice calefactam ceram in aquam
 purissimam modice calidam infundito:
 deinde conterito, tundito, frangito, ma-
 nibusque impense subigito, deinde ce-
 ram refrigerato, cum priori aqua effusa
 rursum calefacito, & in aliam aquam
 calidam atque sinceram injicito, rur-
 sumque diutissime contundito, donec
 acrem qualitatem suam in aqua depo-
 fuerit, quod gustu cognosces. Mox vero
 & tertio, & quarto sæpius idem facien-
 dum, donec aqua ex abluta cera qua-
 litatem mordacem recipiat: ac ita ce-
 ram ad usum paratam habebis. In hoc
 autem medicamine, ac in cæteris
 quæ vulnera solidant, glutinant, & re-
 burgant, inflammationesque leniunt
 omnis mordacitatis expers, & quæ acri-
 tymosoque melle conficiatur, cera est
 attendenda, teste Galeno 4. simpl. capit. 5.
 Idcirco eo modo in hoc lavanda est, re-
 na, pix, & oleum (si desiderantur) ut si
 I 5 aliquid

aliquid in iis mordacitatis fit, auferatur, & præcipue in emplastris, ceratis & unguentis, quæ habent facultatem solidandi & glutinandi.

CAP. VII.

*Emplastra de janua, seu de Betonica
Præpositi.*

℞. Succi Betonicæ,
Succi plantaginis,
Succi apij, ana lib. j.
Ceræ,
Picis.
Resinæ,
Terebinthinæ, ana lib. ss.
Fiat Emplastrum.

Etsi nullam formam, aut methodum in hoc conficiendo emplastro Præpositus præscripserit: tamen quo hodie sæpissime præparetur modo, secundum omnes fere omnium Pharmacopeos, indicabo. Accipiunt betonicæ, plantaginis, singulorum æquale pondus, apij vero non ad cæterorum proportionem, verum cætera pondere superat omnia. Tundunt deinde cum cera incisa, pice resina confracta, & terebinthina in lebetem injiciunt ut simul coquantur, donec

nec nulla superfit humiditas, vel donec herbæ coctione aruerint : quæ cocta dū maxime calēt, torquendo exprimunt, & inde magdaleones formant. Hicq; modus hodie fere ab omnibus Pharmacopœis approbatur. Qui modus à vero mihi videretur recedere, sed cur ita parant, hæc illorum ratio est. Volunt resinam, picem, & terebinthinam colorem viridem retinere, ideo magis expetunt vires quorundam simplicium deperdi, quam ipsum colorem viridem. quod quidem absurdum non esset, consuleremque ita componi, si modo vis picis, resinæ, & terebinthinæ non deperderetur : ac si etiam legitima proportio herbarum ad lib. j. succi acciperetur. Quapropter ne pharmacopola ignoret confectionis hujusce emplastri methodum veram, volui verum modum hic præscribere.

Accipe foliorum betonicæ recentium, loco & tempore collectorum, eam quantitatem, ex qua possis succi libram unam habere: in mortario lapideo pistillo ligneo tunde: deinde fortiter succum intorquendo extrahe: similiter facies de plantagine, & apio, succum singulorum exprimendo. Quorum suc-

204 INSTITVTIONES

corum non defecatorum accipies singulorum libram unam secundum auctoris descriptionem, ceramque minutim concisam cum succis in lebetem conjicies, & igne lento concoques ad humidi consumptionem, dum ex tribus libris, una remaneat. Tunc picem, & resinam confractam injicies, & concoques ad alteram humidi peremptionem, deinde colabis, ut si aliquid fuerit arenositatis in pice, & resina, auferatur: postea terebinthinam dissolve, omnia simul spatula lignea movendo. Deinde massam finge, ex qua frigefacta magdaleones ad usum formabis. Sed objiciet quispiam hoc emplastrum peccare in colore. quid tum postea, modo vis simplicium tota remaneat in medicamento, & coctione non corrumpatur? in hoc enim non est necessarius color viridis, sed detergendi, & deficcandi facultas. Igitur quicumque parare vult emplastrum, nullo modo curare debet quo colore sit, dummodo vires obtineat, quas Galenus libr. de composit. medicament. secundum genera vult ipsum obtinere. Cæterum notandum si methodum à nobis præscriptam sequaris, terebinthinæ dosin aliquam

PHARMACEUTICÆ. 205

qua ex parte minuendam esse, quod ce-
 ratum potius quam emplastri formam &
 consistentiam retineat, sufficientque
 tantum ℥ ij. si autem veterem confi-
 ciendi methodum pharmacopœorum
 more retinendam putes, terebinthinæ
 procul dubio dosi nulla ratione erit
 minuenda, quod nimirum coctione cras-
 cescat. Adhæc præterea notabis, alias
 valentiores formas à Vigone describi,
 sub nomine de betonica capite de ul-
 ceribus capitis, quæ magis merentur
 dici de betonica quam præsens empla-
 strum.

C A P. VIII.

Emplastrum Ceromaceu Ceroneu Nic. Alex.

℞. Picis,
 Cera, ana ℥ vij.
 Sagapeni, ℥ vj.
 Ammoniæ,
 Terebinthinæ,
 Colophonæ,
 Croci ana ℥ iiij.
 Aloes,
 Thuris Masc.
 Mirrhæ, ana ℥ iiij.
 Styracis calamit.

I Z

Masti-

Mastiches,
 Oppopanacis,
 Galbani,
 Aluminis,
 Fœnugræci, ana ʒ ij.
 Confitæ, ceu Styracis liquidæ
 Bdellii, ana ʒ j.
 Lithargyrii, ʒ β. Fiat: Emp.

Ceram in frustula concisam, ut li-
 quescat, igni levi appone: qua liquat
 mox picem colatam, & colophoniam
 confractam injice, movendo spatula li-
 gnea, & cum cera ab igne deposita fue-
 rit, gummi quæ pulverisari nequeunt, u-
 sagapenum, ammoniacum, galbanum
 & bdellium (si molle sit, si vero aridum
 aut siccum, ponantur post mirrham) in
 vino, vel aceto fortissimo per se imbu-
 ta & soluta, & separatim cocta (ut in
 præcedenti capite docuimus) cum te-
 rebinthina, confita, & styrace incorpo-
 rentur: quæ incorporata, cum præ-
 cedentibus liquatis ac modice calidis
 commisce, desuper cum omnino te-
 puerit, cœtera simplicia optime & seor-
 fim levigata, trita, ac cribrata, ut lithar-
 gyrium (vult Alexandrinus illam prius
 cum oleo coqui) fœnugræcum, alumen,
 mirrham, olibanum, mastichen, aloen,
 insperge,

PHARMACEVTICÆ. 207

insperge, ac cum spatula lignea velociter agitando conjunge. Paulo post crocum juxta artem levigatum exactissime dicta spatula tractando commisce. Quibus omnibus diligenter commixtis super marmore manibus oleo laurino perunctis magdaleones formantur. In hoc emplastro conficiendo maxime cavendum est, ne prædicti pulveres aridorum in emplastro calido adhibeantur, ne in grumos abeant. Cæterum Alexandrinus simpliciter & sine ulla additione, scribit picem. Pix autem hoc in loco navalis sumi debet, aut ejus loco nostra nigra factitia. Cum reperitur scriptum picis simpliciter, & sine ulla additione, liquidam esse intelligendam. Verum cum hoc diximus, solum eam in compositionibus Præpositi usurpandam intelligas, & præcipue in emplastris & unguentis, quæ ad maturandū & mundificandum valent. Proinde admonitos Pharmacopeos cupio, præpositum hoc emplastrum præscribere, & in simplicibus cum Alexandrino convenire, in ponderibus vero minime, ut supputavit: hæc Alexandrini descriptio pondere simplici constat: præpositus pondus triplicat, in quibusdam

208 INSTITVTIONES

busdam tamen parum. Præterea in methodo conficiendi Alexandrinus de croco nullam mentionem facit, quamvis in sua descriptione scripserit. Quare qui hanc compositionem aggredietur, non secundum Alexandrini modum componat, sed secundum nostrum à nobis descriptum.

CAP. IX.

Emplastrum Oxycrocium Myrepſii.

℞. Croci,
Zopiſſæ, id eſt, Reſinæ teſte
Myrep.
Colophonix,
Cerae Cit: Singul. \mathfrak{z} ij.
Terebinthinæ,
Galbani,
Ammoniaci,
Thuris,
Myrrhæ,
Maſtiches. Singul. \mathfrak{z} j ſs.

Galbanum & Ammoniacum aliquantulum contuſa conjice in modicum acetum per totam noctem ferveſacta, & eliquata, per ſaccū ex tenui linteo factū colato coquantur iterum, donec pars aceti conſumatur. Dein diſſolutam zopiffam & colatā injicito, adjecta cera: ac diſſolvens.

PHARMACEVTICÆ. 209

dissolvens omnia simul adijce colopho-
niam : & deinceps terebinthinam : post
masticen myrrham & thus : deinde
super marmor, & croco in pulve-
rem trito insperfo ipsum subigito.

C A P. X.

Emplastrum Tripharmacum Mesuæ.

℞. Lithargyri triti sicut alcooch,
Par. j.

Aceti vini fortissimi, Par. j.

Olei antiqui, Par. ij.

Coquantur cum facilitate, usque dum
 fiat ejus spissitudo, & administretur.

Electum, præparatum & elaboratum
 ut in præcedentibus emplastris do-
 cuimus) accipiatur lithargyrium, una
 cum oleo spatio xij horarum nutriatur,
 continuoque igne semper spatula lignea
 conuolendo coquatur, donec crasseſcat:
 quo cocto statim aceti mediam partem
 paulatim affundendo in id injicies, vi-
 delicet extra ignem, ne (ut superius
 docuimus) recentium rerum contactu
 exundet. Rursusque igni lithargyrium
 appones, & ad aceti consumptionem
 concoques: quo consumpto, alteram
 partem aceti, quæ restat, eodem modo
 injicies, paulatim lithargyrio ab igne
 remoto.

remoto. Deinde ad decentem concoctionem percoques, videlicet ad electuarii solidi formam, vel quousque fundo vasis non adhæreat, & digito tractando non coinquinet, quod sanæ perfectæ coctionis signum est: coctum autem & in hunc modum paratum ad usum repones. Vnum hic ab omnibus diligenter notandum venit, lithargyrium nempe, quod hoc emplastrum ingreditur, debere aqua rosacea lavari sine aliquo dubio, & loco veteris olei rosaceum immaturum sumendum, quia pares vires & facultates sortitur, ut emplastrum de cerusa. Cum itaque hæc duo pares habeant effectus, & unum alterius loco sumatur, non erit alienum in hoc simplicia præparare, quemadmodum in emplastro de cerusa paravimus. Christophorus de honestis in expositione hujus emplastri eadem distinctione xi. sic inquit. Emplastrum de cerusa quibuscumque malis complexionibus calidis, factis à caliditate solis &c. convenit. Pariter istud Tripharmacum confert ulceribus, quibus conjunguntur mala complexio calida &c. Quare si hoc emplastrum omnibus dispositionibus confert, quibus unguentum de cerusa

PHARMACEVTICÆ. 211

rusa coctum, & si etiam in eo lavetur
cerusa in aqua rosacea, & loco olei
communis oleum rosatum immaturum
sumatur, cur in isto lithargyrium eo-
dem & simili modo non parabitur, cur
etiam oleum antiquum in rosaceum
immaturum non transmutabitur? Præ-
terea notandum apud Galenum cap. 3.
lib. 1. secundum genera, hujusce em-
plastri varias esse conficiendi formas
pro intentione varia, & scopi differen-
tia. Interdum cum veteri & communi
oleo, interdum oleo communi & ace-
to, ad duplam lithargyrii portionem:
variat etiam apud eundem concoctio-
nis modus, & quantitas. Ex iisdem
materialibus crudis fit unguentum,
quod nutritum Chirurghi vocant, ad in-
flammationes & erysipelata commo-
dum.

C A P. X I.

Emplastrum Palmeum seu Diachaciteos.

℞. Olei veteris, lib. iij.

Axungia veteris sine sale, lib. ij.

Lithargyrii triti sicut alcooch,
lib. iij.

Vitrioli, ℥ iij.

Conf.

212 INSTITVTIONES

Conficiatur sic. Oleum & axungia mittantur in stagnato supra ignem, & liquefiant. Deinde addatur lithargyrium & vitriolum, & ducantur continue cum tribus ramis palmæ, & accipe unum ramum palmarum minutiim incisum, & intromittatur, & tamdiu bulliat super ignem lentum factum de lignis ficcis, donec inflammetur, & redeat ad suum statum, & inspissetur, & densitatem habeat.

In lebate amplo lithargyrium præparatum & oleum, horarum xij spatio, ut simul nutrantur, impones. Postea ignem lento, & leni, ne nigrescat aut uratur, ad crassitiem concoques. Tum pinguedinem injicies, perpetuo & sine mora, spatula palmea, aut phœnicea eadem die abscissa, quo pharmacum conficietur, alioqui prius excisa succum amittit, vel illius loco radice cannæ, vel saligno ramo, vel quercino, vel mespillino aut ejus arboris ramulo, quæ astringendi vim immodicam habeat. Quibus ad perfectam concoctionem decoctis, ab igneque depositis, & parum refrigeratis vitriolum romanum seu album pulverisatum, ut liquefcat, injicies: quo liquato & omnibus refrigeratis magdaleones finge.

Alii

PHARMACEVTICÆ. 213

Alii liquore convenienti vitriolum
 dissolvunt, & in lithargyrio cocto &
 extra ignem admoto paulatim affun-
 dunt, & ut mucagines coquunt: deinde
 ab igne deponunt, & eo reperfuso mag-
 naleones ad usum constituunt. Ani-
 madvertendum erit inter coquendum,
 ut humiditas naturalis spatulæ in li-
 thargyrio remaneat, & omnino cum eo
 consumatur. Itaque dum diutius co-
 quetur lithargyrium, videbisque extre-
 mitatem spatulæ desiccari, illa pars
 sicca præscindi debet ad humidum us-
 que, ut nova spatula movendo novus
 succus reddatur in lithargyrio, idque
 sæpius repetendum erit, donec multis
 reiectis taleolis spatula pro brevitate
 inutilis derelinquatur, & succum hu-
 moremque spatulæ sæpius renovatæ li-
 thargyrium retineat. Permulti istud
 medicamentum componunt, scilicet
 ex lithargyrii lib iij. Olei veteris &
 axungie porcine æquis partibus, Vi-
 trioli ℥ iiij. Alii vero sine oleo lithargy-
 rium aqua cum porci axungia portio-
 ne, & vitrioli ℥ iiij. perficiunt. Verum
 (ut quod verissimum est notum sit) pri-
 ma descriptio cæteris omnibus ante-
 cellit) sive à Mesue sive à Galeno sit li-
 teris

214 INSTITVTIONES

teris tradita) & in officinis magis est
usitata, quia certa videtur proportio
olei & axungiae ad nutriendum, & co-
quendum lithargyrium, ut experti fu-
mus.

C A P. XII.

*Emplastrum contra rupturam, seu de pelle
arietina, Præpositi ex 6 particulis lib. 2.*

℞. Picis navalis vel Calceariorum,
Aloes, ana ℥ iij.
Lithargyrii aurei,
Cerae rubrae,
Colophoniae,
Galbani,
Ammoniacy, ana ℥ ij.
Visci quercini, ℥ vj.
Gipsi usti,
Vtriusque aristolochiae, ana ℥ iiij.
Myrrhae,
Thuris masc. ana ℥ vj.
Terebinthinæ, ℥ ij.
Ysculi, seu vermium terrestrium
in vino austero lotorum, &
exsiccatorem.
Gallarum, non perforat: sed vi-
ridium.
Vtriusque consolidæ,

Boli

PHARMACEVTICÆ. 215

Boli armenia, ana ℥ iiij.

Sanguinis humani, lib. j.

Antequam methodū huiusce emplastrī aggrediamur, notandum erit, quantitatem picis, ceræ, & colophoniæ, tum & gummi dissoluta, & cocta, viscum & vitumumen pellis, quæ omnia corpus emplastrī huius faciunt, minime sufficere ad emplastrī consistentiam, & ctassitiē, quam ligationem appellamus, nisi ponatur ceræ & terebinthinæ augeatur: vel illorum pondus nolis augere, addenda sunt lib. j. aut ℥ ix olei, convenientis effectui emplastrī: vel olei loco poteris addere lib. β. vel ℥ ix ad summum, unguenti Comitissæ, quod maxime mihi confidetur ad huius unguenti naturam & proprietatem accedere. Quod si neque pondus prædictorum augeamus, aut nihil olei, vel unguenti addamus, successu temporis emplastrū nullam consistentiam aut corpus habebit, sed potius formam pulveris, ut multoties expertus sum. Quare consulerem ut hac sequenti methodo componeretur, valde enim emplastrica & methodica est.

Integram arietis pellem, statim ubi ossa ab ariete divellitur, accipere convenit, eamque in minutissimas partes dividere,

216 INSTITVTIONES

dividere, & in lib. circiter 100. aquæ pluvialis & aceti, diutissime coquere, donec maneant tantum pili. Tunc totum decoctum calidum intorqueatur & exprimitur. Expressionis ipsius quantitas sufficiens refrigerata in gelatinæ, aut bituminis modum condensata (quod erit signum perfectæ coctionis, & dissolutionis ad pulveres congregandos & incorporandos) accipiatur, in quo dissolvitur viscum quercinum præparatum, quo dissoluto totum igni levi apponetur & statim ceram minutim concisam, ut liquefiat, cōjicies: deinde picem frustulatim divisam pariter, ut liquefiat, impones. His omnibus liquatis, & ab igne depositis, & parum refrigeratis, lib. ℥. ad summum ℥. ix. unguenti Comitissæ commiscebis, ad ligationem. Paulò post galbanum, & ammoniacum seorsim vino austero dissolutum (vult Guido in aceto dissolvi) & coctum, una cum terebinthina incorporatum, spatula tamen movendo, conjunges (modus autem solutionis ac coctionis, satis à nobis hæc Sect. capit. 9. explicatus fuit) de simplicia arida separatim & tenuissime pulverisata & cribrata ordine & hæc methodo sequenti insperges, ut lithargyrium

gyrium præparatum, gypsum, bolum
 irmenam cum aqua rosacea vel plan-
 agine lotam, aristolochiam & utram-
 que consolidam, ysculos præparatos,
 sanguinem humanum optime collectū.
 Ultimo vero myrrham, thus, colopho-
 niam, & aloen: agitabisq; simul omnia
 ne ulla intermissione cū spatula, eousq;
 dum sint subacta & mixta omnia. Insu-
 per spatio unius diei, ut exactior fiat in-
 corporatio & permixtio, in mortario
 cum pistillo mediocriter calido mas-
 sam tractabis, Peracta autem agitatio-
 ne & tractatione, manibus oleo viola-
 ceo unctis, super marmore oleo eodem
 uncto, magdaleones formabis, quos ad
 sum servabis.

COLOPHONIÆ.] Colophonix
 Pro re resinarum ratione, ex quibus confi-
 nitur, variæ sunt species, unde alia can-
 dida, alia mollis, crudaque est, a pineo
 el piceo caudice emanans, & olei co-
 rem referens. Pinguis, quæ vera est
 colophonia, olim ad nos ex colophone-
 niæ urbe, unde nomen sumpsit, defe-
 cebatur. Alia sicca, cocta sive fricta,
 acida, quæ nihil aliud est, quam fex
 distillatæ terebinthinæ, aut terebinthi-
 na arte in hunc modum cocta, videli-

K

ces

218 INSTITVTIONES

cet ex partibus duabus terebinthinæ, c
parte una aquæ pluvialis, quæ hodie
officinis nostris colophonia cognom
nata est. Sed quia vera desideratur, eju
inopia priore utimur, quæ probatur lu
cida, levis, odorata, calculorum exper
Si plura desideras, poteris Diosc. lib. 1
cap. 78. legere, ubi agitur de pice.

VISCI QUERCINI.] Viscus per
nō est arbor, sed in arboribus vivit, præ
cipue in quercu, sudorq; arboribus dictu
tur. Gignitur quoque in malo, piro, &
plerisque aliis arboribus: quin etiam i
quorundam fructuum radicibus. Fit qu
pluribus ac diversis modis, verum præ
stantissimus secundum Diosc. lib. 3. cap
87. est, qui è granis in quercu nascenti
bus extrahitur, & probatur recens, in
tus porraceus, extra fulvus, sine cortice
levissimus, qui nihil asperi surfurosi qu
conceperit, & ille sumendus est, in om
nibus compositionibus, quæ immodi
cam virtutem habent astringendi.

GYPsi Vsti.] Lutetiana urbs no
stra maxime gypso abundat, ibiq; com
mode, & frequenter nativum seu cru
dum eruitur, deinde coctum ad ædificia
fabricanda expetitur. Albertus Magnus
vult quasi extremitatem lapidis specu
laris

PHARMACEVTICÆ. 219

aris esse : alii genus lapidis similis ni-
ro habentis venas latas, esse. Res ad-
modum cognata est calci, non tamen
ita est calidum, differtque à calce : nam
calx reſtincta humore aliquo non olea-
giſoſo acquirit calorem, gypſum vero
reſtinctum non accenditur, neque ca-
et. Eſt autem gypſum duplex. Vnum
quod dicitur alini ſpeculum, ſquam-
oſum, & lucidum : aliud concretum non
ſquamoſum, neque lucidum. Præſtan-
tiſſimum eſt recens, lucidum non diu
conſervatum, poſt coctionem aquæ im-
miſtum ægre lapideſcit ac coit. Vritur
autem ſic.

Gypſum lucidum ſquamoſum & in-
tegrum accipito, & in crucibolo, fuſo-
ioque furno, ubi ſint carbones accenſi
circumcirca imposito, ignē continuā-
do, eoſque dum per album nivis modo
deveniat, leve, ac friabile, & ſi digitis
conoveatur, in pollinem abeat: hoc enim
modo ad uſum dictum id accipiendum.
ſactenus de Gypſo. Plura Plinius lib.
6. cap. 24. & Georgius Agricola lib. 5.
oſſilium genera multa annumerat.

SANGVINIS HUMANI.] Præpoſitus
in hoc emplaſtro ſanguinem humanum
requirit, qui ſententia plurimorum

K 2

eligē

220 INSTITVTIONES

eligi debet ab homine, qui à vigesimo
 quinto anno ad trigesimum accedat
 qui uxorem non duxerit, nec rem cum
 ulla habuerit, nec obnoxius sit morbis
 qui in lætitia vixerit absque ebrietate
 seque exercuerit in equorum agitati-
 one, aut in pila palmaria (si talem re-
 perire possis) non autem ex homine
 ruffo, ut plurimi sentiunt, cum tem-
 peramento is sit magis bilioso, & me-
 lancholico: talis enim sanguis minimè
 idoneus est facileque putrescit. Qui
 verò, si nullo pacto talis possit reperiri
 nec ab homine ruffo & temperato, ut
 sufficiat ad compositionem? Censerem
 ubi sanguis deficit, suillum sumendum
 Galeni authoritate lib. 10. Simpl. capit.
 1. ubi de sanguine dicit, sanguinem in-
 telligendum esse animalis secundum
 naturam se habentis, alterius verò san-
 guinem humore aliquo mixtum esse
 qui quovis tempore facile ad manum
 haberi potest: cum etiam ex Galeno
 lib. 10. Simpl. capit. 2. maxime tem-
 perie sit humano similis. Probatque Ga-
 lenus eos, qui sanguinis humani loco in
 morbis suillum cominendant. Cujus
 sententiæ Avicenna libro secundo tra-
 ctatu 2. capite 610 astipulatur, dicens,

PHARMACEVTICÆ. 22r

in omni re sanguinem humanum & suillum similem esse. Alij autem recentiores medici bovillum fibrosum ad astringentis scopum potius assumunt, quod revera melior propter astringentem sit. Hactenus de sanguine humano. Nunc ad illius collectionem accedamus. Accipiat sanguis humanus ex homine boni habitus, beneque temperati, & medius fluens, quia tenuior est: in olla fictili bene cocta & plumbata, in qua quieverit & incocta fuerit aliquot horis aqua pura, & sincera, ut odor terrestres deperdatur, vel si mavis vase vitreo excipiat, & linteolo raro contegatur, solique, eousque dum siccum sit, exponatur.

C A P. X I I I.

Emplastrum de granis Lauri, ex dist. XI.

Mesuae de unguentis & emplastris Vsuale.

℞. Olibani, 1
Mastiches,
Myrrhæ, ana ℥ iij.
Granorum lauri, ℥ viij.
Cyperī,
Costi, ana ℥ ij.

K 3

Mellis

222 INSTITVTIONES

Mellis colati quantum sufficit ad aggregandum: & extendatur in panno & calidum superponatur, ubi oportet. Si autem triplicatur in eo cyperum, & ponatur de stercore caprarum, aut vaccarum sicco ad pondus omnium, invenitur mirabile ad hydropisim.

Per angustissimum cribrum hæc omnia electa, secundum veram illorum electionem, in tenuissimum pulverem separatim tundito, & cribrato, deinde cum sufficienti quantitate mellis optimi crudi non autem cocti (quia mel nusquam in emplastris & ceratis coqui debet propter tenacitatem) sed modice calidi excipiantur: dempto olibano mastiche & myrrha, quæ cum massa tota frigida fuerit simul permisceantur: & magdaleones ad ulum formantur.

Verum in conficiendo hoc aggregat. caveat myropola simplicia ista scilicet myrrham, mastichen, & olibanum melle calido inspetgere, & conjungere, ne in grumos abeat.

STERCORIS CAPRARVM AVT VACCARVM.] Caprarum silvestrium juvenum pilulas recentes, cum herbas pabulantur, tempore veris excipe, & in

PHARMACEVTICÆ. 223

in paropside munda linteolo cooperto
ad ficcandum soli expone: deficcatae
necessitati seruentur. Sic humidum &
fecens stercus vaccinum, cum vaccæ
pascuntur herbas vere (propter mol-
lificationem & resolutionem) accipito
& in disco terreo, linteolo cooperto,
sub dio exponito, quousque arefactum
erit: arefactum ad usum condito.

C A P. X I V.

Emplastrum de Mucaginibus.

℞. Mucag. seminis lini,
Mucag. radicum altheæ,
Mucag. seminis fœnugræci,
Mucag. mediani corticis ulmī,
ana ℥ iiij ℥.
Oleorum liliacei,
Chamæmelini,
Anethini, ana ℥ j ℥.
Ammoniacy,
Galbani,
Opopanacis,
Sagapeni, ana ℥ ℥.
Crocī, ℥ ij.
Ceræ novæ Cit. lib. j ℥ viij.
Terebinthinæ, ℥ ij.

Fiat Emplastrum.

K 4

Vt

224 INSTITUTIONES

Vt superiori huiusce Sectionis capit.
5. docuimus, portionem radicum, semi-
num, aquæ, ad infusionem, ut ab his mu-
cagines extrahantur, simili modo quan-
titas mucaginum huic emplastro præ-
scripta extrahi debet: deinde extracta
una cum oleo liliaceo chamæmelino,
anethino, & cera frustatim secta &
cum oleis liquata ad eorum fere con-
sumptionem incoqui, spatula lignea in-
ter coquendum, ne vrantur, celerrime
agitari debent: quantitate autem con-
sumpta, totumque ab igne semotum,
fortiter agitetur, donec omnino inte-
pideretur. Tunc quatuor gummi genera
decocto chamæmeli meliloti aut aceto
vel vino per se soluta, coctaque, non ad
naturalis humidi, sed ad decocti vel
aceti, aut vini peremptionem, & cum
quantitate terebinthinæ hic descripta
incorporentur. Demum crocum optime
pulverisatum absque ulla mistione (quia
aliquando solent Pharmacopolæ tyro-
nes amygdalas decorticas ad coloran-
dum & ad pondus augendum ponere) in
medicamine ita parato adiunges, mag-
daleonesque ad usum effinges. Alij cum
magdaleones effingunt, super marmore
crocum aspergunt, quod minime ap-
probo.

CAP.

PHARMACEVTICÆ. 225

C A P. X V.

Emplastrum de Minio Ioannis Vigonis.

℞. Olei rosati,
Olei myrtini simpl.
Vnguenti populei, ana ℥ iiij.
Pinguedinis gallinæ, ℥ ij.
Sepi castrati,
Sepi vaccini, ana ℥ vj.
Pinguedinis porcina. ℥ viij.
Vtriusque lithargyrij, añ. ℥ iiij ss.
Cerusæ lotæ ℥ iiij.
Minij, ℥ iiij.

Bulliant omnia simul baculo agitan-
do lento igne, donec acquirant colorē
nigrum, quo facto ignem fortificando,
iterum bulliant per dimidium horæ:
deinde addantur

Terebinthinæ clariss. ℥ iiij.

Ceræ albæ quantum sufficit.

Et iterum bulliendo fiat ceratū molle.

Summa diligentia separatim utrum-
que lithargyrium, cerusa & minium du-
rantur super porphyrium, quousque
optimam levigationem, quemadmo-
dum superioribus emplastris docuimus,
adepta sint, interdum molula moven-
do, liquoreque, compositioni con-

K 5 venienti

226 INSTITVTIONES

venienti asperfo, ut facillime in tenuiffimum pulverem abeant. Liquor autem aqua rofacea erit. Deinde optime levigata, una cum oleo rofaceo, myrtino spatula lignea ad nutritionem in lebeti amplo tractentur & super prunas leviter indefinenter spatula agitando coquantur, donec parum concrefcant, & in compagem abeant. Mox pinguedinem porci & gallinae injicies & percoques, eousque dum coctio fit in formam cerati & nigrefcere videatur. Tunc fetum castratum, & vaccinum confractum fimul, ut liquefcant, impones. Quibus liquatis & ab igne depositis, populeonis unguentum conjunges, paulo post terebinthinam permiscebis, hisque omnibus fimul mixtis, manibus tractando & verfando magdaleones formabis. Insuper fi ceram in hoc emplastro placeat addere, ea quamvis non fit opus, poteris fruftatim incisam addere, postquam mineralia abierint in compagem, aut ad mellis crassitiem.

MINII.] Diversa apud auctores omnes de Minio est opinio. Nos quid sentiant, hic narrabimus. Alii idem cum Cinnabari esse volunt. Dioscorides cap. 69. lib. 5. diversum quid à cinnabari esse vult,

PHARMACEVTICÆ. 227

vult, his verbis. Hallucinantur qui Cinabarim Minio eandem esse existimant, verum nullas illorum adfert differentias, nisi ratione loci, nec eorum naturam explicat, dicit enim minium in Hispaniis ex quodam lapide argenteæ arenæ permixto temperari solere, alioqui non dignosci: fornacibus vero in florentissimum & fragrantissimum colorem permutari: in metallis strangu-
 lantem halitum eructare, ob idque incolas faciem vesicis obvelare, ne eo halitu infestentur: eoque pictores uti ad sumptuosa parietum ornamenta. Cinnabarim vero ex Ægypto deferri, & magno constare: atque hactenus inveniri, ut versicoloribus pictorum lineis satisfaciat, & hinc quosdam existimasse, sanguinem esse draconis, vimque habere eandem cum hæmatite lapillo: hæc Dioscorides. Quid vero sit Cinnabaris, non explicat: unde variæ auctorum sententiæ. Plinius lib. 33. cap. 7. & Solinus cap. 38. ajunt esse sanguinem draconis, elisi elephanto-
 rum morientium pondere, permixto utriusque animalis sanguine. Totam historiam lege apud Plinium cap. 12. lib. 8. qui minium in argentariis vult

K 6 metallis

228 INSTITVTIONES

metallis inveniri, diversisque modis alterari. Sed quia Theophrastus, & multi alii viri graves, Cinnabarim cum minio confundunt, de his simul dicemus: & primum de minio factitio, cujus sunt tres species. Prima fiebat ex arena quadam rubea & splendente, Cilbianis agris prope Ephesum, quam emolliebant, & abluebant & cinnabarium conficiebant: cujus rei auctor fuit Callias Atheniensis, qui coquens arenam illam, & existimans se ex ea aurum posse conficere, minium confecit: & hæc species cinnabaris est, miniumque artificiale antiquorum. Altera species fiebat ex plumbo adusto, & vocabatur minium secundarium, eo quod secundum locum præstantiorem obtineret. Tertia cinnabaris, seu minii species antiquorum erat, quam conficiebant ex illo lapide, qui vocatur anthrax (id est) carbunculus: qui lapis subrubri coloris est, in speciem ferri, & ex hoc lapide, (teste Vitruvio capit. 8. lib. 7. de architectura) crebræ lacrymæ argenti vivi emanant, quæ à fossoribus statim colliguntur, & dum coquitur maximam copiam argenti vivi emittit: quod argentum ubi extraxerunt lapidem iterum

um coquunt & ex eo Cinnabarim con-
 ciunt. Triplex ergo antiquis Cinna-
 baris artificiosa erat. Vna ex arena
 rubra, alia ex plumbo usto, tertia ex
 anthrace lapide. Apud nos duplex tan-
 tum minium est. Vnum quod fit ex lon-
 ga coctione, artificio chimistarum, ar-
 genti vivi, & sulphuris: & Cinnabaris
 vel Cinnabrium apud nos pharmaco-
 eos dicitur. Alterum minium in nostris
 officinis reperitur, quod fit ex cerusa
 exusta, & nihil aliud est quam vera fan-
 dix antiquorum, cuius meminisse vide-
 tur Plinius capit. 6. lib. 35. naturalis hi-
 storix, & si Virgilius ecloga 4. herbam
 esse putaverit, hoc versu: Sponte sua
 andix pascentes vestiet agnos. Et hæc
 quidem de Cinnabari arte facta, quæ à
 Plinio, & Vitruvio minium appellatur.
 Theophrasto vero, tria sunt naturalis
 minii genera. Vnum fossile, durum,
 lapideum, ex fodinis argenti effossum
 quod in usu habetur, & officinis Cinna-
 baris fossilis dicitur. Secundum sagit-
 tis decutiebatur ex altissimis, & inac-
 cessis rupibus, quod nobis ignotum est.
 Tertium erat cinis coloratus, qui in
 hisdem fodinis reperiebatur, & de hoc
 genere Cinnabaris loquuti sunt Græci,

K 7

Diosco-

230 INSTITVTIONES

Dioscoride excepto. Vnde Galenus lib.9. de Simpl. medicament. facult. capit. 39. Cinnabaris modice acrem facultatem obtinet: habet verò astrictio- nis quidpiam, & est metallicum quid- dam, ideoque erodit. Dignoscitur au- tem cinnabaris vera à factitia & artifi- ciali hoc modo. Accipe laminam fer- ream, ignitam, & super ipsam pone cinnabarim: deinde cum incanduerit, refrigerare permitte: si colorem reti- nuerit, vera est & nativa, si nigrescat, factitia & artificialis. Et (ut verum fa- tear) minium verum colore, & ponde- re, cinnabarim factitiam refert, quam- quam nonnihil ea lucidius, & lividius sit: ut videatur artem natura imitata: estque id minium sapore acerbo & astringente. Quantum vero ad cinna- barim Dioscoridis spectat, Matheolus in Dioscoridem capite de cinnabari, & Fallopius tractatu de metallis seu fossilibus, alique recentiores, non vul- garis auctoritatis viri volunt, sangui- nem draconis esse cinnabarim Diosco- ridis. Estque gummi colore & substan- tia sanguini simile, quod non aliunde, quam ex Africa defertur, nec inde co- piofum, pictoribus expetitur, ut intento
ejus

PHARMACEVTICÆ. 231

ejus colore, purpureas rubentesque
concincent umbras: quod viribus hæ-
maritæ lapillo omnino respondet. Nam
(ut experientia docet) vi astringendi
pollet, & majore quidem, quam hæma-
tites. Quod si plura requiras, lege Ma-
theolum in Dioscoridem loco supra
citato.

C A P. X V I.

Emplastrum pro Stomacho, Præpositi.

℞. Rosarum rubearum, ℥ j.
Absynthij, Comm. & ficci,
Menthæ Vulg. ana M. j.
Spicæ Indicæ,
Cinnamomi,
Ligni aloes, ana ℥. ss.
Galangæ,
Calami aromatici, ana ℥ ij.
Cariophyllorum,
Macis, ana ℥ j.
Mastiches, ℥ j. ss.
Styracis Calamites, ℥ ij.
Ladani puri, & mollis,
Ceræ, ana ℥ vij.
Terebinthinæ, ℥ j.

Pulverisanda pulverisentur, deinde
trrorentur cum vino cotoneorum, & in
mortario

mortario conterantur: & fiat ceratum cum

Olei de spica Nardi,

Olei myrtillorum, ana ℥ iij.

In mortario calido cū pistillo calido.

Ladanum purum in minutissimas partes divisum cum oleis de spica Nardi & myrtillorum igne maxime lento liquabis, postea ceram in partes confractam injicies: qua liquata ab igne removebis, tum terebinthinam infundes, deinde styracem mollesactum conjunges. Sic autem styracem mollem reddes: in mortario modice calido, pistillo pariter calido styracem tractabis, vino aut succo cotoneorū modice paulatim asperso, donec mollescat. Quibus ita paratis pulveres simplicium prescriptorum simul, vel per se pulverisatorum ex artis præscripto projicies. Demum totam massam in mortario modice calido & pistillo calido diligenter tractabis, ita ut nullum ab altero secerni possit. Sicque emplastrum arte quam maxime elaboratum habebis. Notandum tamen simplicia dum teruntur, vino, & cotoneorum succo madefacienda, & aspergenda esse, ne subtilior pars tenues vanescat in auras.

Quod

PHARMACEVTICÆ. 133

Quod si istud emplastrum in forma solida conficere velimus, ℥ ij ceræ adblendæ erunt, aut dosis oleorum minuenda, & olei de spica Nardi & myrtillorum ana ℥ j. affundenda. Si vero in forma cerati liquidi, vel unguenti, auctoris descriptio erit imitanda. Sed ut verum fateamur in nostris officinis emplastri formam conficimus, & habetur paratum.

C A P. X V I I.

*Emplastrum de meliloto Mesuæ ex dist. XI.
de unguentis & emplastris Vsuale.*

℞. Meliloti flor. ℥ vj.
Florum chamæmeli.
Seminis scœnugræci,
Granorum lauri excorticati,
Radicum althææ,
Absynthii vulg. ana ℥ iij.
Seminis apii,
Cordumeni, ejus loco carui,
Ireos,
Cyperi,
Ammeos, id est Sem.
Spicæ Nardi,
Cass. lignæ, id est Cinamomi
ana ℥ ij.

Sam-

234 INSTITVTIONES

Sampfuchi, id est, Majoranæ ʒiij.

Ammoniacy, ʒ x.

Styracis calamitæ,

Bdellij, ana ʒ x.

Terebinthinæ, ʒ j. ʒ.

Ficum pinguium, num. xij.

Sepi Caprini,

Resinæ, ana ʒ ij. ʒ.

Ceræ flav: ʒ v.

Olei sampfuchini,

Olei de Spica quantum sufficit.

Aquæ decoctionis fœnugræci,

Chamæmeli,

Meliloti quantum sufficit, vel ʒ viij.

Ad infundendum infusione diligenti
misceantur & conficiantur.

Imprimis necessarium (ut singula quæ
optime in hoc emplastro præparentur)
quædam simplicia emplastrum ingre-
dientia triturare, & contundere unum
quodque suo ordine convenit. Nam
minutim cyperus secandus & obiter
contundendus, deinde radices althææ
mediocriter siccas ac incisas, fœnugræ-
cum, iris & cassia lignea leviter, qua-
ter, aut quinquies pistillo tundenda,
tum spica nardi in tenuissimas partes
incisa addenda, deinde baccæ lauri &
semina omnia, folia & flores, ut absyn-
thium

PHARMACEVTICÆ. 235

hium sampfuchum, melilorum chamæ-
 nelum: paulo post styracem (alij radi-
 ces althææ & fœnugræcum separatim
 decoctione fufficienti fœnugr.
 smachamæmeli, & melliloti infundunt, ut
 ex eis mucaginem habeant: deinde mu-
 caginibus extractis cum ficibus tufis
 coniungunt: pariter styracem cum pauca
 decoctione prædicta molliunt & post-
 quam gummi genera soluta fint, cum
 cætera & fepe conjuncta & incorporata
 compositioni addunt) quæ omnia fim-
 plicia accurate trita & per cribrum trās-
 miffa fervabis donec cætera fint præpa-
 rata. Deinde ammoniacum & bdell-
 ium (fi molle fit) feperatim infundes
 in quantitate fufficienti decoctionis
 prædictæ, fi vero ficcum fit bdellium, in
 pulverem redigendum erit, fuoque or-
 dine, nempe post styracem imponen-
 dum. Alij in aceto fortiffimo ad du-
 plum vel triplum, ut commode fol-
 vantur imbuunt, & ad humidi consum-
 ptionem lento igne coquunt. Alij am-
 moniacum cum prædictis fimplicibus
 in pulverem redigunt, quod facilime
 poteft pulverifari, ut experientia nos
 docuit, verum præftat diffolutio quam
 trituratio. Quibus folutis & coctis tere-
 binthina admifceatur, tum hæc gummi
 fepa-

236 INSTITUTIONES

separatim ut pulvis prædictus servan-
tur. Postea ficus minutim incisæ in
mortario lapideo cum pistillo ligneo
terantur, paulatim adjecta pauca deco-
ctione scænuigr. chamæmeli & meliloti
intertundendum, deinde super cribrum
inversum & angustum cochleari aver-
sæ transcolentur, ad partemque ut supra-
dicta servantur, donec simplicium om-
nium præparatorum commixtionem
facias. Alii ficus in substantia cum præ-
dictis simplicibus tundunt, quod revera
alienum est à methodo. His itaque sic
paratis massam emplastri in hunc mo-
dum conficies.

Ceram frustatim igne lento baculo
movendo liquabis, qua liquata sepum
caprinum pariter divisum injicies, pau-
lo post resinam pulverisatam, quibus e-
liquatis, ab igneque semotis & parum
refrigeratis gummi prius præparato-
rum una cum styrace & pulpa ficuum
conjunges, movendo ut prius baculo:
ad ultimum vero pulveres jam paratos
addes: demum cum omnia optime cō-
mixta & incorporata fuerint, totam
massam pones in mortario cum pistillo
modice calido, spatio duarum horarum
contundes, ut conveniens omnium fiat
mixtio,

mixtio, velut facilius permisceantur
 addendo oleum nardinū & sampsuchi-
 num. Deinde magdaleones formabis.
 Cavendum tamen in hoc parando, ne
 plus olei quam par sit ponatur; alioqui
 tenerum ac molle esset emplastrum.
 Præterea si quis in hoc mucagines ex
 semine fœnugræci, radicibus althææ,
 pro eorum substantia usurpare velit, di-
 ligenter animadvertat ne coctæ &
 transcolatæ pondus excedant simpli-
 cium, ex quibus fiunt; quod itidem in si-
 milibus observandū, si ex eis mucagines
 conficias, quod sane ut diximus est præ-
 ter artem manuariam: rursus dosis a-
 quæ decoctionis chamæmeli & melli-
 toti à nobis in fine descriptionis hujus-
 ce emplastri scripta sufficere videtur,
 ad maceranda ea quæ macerari debent,
 sive ad dissolutionem gummi, sive ad
 mucagines extrahendas: si vero ve-
 nit pharmacopœus tantum dissolutio-
 nem gummi, minuenda erit dosis deco-
 ctionis prædictæ, sufficientque ana 3 x.
 Quare diligenter perpendat, antequam
 hoc emplastrū aggrediatur utrum ma-
 cit substantiam totam quorundam sim-
 plicium vel mucaginosum liquorem.

CAP.

CAP. XVIII.

*Emplastrum pro matrice authoris incerti,
quod à Præposito in fine VI. particulæ
additionis lib. 2. describitur Vsuale.*

℞. Radicis bistortæ, ℥ iij.
Ligni aloes,
Santali moschatelini,
Nucis moschatæ,
Berberis,
Antheræ, ana ℥ ij.
Cinnamomi,
Cariophyllorum,
Schœnanthi,
Florum Chamæmeli, ana ℥ j.
Thuris, Masc. seu Olibani,
Mastiches,
Aliptæ moschatæ, &
Galliæ moschatæ, sunt Trochisc.
Styracis calamitæ,
Styracis rubei. ana gra. xv.
Moschi, gra. vij. β.
Ceræ Citrinæ, ℥ iiij. β.
Terebinthinæ, ℥ i. β.
Ladani puri, lib. i.
Picis navalis, ℥ ix.
Fiat Emplastrum.

Cera

PHARMACEVTICÆ. 239

Cera confracta, & ladanum diuisum,
 cum uncijis duabus olei convenientis
 compositioni (oleum verò nullum ca-
 pit hæc descriptio, quale autem de-
 beat fumi, dubitari posset: nam si
 agatur de suffocatione matricis, oleum
 rosmarini aut ruthæ fumi potest, sin
 quaestio est de frigiditate & humidita-
 te matricis corrigenda, nardinum
 officinale, aut chamæmelinum suffi-
 cere potest) igne lento spatula lignea
 agitando liquentur: liquatis, nec ab
 igne depositis, picem navalem cola-
 mam, ut lique scat impone, mox cum ab
 igne deposueris, terebinthinam, & sty-
 racem calamitam cum oleo dicto solu-
 am: cum verò hæc omnia optime li-
 quata & commixta fuerint, & aliquid
 caloris deposuerint, reliquorum simpli-
 um pulveres arte præparatos in hæc
 consperges, simulq; commiscebis, ut ra-
 nicem bistortæ, santalum, lignum aloes,
 chænanthum, chamæmelum, antherā
 berberim, cariophylla, cinnamomum,
 nucem, gulliam & aliptam moschatam,
 tyracem rubeam, statim pulverem te-
 rissimum mastiches, & olibani, ce-
 rissime movendo, addes: paulopost
 onoschum liquore minime unctoso
 disso-

240 INSTITVTIONES

dissolutum conjunges: cumque omnia fuerint optime commixta & subacta totam massam in amplum mortarium metallicum, modice calidum mitte, & probe pistillo ferreo mediocriter calido tundito, ac tractato, donec perfectum in unum coeant: demum magdaleones ad usum fingito.

Notandum tamen erit, multos phariseos & macopolas esse, qui alia utantur methodo, quam & si adhuc non observauerimus, eam tamen non improbamus, hæc autem talis est. Ceram igne lento liquant, deinde picem navalem percolatam addunt, postea ab igne deponunt & terebinthinam infundunt, statim pulveres simplicium ordine commiscunt deinde cum omnino hæc refrixerint pulverem thuris & mastiches projiciunt, spatula semper ducendo, unamque massam conficiunt, quam servant donec ladanum sit liquefactum, ut facilius tota massa prædicta cum ladanum misceatur. Sic autem lanum molle & liquidum reddunt. Ladanum frustatim incidunt, & in mortarium satis calidum projiciunt, ac pistillo satis calido cōtundunt, & parum olei convenientis compositioni affundunt, deinde magdaleones ad usum conformant. Cæte-

PHARMACEVTICÆ. 241

Cœterum (verum si fateri licet) viz hæc omnia possunt commisceri, nisi aliquid olei compositioni convenientis addatur, ut multoties sumus experti, quare quantitatem à nobis descriptam retinendam esse existimamus.

SECTIO II.

De Vnguentis.

HActenus Ceratorum, & Emplastrorum in officinis nostris passim prostantium, simulque illorum materiam seu subjectum, nec non componendi methodum, qua potuimus diligentia, & sedulitate pertractavimus. Reliquum est ut de unguentis breviter percurramus: quorum subjectum non aliud est quam ceratorum & emplastrorum, ut antea his verbis explicuimus. Neque enim inter se tam eorum ratione differunt, quæ ipsa ingrediuntur, quam consistentia: nam quæ ingrediuntur cerata, etiam in emplastris & unguentis admittuntur. His itaque definitis & constitutis, ad unguentorum conficiendorum methodum accedentes ab unguenti primum definitione exordiemur. Est autem unguentum

L tum

242 INSTITVTIONES

rum mollis quædam confectio, ex sti-
 pium partibus, metallicis, minerali-
 bus, terra, & animalium partibus in-
 diæ inter cerata & linimenta consister-
 riæ, quæ omnia præparantur & mi-
 centur ad unguentum conficiendum
 eadem methodo, quæ prius à nobis de-
 scripta est in ceratis & emplastris. Fit
 autem unguentum duplici modo, vi-
 delicet cum igne, & sine igne; cum
 igne, ut omnia unguenta, & consimi-
 lia, quæ multa simplicia, ut ceram, li-
 thargyrium, axungiam recipiunt: sine
 igne, sola nutritione & subactione, ut
 nutritum seu tripharmacum. Differt
 que unguentum à linimento, quia in
 unguento conficiendo ponitur olei un-
 cia una, pulverum ʒ j. ad summum
 ʒ j ss. ceræ ʒ ij, vel ʒ iij. Tamen ho-
 die componentis arbitrio relinquitur
 dosis ceræ, & à Medicis sic (ceræ
 quantum sufficit) scribitur: dummo-
 do seruetur consistentia corporis cras-
 sioris in unguento, liquidioris in lini-
 mento. Linimentum enim est mollius
 unguento & componitur ex his, quæ
 unguenti compositionem ingrediuntur
 cum minori cera, vel incrassantium
 portione, vel absque speciebus. Pro-
 portio

PHARMACEVTICÆ. 243

portio linimenti est, ut pro olei uncia
na, ponatur ceræ 3 j. Alii sextam
partem uncia ponunt: & cum aliquid
cum miscetur, de cera nonnihil de-
rahitur, sed sæpissime conficitur cum
era & oleo, sine pulverum commix-
ura. Demum, ut nunc quæ antea di-
simus, dilucidius intelligantur, singu-
atim unguenta à nobis Pharmacopœis
sitata, & cognita, explicanda susci-
piemus.

C A P. I.

Vnguentum album Rhasis.

℞. Olei rosati, ʒ ix.
Cerusæ albæ, ʒ iiij.
Ceræ albæ, ʒ ij.

Confice sic.

Manu fricetur super cribro tenuissi-
mo cerusa, ut transmittatur: transmis-
sa in mortario metallico spatulo aliquot
horarum friando levigetur, ut magis
educatur in pollinem. Deinde super-
infunde ceram liquatam in balneo ma-
ræ cum oleo rosaceo: tum ducantur
æc atque agitentur (dum calet) ce-
rrime, pistillo ferreo, quousque om-
nia sint probe commixta. Et hoc modo

L 2

unguen-

244 INSTITVTIONES

unguentum erit paratum: quod ad usum
necessarios recondes.

Alii alia methodo utuntur, nam ultra
descriptionem prædictam, ovorum al-
bumina, alii lithagyrium, alii mucagi-
nem tragacanthi, alii camphoram se-
cundum morbum addunt.

CERVSÆ.] Plurimi cerusam defi-
niunt esse æruginem aut cinerem plum-
bi. Tamen, ut inquit Dioscorides lib. 5.
cap. 63. Cerusa nihil aliud est, quam
plumbum nigrum acerrimi aceti halitu
liquatam, & incrassatam, & post in mol-
tritum, denuoque cribratum & inte-
nuissimum pulverem resolutum. Mo-
dum autem conficiendi lege apud eun-
dem Dioscori. lib. & capit. citato. De
lotione, electione, & repositione satis
aperte in primo libro, capite 16. dixi-
mus. De viribus & facultatibus, con-
sule Serapionem lib. aggreg. cap. af-
sidhegi, & Avicennam lib. 2. capite de
cerusa. Plinium quoque lib. 34. cap. 18
& lib. 35. cap. 6.

C A P. I I.

Unguentum Tripharmacum seu nutritum.

℞. Lithargyrii triti sicut alcool, P. j.

E

PHARMACEVTICÆ. 245

Et funde super ipsum nunc

Oleum,

Nunc

Acetum,

Et terantur & adæquentur & proprie quantum sufficit.

Mesues neque olei neq; aceti quantitatem definit, cum his verbis utitur; funde desuper nunc oleum, nunc acetum &c. Existimo Mesuem quantitatem olei & aceti reliquisse arbitrio artificis, pro ratione usus unguenti: nam quia hoc unguentum sæpissime vsurpatur ad defensionem inflammationum quæ aliquando leves, aliquando vehementiores sunt: tamen hoc non impedit, quò minus illud unguentum in nostris officinis præparatum habeamus. Cujus descriptio talis est, ponderibus definita. **R.** Lithargyrii aurei coloris triti & loti (secundum scopum) **P.** j. olei rosati immaturi **P.** j. aceti rosati **P.** ß. Confice sic. Lithargyrium tritum & lotum in mortarium plumbeum conjice, illudque cum quadam parte olei pistillo plumbeo agita & tracta, donec lithargyrium justam crassitatem consequutum sit: tunc paulatim aceti portionem aliquam infunde, & ut

L 3

prius

246 INSTITVTIONES:

prius tracta, donec acetum sit cum lithargyro & oleo commixtum: deinde residuum aceti & olei affunde subagitando, videlicet nunc acetum, nunc oleum, donec totum acetum & oleum lithargyrium imbiberit, & unguentum formam adeptum fuerit. Deinde fictum pixide ad usum serua.

Caveat tamen Pharmacopola, illum cum volet preparare, initio multum olei & aceti super lithargyrium affundere, ne submergat: nam cum submergitur, nunquam consistentiam unguentum adipiscitur, nec incorporari potest. Et ideo nutritum vocatur ex conficienda methodo (quia est lithargyrii quaedam nutritio) sitque sollicitus hoc unguentum subagitare spatio unius diei si quam optimum & probe ligatum velit habere.

LITHARGYRII AVRI.] Lithargyrium, & auri vel argenti spuma, idem sunt. Satis copiose diximus de illius locatione in Sectione prima cap. 2. Nunc de materia, variis generibus & extinctionione (si in aliquo loco extinctio desideratur) dicendum venit. Lithargyrium non effoditur, nec reperitur naturale, sed paratur ex multiplici materia
 oppor-

PHARMACEVTICÆ. 247

opportuna, quæ non unica ab auctori-
bus proponitur. Videlicet, unam esse.
ajunt arenam plumbærem, aliam argen-
tum, aliam plumbum, alteram aurum,
alii unicam esse materiam, quod est
plumbum, alii galenam esse materiam
lithargyrii, tamen pro diversitate ma-
teriæ diversa acquirit nomina. Sed an-
tequam ultra progrediamur, illud defi-
niamus. Est autem lithargyrium, secun-
dum quosdam, spuma argenti continens
adhuc aliquid argenti, vel plumbum
exustum cum auro vel cum argento, cu-
jus est usus nobis frequens in unguen-
tis & emplastris. Sed ut verum fatea-
mur, materia lithargyrii est plumbum
exustum cum argento, vel cum auro in
cathinis, in quibus concrescit & colli-
quatum est argentum vel aurum, non
autem ex argento vel ex auro, tan-
quam materia, sed colorem argenti vel
auri referens. Tres species facit Dios-
corides lib. 5. cap. 62. Plinius pariter
lib. 33. cap. 6. Vna, quam molybditim
vocamus, altera argyritis, & chrysi-
tis: tertia plumbago seu molybdena
dicitur. Fit autem prima species, quam
molybditim appellamus, ex arena in
fornacibus conflata, cum perfecte igni

L 4

incan-

248 INSTITVTIONES

incanduerit. Argyritis ex argento fit
 Chryfitis ex auro, non quod fit ex argen-
 to, vel ex auro, sed quia argenti ve-
 auri colorem refert. Plumbago seu mo-
 lybdena fit ex laminis plumbeis, hodie
 apud nos Pharmacopeos usitata. Præ-
 stantissima omnium est Chryfitis, qua
 fulvo colore splendet. Quod si plumbago
 requiris, lege Georgium Agricola
 lib.9. de natura fossilium. Si quis vero
 lithargyro extincto egeat, sic extin-
 guat. Accipe lithargyrium, & frange
 minutim ad quantitatem nucis, & in
 crucibolo fusorioque furno ut ignetur
 & in modum prunæ ardentis rubeat
 expone. Deinde extrahe, illudque in
 aceto, aut vino fortissimo aut liquore
 morbo convenienti extingue: hocque
 ter aut quater iterabis, innovando ace-
 tum aut vinum, aut liquorem conve-
 nientissimum, sicque lithargyrium ex-
 tinctum ad usum habebis, si requiratur.

CAP. III.

Unguentum aureum Mesue.

℞. Cerae citrinæ, ℥vj.

Olei boni, lib.ij.

Terebinthinæ,

Resinæ,

PHARMACEVTICÆ. 249

Resinæ,
Colophonix, ana $\frac{3}{4}$ j β .
Olibani,
Mastiches, ana $\frac{3}{4}$ j.
Croci, $\frac{3}{4}$ j.

In vase ceram frustatim divisam, una cum quadam olei portione igni levi ad liquandum expones: qua liquata, resinam, & colophoniam confractam injicies, ut simul fundantur. Tum ab igne seponas, & statim terebinthinam infunde: quibus quam optime refrigeratis, olibanum & mastichem per se pulverisata immisce, spatula lignea ducendo. Postremo crocum cum reliqua portione conjunctum, vel si mavis dissolutum conjunges. His omnibus commixtis usui reserva: animadvertendum tamen, plures Pharmacopœos illud conficere absque olibano, mastiche & croco ob nimios sumptus. De simplicibus nihil dicemus, cum in Sect. prima abunde ea tractaverimus.

C A P. I V.

Vnguentum Basilicon minus Mesuæ.

\mathcal{R} . Resinæ,
Picis nigræ,

E \S . Ceræ

250 INSTITVTIONES

Cerae cit: ana.

Olei quantum suffi:

Pondera simplicium omisit Mesue
pariter Fuchsius & Præpositus, qua-
quidem descriptionem ex Mesue de-
sumperunt. Tandem ut experientia
docuimus, ponderum certus numerus
nobis restitutus fuit, ut in sequentibus
descriptionibus videre licebit. \mathcal{R} . Re-
sinæ, picis nigræ, ceræ citrinæ, an-
 \mathfrak{z} ij \mathfrak{s} . olei veteris olivarum maturi
lib. j \mathfrak{s} . si durior lib. j.

Alii recipiunt resinæ picis ana \mathfrak{z} ij
ceræ citrinæ \mathfrak{z} iiij. olei veteris oliva-
rum maturi lib. j \mathfrak{s} vel ij. Utraque do-
sis optima. Confice sic. Maturum &
vetus oleum in lebetæ amplo simul cum
cera in frustra diuisa igne lento, spatu-
la lignea ducendo liquefac: qua liqua-
ta resinam & picem percolatam con-
fractamque impone ut liquefiant, qui-
bus liquatis & refrigeratis reconde.

CAP. V.

*Vnguentum Ægyptiacum magnum
seu de melle.*

\mathcal{R} . Floris æris, Aur. v.
Mellis, Aur. xiiij.

Aceti

PHARMACEVTICÆ. 251

Aceti fortis, Aur. vij.

Coque super ignem donec inspissetur. & sunt qui addunt ei

Olibani masculi triti, Aur. ij ℥.

Quid Aureus sit docuimus capite de ponderibus.

Ignе lento mel cum aceto & flore æris aut viridi ære pulverisato (quod inter pulverisandū pauco aceto aspergi debet, ne feriat nares) ad aceticonsumptionem coquatur. His omni-
bus coctis & omnino refrigeratis, olibanum probe pulverisatum immisce, semper spatula lignea agitando, ut melius commisceatur. Vas autem in quo mel & flos æris vel viride æs, & acetum coquuntur, fictile esse debet, ne uideatur in alio vase acrimonia floris æris vel viridis æris & acetis: reponaturque in fictili optime obtuso. Me-
des unguentum Ægyptiacum magnum vocavit, non ad differentiam parvi, sed dixit magnum propter magnas vires, quas possidet.

C A P. V I.

Unguentum populeon Myrepfi.

℞. Oculorum in summo arboris
L 6 populi

populi quando floret apparen-
tium, lib. j. ſ.

Foliorum papaveris nigri,

Foliorum mandragoræ,

Foliorum rubiæ tenerrimorum;

Foliorum hyofciam,

Foliorum ſolani,

Vermicularis ſeu Sempervivi
minoris,

Lactucæ foliorum,

Sempervivi ſeu ſedi majoris,

Foliorum violæ,

Cymbalii foliorum nominati Corta-
li, naſcentis in figulinis & muris.

Singulorum, $\frac{3}{4}$ ſ.

Adipis ſuilli recentis expertis ſalis.

Paratur autem in hunc modum. Ac-
cipiuntur herbæ, & cum adipe in mor-
tario tunduntur, fiuntque veluti fer-
mentum, & ſinuntur ſub ea forma die-
bus octo. Deinde gladiolo incidun-
tur in tenues partes, inque lebe-
rem conjiciuntur, & lento igne bul-
liunt cum

Vini boni, vel Aceti acerrimi,
lib. j.

Donec totum aſſumptū fuerit. Poſt-
ea per linteum tenue colantur, & re-
ponuntur in vaſe.

Tundan-

PHARMACEUTICÆ. 253

Tundantur per se oculi populi & folia violarum incisa in mortario lapideo cum pistillo ligneo, & una cum axungia præparata posita intra vas fictile coopertum loco modice calido recondantur (sicuti reconduntur conservæ oleorum) donec cætera sint collecta ac præparata, hoc est, duos aut treis menses, vel eousque dum cæteræ herbæ sint in vigore: oculi enim populi, & violarum folia primo statim vere, nempe mense Martio erumpunt. Aliæ autem Mayo vel Iunio mense vigent. Has ubi per temporis occasionem collegeris, incisas per se in mortario prius dicto cum pistillo optime contunde; & cum prædicta fermentatione seu commixtione oculorum populi commisce, desuper affundendo aceti optimi lib. i. & iterum loco tepido spatio octo dierum reconde, quibus elapsis totum in cineribus calidis aut vase duplici coquatur, donec omnis humiditas evanuerit. Signum autem coctionis tale erit. Accipias aliquid de decocto cum spatula lignea, vel baculo, & injiciatur in carbones accensos, si strepitum nullum emittit, coctum erit, si verò emittit non satis erit. Tunc ab igne sepone &

L 7. calide

254 INSTITVTIONES

calide linteolo tenui & forti probe exprimendo percola, & in frigidari finito, deinde in vase optime obturato in usum serua.

Notandum Myrepsum tantum octo dierum spatio in infusione unguentum istud detinere: reuera id fieri minime potest ob diversitatem temporis, quo herbae colliguntur: nam aliae veris initio, aliae aestate proveniunt. Præterea plurimi sunt qui folia bardanæ huic unguento addunt, Myrepsus verò omisit: idcirco censerem addendam esse bardanam ad quantitatem prædictorum germinum.

ADIPIS SVILLI.] In hac Myrepsi compositione deest pondus adipis, forsan bibliopolæ negligentia. Quare censerem ut sæpissime expertus sum pro quantitate herbarum, lib. ij adipis in hoc addendas esse: quamvis Fuchsius dicat lib. i. sufficere. De adipis autem collectione, præparatione, & repositione, supra Sect. prima capit. 2. fatis diximus.

CAP. VII.

Vnguentum de Althæa Mirepsi.

℞. Radicis malvæ Silvestris, lib. i.
Seminis

PHARMACEVTICÆ. 255

Seminis lini.

Fœnugræci. Singul. lib. 3.

Scyllæ, 3 iij.

Rad. bene cōtusæ conjiciantur in
Aquæ plu: lib. iij. ʒ.

Deinde dies tres in ea macerate ebul-
liant, donec succi crassitudinem acqui-
rant, & per linteum tenue colentur.
Post accipiatur succi hujus lib. i. & inji-
ciantur ei

Olei Omph. lib. ij.

Et rursus bulliant donec succus ab-
sumptus fuerit. Deinde adjiciantur.

Ceræ Cit. lib. ʒ.

Terebinthinæ,

Galbani,

Gummi hederæ aut ejus

Succi. Singul. 3 j.

Postremum imponatur

Colophonia bene trita &

Resina alba pura, ana 3 iij. +

Concussa agitataque probe, ut in le-
pote eliquentur, ab igne removeto, &
iusto tempore, ut refrigerentur, con-
quassato & vase recondito.

Radices malvæ silvestris, & scyllæ
raminæ frusta per se divisæ: semen iti-
em lini, & fœnugr. separatim singula
in vasis fictilibus diversis, coopertis cum

lib. v.

+ vid. extractum finem

256 INSTITUTIONES

lib. v. ſ. aut vj. ad ſummum aquæ maxime calidæ (pro æquali portione radicum & ſeminum) ſpatio trium dierum inacerentur (quanquam alij trium, aut ſex horarum tantum ſpatio id faciunt) infuſione autem peracta iifdem vaſis concoqui debent ſeparatim igne lento, ſpatula ſemper movendo, donec aqua infuſionis cauſa impoſita, conſumpta fit, & ſuperſint mucaginis colatæ, ſingul. ℥ iij. deinde torquendo omnia ſeorſim exprimere debes: expreſſum cum oleo prædicto eodem igne coquantur, linteo agitando, ad ℥. ſ. ferè conſumptionem mucaginis expreſſæ. Mox ceram minutim confractam, ut liqueſcat, injicies, quæ ubi liquata erit, ab igne ſepones & frigefcere permittes: quæ ubi refrixerint, galbanum diſſolutum (cujus diſſolutionis require modum ſupra Sect. prima) & cum terebinthina incorporatum admiſcebis: de ſuper pulverem quam tenuiſſimum, gummi hederæ, colophoniæ & reſinæ adjicies (alii poſt ceram liquatam colophoniam & reſinam addunt, ut una liquentur, & melius.) Quæ omnia commixta & optime incorporata in vaſe aduſum recondito.

In

PHARMACEVTICÆ. 257

In hoc unguento parando plura sunt notatu digna : imprimis Myrepſium pondera colophonix & refinæ omiſſiſſe. Sed Fuchſius de componendis medicament. Sect. 15. de unguentis, & Præpoſitus particula 20. lib. 2. pondus reſtituerunt, ſcilicet ſingulorum 3 iiij. Præterea cum Myrepſius, & alii qui hoc unguentum à Myrepſio deſumpſerunt, tres tantum libras aquæ determinarunt ad infuſionem & decoctionem radicum & ſeminum (licet in aliquibus Præpoſiti libris vij libræ legantur) maxime meo quidem iudicio falluntur hi, cum totæ radices, & ſemina ſint in pondere duarum librarum & trium unciarum, ſunt tantum uncix decem & ſemis aquæ pro unoquoque ſimplici, quæ non ſufficiunt, cum tribus diebus continuis igne lento macerari debeant ante decoctionem : quæ aquæ proportio tum infuſionis tum coctionis tanto ſpatio poſſet conſumi, & radices & ſemina aduri defectu humoris. Vnde (ſalvo meliori iudicio) ſi hoc unguentum voluerint Pharmacopœi conſicere, ut author præſcribit, legendum erit, aquæ lib. viij. aut novem ſecundum regulam Servitoris. Sed quia in dictis ſimplicibus eſt humiditas

258 INSTITVTIONES

ditas satis multa, ut quæ portionis aliqujus aquæ vices supplere possit, nō tam exacte juxta regulam Servitoris quinque libris cum semisse, aut sex ad summum contenti esse poterunt, si perfectæ velint habere mucaginem, ne radices & semina vrantur infundendo & coquendo. Nam ea regula cum sit universalis, modificatione tamen aliqua conscribi potest, pro ratione corporum coquendorum, quæ quantitas aquæ melior & certior sit ad seminum & radicum mucagines extrahendas: id quod maxime à peritorum artificum, & probatorum authorum judicio dependet. Rursus notandum, Myrepsum quærere solum lib. j mucaginum coctarum ad crassitiem: coctæ verò, vult, ut consumantur cum oleo prædicto. Reuera facile libra una mucaginum potest cum libris duabus olei coqui, sed quantitas radicum & seminum hoc loco descripta mihi videtur excedere, ad libram mucaginum conficiendam. Nam est regula generalis apud omnes Pharmacopœos, auctoritate Servitoris & Præpoliti, ad mucagines conficiendas, ut pro libra una aquæ, sumamus ℥ iij. ad summum ℥ iiij radicum vel seminum.

CAP.

CAP. VIII.

Vnguentum Agrippæ Myrepsi.

℞. Bryoniæ Rad: lib. ℥.
 Radicis althææ silvest.
 Scyllæ, Singul. lib. ij. ℥.
 Iridis nostrat. ʒ vj.
 Radicis filicis,
 Ebuli,
 Tribuli marini. Singul. ʒ. ℥.
 Tusa hæc imponantur in
 Olei lib. ℥.

Et subigantur simul, ac reponantur in
 vase diebus tribus: deinde injiciantur in
 lebetem, & bulliant, subactaque jam
 probe colentur, siccaque abjiciantur,
 liquidum autem in lebetem conjician-
 tur, &

Ceræ puræ, ʒ iij.

Sic paratum reconde in vase.

Recentes omnes radices tempore
 & loco legantur, terque aut quater ab-
 uantur, semper aquam mutando, sindo-
 neque munda abstergantur, & in minu-
 tissimas partes incidantur, deinde om-
 nes per se in mortario lapideo pistil-
 do ligneo tundantur perfecte, fictili-
 que plumbato stricti orificij una cum
 oleo,

260 INSTITUTIONES

oleo, spatium trium dierum, aut (ut alii octo, ut melius & efficacius macerentur, super cineres calidos constituantur, & vas diligenter cooperiatur, interdum tamen spatula agitari debent, ut melius imbuantur, deinde maceratione peracta coquantur ad humiditatis consumptionem, vel donec tota humiditas radicum sit consumpta, & oleum cum radicibus coquitur, totam vim radicum imbiberit. Mox dum calet, percoletur, & radices siccae projiciantur. Liquidum oleum rursus super ignem levem apponatur: statim cera concisa ad liquandum injiciatur: quando liquata refrigerare finito, agitando, refrigerato ad usum in pixide servato.

Circa hoc unguentum notandum, Alexandrinum libro de compositione medicamentorum secundum loca capite 99. & Præpositum lib. 2. particula xx. non convenire in simplicibus, neque in ponderibus, illorumque descriptiones ab hac Myrepsi maxime differre. Usualis tamen & vera descriptio est Myrepsi, quia primus eam usurpavit & descripsit. Quantum autem ad simplicia, loco radices althææ ponunt alii (& me-

PHARMACEVTICÆ. 261

(& melius) radicem cucumeris asinini, quæ purgatrix est, & ideo facit, ut multi medici præscribant ad hydropicos. Quantum ad doses sic variant : nam alii oryonæ lib. ij. radicis cucumeris asinini lib. i. scyllæ ℥ vi. iridis ℥ iij. radicis fisticis, radicis ebuli & tribuli marini ana ℥ ij. olei olivarum maturi & antiqui lib. iij. ceræ ℥ xv. Quod verò spectat ad confecturæ rationem, videtur descriptio Myrepsi deficere in quantitate olei pro quantitate simplicium, & similiter in ceræ pro quantitate olei. Itaque addendum mihi videtur oleum in maiori quantitate & similiter cera pro ratione olei. Et quia in hoc Myrepsi ad coctionem radicum tantæ quantitatis, & earundum macerationem non posset esse adhuc sufficiens quantitas olei, non erit præter rem aliquid liquoris permiscere, vini scilicet, vel aquæ ne uratur oleum. Vinum tamen in hoc præstat.

C A P. I X.

Vnguentum rosatum Mesuæ.

℞. Axung. porcinæ recentis quantitatē quam volueris, vel lib. viij.
Er

²62 INSTITVTIONES

Et lavetur in aqua calida nonies, & tantumdem cum aqua frigida, lavatione ultima: deinde terantur cum ea,

Rosarum rubearum recentium, quantum ipsa est, id est lib. viij.

Et dimittantur marcescere per dies septem: deinde coquantur cum facilitate & colentur. Et iterum tantumdem rosarum teratur & dimittatur per alios septem dies, & funde super ea

Succi rosarum circiter. Partem sem. accipe lib. iiij.

Olei amygdalini, Part. vj.

Et iterum coquantur cum facilitate, usque ad succi consumptionem, deinde reponatur & administretur: & quandoq; disrumpitur in aqua rosata parum opij, & projicitur in decoctione, & est mirabile, ubi oportet, & proprie quando vigiliæ adfunt.

Vt docuimus antea Sect. prima capit. 2. accipe axungia porci recentis & à membranis exacte purgata lib. viij. quam probe in vase fictili plumbato, lati orificij, semper spatula lignea tractando, nonies aqua calente lavabis, donec frigescat axungia, aquam semper cum frigida erit, ejiciendo, & aliam calidam assumendo, & toties postea aqua frigida

PHARMACEVTICÆ. 263

frigida tractando lavabis, semper innec-
vando aquam: deinde cum optime lo-
ta erit, in alio fictili stricti orificij axun-
gia reponatur: una cum libr. viij ro-
sarum rubearum, prius in mortario lapi-
deo vel marmoreo cum pistillo ligneo
contusarum, diligenterque fictile coope-
riatur, & igni lento, nempe cineribus
calidis aut diplomati per modum infu-
sionis, diebus septem appones, & con-
coques, ut sit quasi non coctio, sed
potius maceratio, & humidi superflui
consumptio, radicalis verò humidi ro-
sarum reservatio. His peractis totum
extorquendo calide coletur, & colatu-
re tantumdem rosarum rubearum re-
centium, ut prius contusarum, in vase
predicto cooperto una cum succi rosa-
rum lib. iiij. spatio septem dierum ci-
neribus calidis, aut diplomate, ut omnia
simul macerentur & tota rosarum hu-
miditas, & succosa substantia in axun-
giam abeat, iterum repones & ut prius
concoques. Tum axungiam colabis,
& siccis rosis abjectis refrigerari per-
mittes, & diligenter axungiam ita pa-
ratam vase nitido cooperto ad usum
servabis.

Nostrum vulgus dempto oleo amygdala-

264 INSTITVTIONES

dalarum & opio, istud unguentum com-
 ficit. At si quærat quis, quare oleum &
 opium prætermittamus, dicemus
 Oleum magis liquidum unguentum
 reddere, ob magnam olei copiam
 nam si addere volumus secundum au-
 thoris intentionem, reuera sufficiunt
 ad hoc unguentum parandum \mathfrak{z} vi
 Opium vero potest ex præscripto me-
 dici, & non usualiter addmisceri, ad
 errores vitandos, dissolutum cum pau-
 ca aqua rosacea.

C A P. X.

Vnguentum Inulatum ex xx. perticula Præ-
positi Vsuale.

\mathfrak{R} . Radicis Inulæ campanæ coctæ
 cum aceto & pistatæ ut decet.
 lib. β .

Axungia porci, \mathfrak{z} j.

Olei communis, \mathfrak{z} j. β .

Ceræ novæ cit. \mathfrak{z} . β .

Argenti vivi extincti,

Terebinthinæ lotæ ana \mathfrak{z} j.

Salis communis pulverisati, \mathfrak{z} ij

Incorporentur ut decet.

Radices inulæ tempore & loco col-
 lectæ in aqua clara laventur, donec om-

nes

PHARMACEVTICÆ. 265

nes sordes depofuerint: deinde linteolo mundo & rudi detergantur, fruftula-
timque incidantur: & in fictili cum ace-
ti lib. iij. fecundum communem ufum
coquantur: quia tamen acriorem quan-
dam qualitatem acetum cum radicibus
coctum acquirere poteft, & abfumere
inulæ coquendo. quandam virtutis por-
tionem, melior videtur prima coctio, &
veluti cruditatis effractio, fi fiat cū aquæ
media parte: perficienda vero sub finem
aceti reliqua portione, donec totus
liquor abfumptus & coctæ radices fint.
Postea refrigerare permittite super cri-
brum rarum, ut fi quid fuperfit aquæ &
acetum effluat: ubi refrigeratæ erunt, in
mortario lapideo pistillo ligneo (non
autem æreo, nec metallico propter
acetum vim, alias enim longe diverfam
qualitatem acquireret) contundes:
perandem dicto raro cribro, manu vel spa-
tula comprimens lignea, transcolabis
& colatum cum axungia porcina in fi-
ctili lati orificij concoques igne lento,
spatula femper inter coquendum agi-
tando, donec pars fuperflua liquoris in
tunas abeat: & continuo falem opti-
me pulverifatam & cribratam com-
mifcebis, paulo post ceram cum oleo
M liqua-

266 INSTITVTIONES

liquatam conjunges (alij ceram cum
 oleo liquant, qua liquata radices cola-
 tas & ad humidi superflui coctas una
 cum axungia, & prædicta cera jungunt
 desuper salem optime pulverisatum
 inspergunt) tunc totum ab igne se-
 pones, & ubi omnia bene commixta
 optimeq; refrigerata erunt, argentum
 vivum cum hominis jejuni saliva probe
 incorporatum, & cum terebinthina in-
 volutum permiscebis; prius tamen ace-
 ro maceratum diligenter frequenterq;
 agitatum in mortario marmoreo cum
 pistillo ligneo spatio unius horæ, vel do-
 nec acetum sordes crassas argenti vivi
 imbuerit: tunc acetum istud dejiciatur
 & aliud clarum ac nitidum imponatur,
 agiteturque ut prius, hæcque agitatio
 seu maceratio ter aut quater repetetur,
 semper innovando acetum pro quacun-
 que vice: agitatione autem facta si
 aliquid in eo terræ aut plumbi, aut
 stanni sit, id ut auferatur transcolari
 debet per alutam comprimendo. Sic-
 que paratum ad usum unguentum ha-
 bebis fictilique reservabis. Cæterum
 notandum erit, auctorem petere tere-
 binthinam lotam. Sane ego habeo
 ex doctrina medicorum integram me-
 liorem

PHARMACEVTICÆ. 267

liorem esse, ut quæ, cum amarorem & caliditatem retineat, permeabilior sit, & majoris virtutis ad penetrandum & desiccandum.

ARGENTI VIUI.] Chymistæ argentum vivum mercurium vocant: alij hydrargyron, alij præcipitatum: alii matrem metallorum & mineralium: alii cinnabarim. Verum argentum vivum nihil aliud est, quam aqua viscosa in visceribus terræ, substantiæ subtilis, terræ albæ, temperati caloris, virtute exquisitè permixta, perque minima, quousque humidum fuerit temperatum à sicco, & siccum ab humido æqualiter. Alii per se inveniri in argenti fodinarum tectis stillatim concretum asserunt. Est autem duplex. Nativum scilicet, & artificiale. Nativum sui coloris sine excoctione, quod tale reperitur intra metalla, in lacubus, in quos è fibris effluxit. Artificiale ex minio, sive ex vena minii conficitur, seu coquitur, ad eum modum quem Dioscorides tradit lib. 5. capit. 70. & Plinius lib. 33. capit. 8. Quod si plura requires, lege eosdem auctores, & pariter Ludovicum Cælium lib. 26. capit. 30. Fuchsiū lib. 9. de Simpl. me-

M 2

di

268 INSTITVTIONES

dicament facultatibus Sect. 3. capit. 32
 Notandum tamen erit, argentum vi-
 vum, dum est liquidum, crudum & vi-
 vum appellari: dum est mortificatum in
 quibusdam officinis concrematum dici
 & à nobis sublimatum. Efficitur etiam
 nobis præcipitatum cum aqua forti, co-
 ctione, ad evaporationem ipsius aquæ
 videlicet ex P. iij. argenti vivi & aqua
 fortis P. j. quod in officinis nostris ar-
 gentum vivum rubeum vocatur. Extin-
 guitur seu incorporatur sic. Accipe ar-
 genti vivi quantum volueris, & morta-
 rio metallico impone, & diutissime pi-
 stillo ferreo agita cum pauca hominis
 jeiuni temperati saliva, vel cum pauca
 axungia porcina, ursina, oleo terebin-
 thinae, juniperi, butyro recenti, sulphu-
 re vivo, & cocto pulverisato, styrace
 liquida, castoreo liquido, terebinthi-
 na, & cum pluribus aliis simplicibus pro
 diversis medicandi scopis, donec nullæ
 scintillæ appareant. Sicque extinctum
 vel dissolutum commiscere poteris, sci-
 licet in omnibus unguentis aut empla-
 stris, cum refrigerata fuerint. Sed
 antequam extinguatur, debet eligi. Eli-
 gitur autem & probatur nativum seu
 fossile à plumbo depuratum: cujus de-
 puratio

PHARMACEVTICÆ. 269

puratio talis erit. Accipe alutam for-
rem & satis amplam pro quantita-
te argenti vivi, & in eam argentum
vivum include: inclusum & alutam
optime ligatam manu stringe & com-
prime in aliquo vase, statimque vi-
debis argentum vivum ab aluta exi-
re, & plumbum si adsit remanere in
aluta.

C A P. X I.

Vnguentum diapompholygos.

℞. Olei rosati,
Ceræ albæ, ana ℥ iij.
Succi fructus uvæ lupinæ ℥ iiij.
intellige solanum hortense.
Psimmythij, id est cerusæ lotæ ℥ j.
Pompholygos vel spodij,
Plumbi usti & loti,
Olibani puri, ana ℥ .ss.

In oleo ceram lento igne liquefac,
& ab igne subductis specierum pulve-
rem adde, & in marmorea pila diutius
commisce, sæpius superscriptum suc-
cum superfundendo, cumque per quin-
que aut sex horas ads olem cum pi-
stillo subacta fuerint, in loco frigido

M 3 coa-

270 INSTITVTIONES

coaguletur : si quid succi supernatauerit, abjiciatur : & lintheo inductum loci vulneratis impone.

Succi à maturis baccis solani extrahenda quantitate sufficientem, videlicet ℥ iiii. (quanquam tamen nonnulli existimant ab immaturis extrahendum tanquam à magis astringentibus & refrigerantibus, quod ego aliter puto) & cum oleo rosaceo in lebete igni lento excoque ad succi consumptionem, spatula assidue movendo (sunt autem qui succum addendum putant, ut eo nutriatur calide cerusa & reliqua simplicia dempto olibano) deinde ceram frustulatim divisam in prædicto oleo ut liquescat injicito : qua liquata lebetem ab igne sepones & spodium, plumbum, & cerulam separatim tritam & levigatam, semper spatula agitando ut probe commisceantur, conjicies : quibus optime commixtis & omnino refrigeratis pulverem tenuissimum olibani insperges, & subiges, eoque dum omnia sint optime mixta & confusa, ita ut unum ab altero discerni minime possit : hac enim methodo unguentum secundum artem habebis factum.

Ani-

PHARMACEVTICÆ. 271

Animadvertemus autem in hoc unguento quantitatem olei non sufficere ad perfectam omnium consistentiam, & unguenti formam, nisi ultra auctoris descriptionem adderetur olei ℥ vj. quod ego certe facio, dum illud paro, eo quod nimis ficcum & durum esset, nisi tantum olei adderetur; aut aliquid de cera detraheretur. Pariter notabimus, Alexandrinum non præscribere pondus succi uvæ lupinæ, cum dicit quod sufficit, sufficiunt tamen pro quantitate olei ℥ iiij. Idem Præpositus xx particula lib. 2. illud unguentum describit, consentitque cum Alexandrino in simplicibus, sed in ponderibus minime, quæritque Alexandrinus ceram simpliciter, Præpositus vero ceram lotam, quæ sane lavari debet propter acrimoniam à melle contractam, huic unguento minime convenientem. Galenus tract. 20. ad Glauconem, capite de curatione canceri, seu cancrofi ulceris, unguentum istud describit ab eo Alexandrini maxime diversum.

PLUMBI VSTI ET LOTI.]

Plumbum corpus est metallicum, lividum, terreū, ponderosū, modice participans albedinis. Nec reperitur in fodinis

M 4

purum

purum plumbum, cuiuscumque sit coloris. Quod excoquitur triplex, scilicet nigrum, quod verum est plumbum: Cinereum, quod Fallopius lib. de metal seu de fossi. cap. 22. Marchesitam librariorum vel impressorum vocat: quod nihil aliud esse videtur quā stybiū. Candidum, quod est stannum, & antiquorum plumbum albū. Avicenna 2. Canone, cap. 2. duas tantum species definit Plinius antiquis duplex esse ait (cum ipse tria genera ponat) Nigrum & Cinereum. Nigrum fit ex lapide pyrite coloris argentei: nam pyrites ille argentei coloris argentum continet & æs: aliquando solum æs, aliquando argentum solū, aliquādo utrumque simul, aliquādo argentum & plumbum nigrum, aliquādo plura metalla, aliquādo omnino sterilis reperitur pyrites. Cinereū vero distat à nigro & cādido plumbo colore: estque quasi sui generis metallum, quod Græci, tum Latini scriptores ignorasse videntur. Quod candidum vere est plūbum, improprie à vulgaribus plumbum nigrū appellatur. Candidum vero plūbum stannum illis dicitur. Tamen non sunt eadem ut hactenus voluerunt stannum & plumbum cādido. Nam stan-
 num

num ex terra effoditur & in mineris invenitur in frustra divisum, testis Serapio lib. aggregat. capit. Femezeg. Sed plumbum nostrum candidum ex galena in quibusdam locis conflatur ut plumbum nigrum. Et ut vult Plinius lib. 34. capit. 16. coquitur ex lapillis nigris candore varietatis, qui lapides nigri nonnullis locis magni reperiuntur: interdum vero ut arena, scribitque in Britannia, item in Gallitia provenire, cum in Gallitia minime fiat nigrum. Sed de plumbo & illius generibus & origine satis, si plura requiris consule Galenum lib. 9. Simplic. medicament, et Plinium lib. 34. capit. 16. 17. 18. Dioscoridem lib. 5. capit. 47. & 48. Georgium Agricolam & Fallopium. Nunc de ejus præparatione est nobis dicendum, quæ fit duobus modis: ustione & lotionem. Vritur autem secundum Dioscorid. libr. 5. capit. 56. hoc modo. Super tenuissimas plumbi laminas fictili novo inditas, sulphur inspergito: additisq; rursus aliis laminis, interjecto semper sulphure, donec vas expleveris, succendito: flagrans autem jam plumbum ferrea rude versato, donec perfecte redigatur in cinerem, nihilque è plumbo non ustum hæserit: tum

M 5

demum

274 INSTITVTIONES

demum obstructis naribus extrahito: alioquin fumus plumbi maxime noxius sentitur. Sic Dioscoridis & Servatoris sententia plumbum vritur, sed huiusmodi ustio difficilis admodum nobis videtur propter damnum, quodque cinerem nigrum reddit, & depravat colorem unguenti si observare volueris. Illa sequens ustio quæ fit absque sulphure, perfacilis est, minimeque nocua. Vas fictile non vitreatum (ne inter urendum quid adhæreat) accipito, & furno fusorio, ubi sint carbonēs accensi appone: idque fictile carbonibus ardentibus undique circunda, in eoque quantum plumbi volueris impone, & liqua: quod illico fiet. Prius tamen bis aut ter in aceto fortissimo plumbum extingatur, quæ extinctio similis est extinctioni lapidis calaminaris, & Tutia Græcorum: de qua vide infra in unguento deficcativo. Liquato plumbo ignis augeatur & ferrea spatula semper agiteretur, paulatim à lateribus vasis spumam ejiciendo, quousque totum in spumam devenerit, nihilque è plumbo usto adhæserit. Spumam autem illam, quæ veluti cinis, & revera cinis est, in dicto furno, ignem augendo,

PHARMACEVTICÆ. 275

gendo, circumcirca concoques, donec colorem retineat album citrinis-
 rati permixtum. Hac enim methode
 non nocebit, nec nigrum erit. At
 quia Alexandrinus plumbum uftum
 & lotum requirit, sic præparatum la-
 vari debet, quamvis in eo mordacitas
 aut acrimonia nulla fit. Sed est inten-
 tio Alexandrini fortasse ipsum lava-
 re, ut tenuius fit, & sic facilius per-
 meet poros cutis, dum parti alicui
 applicatur, vel ut nova qualitas per
 ablutionem addatur, aut auferatur,
 vel ut corrosiva & acris vis in eo ar-
 te acquisita tollatur. Scio autem (ut
 prædixi) non esse acre neque cor-
 rosivum, nec edit effectum calidum
 aut siccum ante uftionem, sed ex sen-
 tentia Galeni potius frigefacit & hu-
 mectat. Quod si vero volueris ipsum la-
 vare, hoc modo lavabis. Accipe cine-
 rem plumbi tali modo, ut jam diximus
 factum, & illum in mortario marmoreo
 de super parum aquæ cœlestis vel rosa-
 rum affundendo aliquot horis pistillo
 ligneo, vel spatula lignea agitato, do-
 nec aqua sit fœculenta vel turbida, quam
 de jicies in quoddam fictile, & aliam
 aquam iterum affundes, & prius tracta-
 bis

M 6

bis

276 INSTITUTIONES

bis ac movebis, semper aquam turbidam & fœculentam dejiciendo in supradictum fictile usui futuram, & aliam in mortarium itidem infundendo atque hæc toties repetes, donec pars subtilior plumbi usti assumpta sit cum prædicta aqua effusa: crassior autem pars, quæ residet in fundo mortarii rejiciatur tanquam plumbi sit excrementum, nulliusque efficaciam. Tunc totam partem subtiliorem plumbi usti, quæ cum aqua assumpta fuerat, quiescere permitte, quousque ea clara & sincera videatur, & plumbum ustum in fundo fictilis residere, quod sub dio siccabis: siccatum ad usum servabis. Alij hac lavandi utuntur ratione. Pulverem plumbi usti in mortario infusa aqua agitant, donec ea aqua plane sit turbida, quam tum residere & clarescere permittunt, & tunc demum ejiciunt, nec in alio vase conservant: idque sæpius iterant, dum aqua non amplius turbetur, sed prorsus clara & indefœcata appareat. Tunc denique quod in fundo mortarii residet, id ad usum reponunt. Qua ex lotione ego quidem judico subtiliorem plumbi partem à crassiore exacte separatam non esse: nec id sedimentum

PHARMACEVTICÆ. 277

tum auctoris menti respondere: neque pro facultate huic unguento adscripta, satis desiccare. Cum igitur à Medicis præscribetur plumbum lotum, sic priori modo lavabis, mutando tamen liquorem pro scopo compositionis, & intentione Medici..

POMPHOLYGOS VEL SPODII.] Pompholyx, Tutia Arabibus dicta. Vera autem Pompholyx cinis est metallicus, levisimus, qui ex æris, vel Cadmiæ favilla in summitate fornacū, aut parietibus, vel etiam domunculorum, extra farinæ modo dispergitur, quod seplasiis Nil album vocatur, & à Germanis Nili pinguis: estq; is cinis candidus & usqueadeo levis, ut in auras evolare possit. Alii volunt quid album esse (quasi bullam seu ampullam, unde nomen apud Græcos sortitur) purū pingue, ac leve: quod colligitur & fit in summitate fornacū, differtque secundum diversitatem metallorum, & ratione locorum in quibus colligitur: ut si in oris fornacum, tum Cadmia capnitis: si à lateribus & summis cameris est pompholyx: pars quæ in summitate depêdet pompholyx etiam dicitur: pars vero quæ parietibus & pavimentis adhæret, spodium appellatur

M 7 (ut

278 INSTITVTIONES

(ut sæpissime in hac urbe, vico divi Martini, & in pluribus locis observavimus in fornacibus, ubi æs conflatur) differtque pompholyx sola specie, candore, vel levitate, non genere, à spodio. Siquidem spodium magis nigrescit, & ponderosum pilisque plenum est, tanquam excrementis collectis ab ærariarum officinarum, & fornacum pavimentis. Materia autem pompholygis & spodii est æs, vel lapis calaminaris, qui Arabice climia: & Græce cadmia dicitur. Probatur autem pompholyx Cypria, quæ superfusa aceto halitum æris præstat, colore aliquantulum piceo, sapore cœni, horrido, & statim si fraudem non est experta flagranti imposita carboni infervescit, & cœruleum colorem contrahit. Cujus secundum Dioscoridem lib. 5. cap. 46. duo fuerunt genera. Unum ad æris colorem vergens, subpingue: alterum candidum & maxime leve. Candida enim fit pompholyx, quoties in perficiendo ære fabri præstantius facere volentes detritam cadmiam cumulatus inspergunt: namque levissima favilla, quæ defertur, in pompholygem coit. Hæc Dioscorides, lib. & cap. citato.

C A P.

C A P. XII.

Vnguentum Apostolorum.

℞. Terebinthinæ,
Ceræ albæ,
Resinæ, Omnium ana ʒ xiiij.
Opopanacis &
Floris æris, Am-
borum, ana ʒ ij.
Ammoniaci, Pon-
dus, ʒ xiiij.
Aristolochiæ longæ &
Thuris masculi, Am-
borum, ana ʒ vj.
Mirrhæ &
Galbani, Am-
borum, ana ʒ iiij.
Bdellii, Pondus, ʒ vj.
Lithargyrii, Pon-
dus, ʒ ix.

Infundatur bdellium in aceto vini &
decoquantur in æstate cum
Olei, lib. ij.

Et in hyeme cum lib. iiij.

Lithargyrium (ut antea in Empla-
tris diximus) electum, tritum, & præ-
paratum, in lebete cum ʒ ij. olei præ-
licti, spatio quinque horarum, aut
ex nutriatur : deinde igni lento ad
mellis

280 INSTITVTIONES

mellis crassitiem, vel ad unguenti mediocriter duri formam coquatur, spatula semper agitando, ne in vasis fundo subsideat, subidendoque uratur: quod ubi coctum, & ab igne depositum fuerit, ceram in minutissimas partes divisam, & in reliqua parte olei liquatam, una cum resina confracta calide affundes & refrigerare permittes: ubi hæc refrixerint, ammoniacum, galbanum, opopanax, bdellium (si molle sit, si vero ficum, in pulverem tenuissimum rediges, & in numero pulverum collocabis) arte soluta, & cocta in aceto aut vino, ut superioribus emplastris & unguentis solvendi & coquendi modum docuimus & cum terebinthina incorporata immiscebis. His itaque optime commixtis, & omnino refrigeratis, pulveres tenuissime per se tritos, ut aristolochiæ longæ, myrrhæ, thuris permiscebis, semper spatula agitando. Hoc itaque modo paratum habebis unguentum, addendo pulverem tenuissimum floris æris.

CAP. XIII.

Unguentum martiatum magnum Myrepsi.

℞. Cerae albæ, lib. ij.

Olei

PHARMACEUTICÆ. 281

Olei communis, lib. viij.
Rosmarini,
Foliorum lauri, fing. ℥ viij.
Tamarifis summ. ℥ vj.
Fol. Ruthæ, ℥ viij.
Fol. Ebuli,
Sabinæ,
Balsamitæ,
Ocymi,
Salviæ,
Polii,
Calaminthæ,
Artemisiæ,
Helenii,
Betonicæ,
Brançæ ursinæ,
Spargulæ apparinæ,
Herbæ venti, id est Anemonis,
Pimpinellæ,
Fol. Agrimonix,
Sum. absynthii,
Herbæ sancti Petri, fing. ℥ iiij β .
Costi herbæ, id est Herb. sanctæ
Mariæ,
Sambuci foliorum,
Sempervivi minoris,
Herbæ millefoliæ,
Sempervivi majoris,
Chamedryos,

Quin

282 INSTITVTIONES.

Quinquenervia, vel plantaginis,
 Centaurii,
 Fragaria,
 Quinque folii, Singul. \mathfrak{z} iiij \mathfrak{s} .
 Malvæ Silvest. rad.
 Cumini,
 Myrrhæ, Singul. \mathfrak{z} iij.
 Fœnugræci, Exag. ix.
 Butyri Rec. \mathfrak{z} j \mathfrak{s} .
 Seminis urticæ,
 Violarum,
 Papavetis albi,
 Menthæ,
 Rubiæ, Menthæ agrestis,
 Lapathi,
 Politrichi,
 Cardiobotani,
 Matrisilvæ, id est Caprifol.
 Herbæ moschata,
 Florum chamæmeli,
 Scolopendrii,
 Crispulæ,
 Herbæ camphurata,
 Styracis cal.
 Medullæ ossium cervi, Singul.
 Exag. iij.
 Axung. ursinæ,
 Gallinæ &
 Anseris.

Masti-

PHARMACEVTICÆ. 283

Mastiches, Sing. \mathfrak{z} j.

Thuris, \mathfrak{z} β .

Olei Nardini, \mathfrak{z} ij β .

Misce pro unguento.

Herbæ recentes omnes, scilicet calidæ, & odoriferæ ut salvia, polium, calamamentum, arthemisia, absinthium, & cæteræ aliæ similes, postquam floruerint, vel in flore, vel post deperditum florem colligantur: quæ vero frigida & humida, ut duæ species sempervivi, quinquenervia, & aliæ similes, cum justam magnitudinem assequeutæ fuerint, legantur: & à caulibus purgentur. Calidas & odoriferas separatim à frigidis & humidis minutissime incidendes, ac probe contundes, postea eas cum omnes fictili stricti orificii cum lib. xiiij. vini odoriferi spatio octo dierum ad infundendum, una cum radicibus incisis & tuis, althææ & fœnugræci semine non contuso, cineribus calidis appones, vase tamen obturato. Alii per se aliquot horis infundunt althæam & fœnugræcum ad mucaginem conficiendam: confecta autem mucagine, & postquam cera est liquata, refrigerataque, cum oleo conjungunt. Peracta autem infusione in lebetes ad mediæ partis

284' INSTITVTIONES

partes vini consumptionem, igne lento decoques. Deinde oleum commune antiquum prædictum adjicies, & denuo omnia simul eodem lento igne concoques, donec totum vinum & aqueus humor herbarum in vaporem resolvatur. Tunc linteolo aspero calide transcolantur, herbas valde extorquendo, ut nihil olei remaneat in herbis: colaturæ vero statim ceram confractam, ut liquefiat, injicies: qua liquata butyrum, urfi, gallinæ, & anseris axungias adjicies: his omnibus liquatis, ab igne leberem sepones, & medullam cervi impones, mox styracem calamitem cum pauculo oleo nardino solutam addes & commiscebis, interdum tamen spatula lignea agitando: quibus optime commixtis omnino refrigeratis, pulverem tenuissimum myrrhæ & thuris desuper insperges: denique reliquum nardini olei infundes, & vase unguentario usui reservabis.

Cæterum notandum erit, Myrepsum Sect. 3. de unguentis num. 3, 4, 5. très habere descriptiones præter istâc usua-lem: Paulum Æginetam lib. 7. cap. 8. & Aetium lib. 12. cap. 44. maxime diversas in simplicibus & ponderibus. Præ-
terea

PHARMACEVTICÆ. 285

terea Alexandrinus lib. de compositione medicamentorum secundum loca cap. 993. hanc habet usualē descriptionem, convenitque in simplicibus, in ponderibus vero minime, & ultra descriptionē hanc Myrepsi addit marathrum, nec axungiam anseris habet. Præpositus vero particula xx. lib. 2. herbam Tetrahit adjicit, & maturellam (quæ describitur à nonnullis pro moralla) præter descriptionē hanc, & anseris axungiam prætermittit, variatque in ponderibus quorundam simplicium. Fuchsius quoque, qui hoc unguentum usuale describit, diversæ est opinionis in quorundam ponderibus. De simplicibus nihil dicemus: cum Dioscorides, Plinius, Fuchsius, abunde de his tractaverunt. Si quis plura scire cupiat, legat auctores superscriptos.

C A P. X I V.

Unguentum ad scabiem.

R. Butyri recentis sine sale,
Axungia porcinæ recen.
Succi fumariz non depurati,
Sulphuris communis, ana \mathfrak{z} j.
Misce, fiat unguentum.

Axun-

286 INSTITVTIONES

Axungiam porci collectam & præparatā, secundum modum à nobis præscriptum in emplastris, una cum butyro recenti in mortario plumbeo pistill. pariter plumbeo friando contundes. Deinde sulphuris pulverem tenuissimum desuper insperges, semper pistillo ducendo, ut commisceantur: quibus rite mixtis guttatim succū fumarix affundes pistillo agitando ut prius, donec pars succi probè imbuta fuerit, hæc que agitatio repetetur quotiescunque succum alium immiscebis. Quantitas verò præscripta succi pedetentim iniecta & omnino imbuta, spatio duarum horarum iterum totum ut rite succus permisceatur, & ab eis non separetur subagitabis, sicq; præparatum ad usum servabis.

CAP. XV.

Vnguentum Commitisse ex Varignano.

℞. Corticum medianorum castaneorum.

Corticum medianorum, arborum.

Glandium, & Glandium.

Myrtillorum.

Caudæ equinæ.

Corti

PHARMACEVTICÆ. 287

Corticum fabarum.

Acinorum uvarum.

Sorbarum siccarū immaturarum,

Mespillorum immaturarum.

Radicum chelidoniæ.

Foliorum prunorum silvestrium
ana ℥j. β

Terantur grosso modo, & co-
quantur in

Aquæ plantag. lib.viij.

vsque ad consumptionem me-
dietatis, & tunc

℞. Cera novæ. ℥viij. β.

Olei myrtillorum. lib.ij β

Misce, & lava oleum, & ceram cum

suprascripta decoctione novies, sem-

per renovando aquam: & cum hoc

factum fuerit.

℞. Corticum castanearum,

Glandium,

Corticum medianorum, arboris

Glandium,

Galliarum. ana ℥j.

Cineris ossium cruris bovis.

Myrtillorum,

Acinorum uvarum,

Sorbarum siccarum, ana ℥ β.

Trochiscorum de Carabe: ℥.ij

Pulverisentur subtiliter pulverifan-
da

288 INSTITVTIONES

da, & cum prædictis cera & oleo-
tis cum supra dicta decoctione fi-
unguentum. Hic finitur textus Præp-
fiti: nunc accedamus ad veram metho-
dum conficiendi.

*Vnguenti huius conficiendi vera
methodus.*

Recentia simplicia secundum natu-
ram, quam in se habent (nam alia ali-
citius vel tardius recuperantur) tempore
& loco collecta, crassiuscule in mor-
tario æreo, cum pistillo ferreo, ordin-
trita in lib. viij aquæ plantaginis, a
mediæ partis consumptionem coquan-
tur: ut cortex medianus arboris quer-
cini, acini uvarum, radix chelidonia-
mespilla, sorba, cauda equina, seme-
myrtillorum, pruni silvestris folia, cor-
tices fabarum, mediani glandium, casta-
nearum, cortices, & gallas: quæ omnia
ubi recte cocta erunt, duarum hora-
rum spatio in infusione permittes: si-
gnum autem perfectæ coctionis, & in-
fusionis tale est. Accipe gladium ma-
xime nitidum & politum ex ferro fa-
ctum, immitte in decoctum: si cum
extrahis sit lividius, & nigrescens cum
adhæsiōe & difficulter eluibili, tunc
concoctio, & infusio perfecta & per-
acta.

PHARMACEVTICÆ. 289

acta, quam infusionem mediocriter calidam velociter extorquendo colabis, & colaturam in novem partes divides: postea ceram minutatim incisam, una cum oleo myrtino in diplomate liquatam, & adhuc calentem lavabis cum prima parte colaturæ calidæ, agitando ac versando donec totum refrigeretur: deinde vase duplici liquabis, & refrigerare permittes aquam, quam subidentem ex lotionem deicies: ea ejecta ceram iterum eodem vase, eodemque igne liquabis: & cum secunda parte decocti calidi lavabis, tractando ut prius, donec frigescat: & aquam ut antea deicies: sicque septies etiam iterabis, donec nulla pars prædictæ colaturæ supersit: postremo totum probe ablutum in diplomate liquabis, & pulverem tenuissimum ossium cruris bovis duriter agitando immiscebis: paulo post pulveres sequentium per tenues & in polinem redactos ordine, ut corticum mediorum arboris quercini, & mediorum corticum glandium, corticum mediorum castanearum, gallanum, sorborum, mespillorum, seminum myrtillorum, acinorum uvarum, asperges: desuper trochiscos de caryophyllis

N

rabe

290 INSTITUTIONES

rabe celeriter & diu agitando conjun-
 ges, & subiges: subactaque omnia fimi-
 & complexa ad consistentiæ spissitudi-
 nem servabis ad usum. In hoc anima
 vertendum, Varignanam in pulve-
 hujusce unguenti sorba & mespilla
 omisisse, & Præpositum in eodem pul-
 vere mespilla, & gallas in decoctione
 quas addere oportet post caudam equi-
 nam, cum decoctionem parare volue-
 ris, & mespilla addere convenit cum
 pulvere dicti unguenti. Præterea Va-
 rignanam in suo textu scribere: *E-*
lavetur novies cum aqua prædicta semper in-
novando quacumque vice, & quæ sequuntur
 Revera melius (pace aliorum dixerim)
 ac præstantius esset hoc unguentum,
 non ejiceretur decoctum, sed potius
 cum eo misceretur: quod certe fieri non
 potest, si in promptu egeamus: si vera
 cōservare velimus, nequimus, quia bre-
 vi temporis spatio ob decoctionem cor-
 rumperetur, & rancidum redderetur.
 Cæterum fieri non potest hoc unguen-
 tum nisi mense Septembri, vel Octobri
 propter multa simplicia, quæ tātum hi-
 duobus mensibus in suo statu reperiun-
 tur. Caveat porro pharmacopœus, ne in-
 grumos abeat hoc unguentum, cum vo-
 let

PHARMACEVTICÆ. 291

let simplicia probe trita miscere: & si forte fortuna abeat in grumos, sic re-
stituere poteris. Accipe setaceum &
pedetentim unguentum grumatum, su-
perdictum setaceum spatula lignea
fricando transcola, donec totum sit
transcolatum. Hoc namque pacto re-
stitutum erit, nec ulli grumi appare-
bunt.

CINERIS OSSIVM CRVRIS
BOVIS.] Offa in cineres redigenda
aptius interlunio colligi debere viden-
tur: quod nimirum ad lunæ incremen-
tum aut decrementum corporis totius
partes immittantur. Nec vero dubium
est, quin interlunio solidæ omnes par-
tes quam plenilunio, longe sint fic-
ciores. In cinerem autem hac metho-
do ossa convertes. Vas figulinum ac-
cipito, & ossa recentia, confracta
carne carentia cruris bovis in dicto
vase imposito, vasque furno fusorio
circumcirca carbonibus accensis ada-
ptetur, & illic dimittatur, semper ignem
continuando eousq; dum dicta ossa alba
appareāt, absq; ulla nigredine, & friabi-
lia digitis sentiantur, quod vere signum
adustionis est: sic adusta diligentissime
ad usum illa servabis. Sicq; cætera ossa

N 2

anima-

animalium ad cinerem faciendum debent eligi & aduri.

O L E I M Y R T I L L O R V M.] Scilicet lib. ij. ꝑ. Alij mastichinum & myrtinum æquis partibus sumunt. Magna est contentio inter nos pharmacopæos, cum hoc unguentum parare voluimus, quale oleum myrtinum debeamus accipere compositum, an simplex, cum de eo nihil determinet Varignana, neque in suis tractatibus aliquam olei myrtini descriptionem assignarit. Quidam sentiunt, & affirmant accipiendum esse oleum compositum myrtinum ex descriptione Alexandrini, quod Præpositus in suo dispensatorio scripsit: sed (pace dixerim) perperā: nam oleum myrtinum compositum Alexandrini continet crocum, quod maxime menses educit: quod certe est præter scopum: nam ad sistenda menstrua unguentum componitur: ergo myrtinum oleum compositum à Nicolao Alexandrino & Præposito minime conferet: nam porosus & meatus referaret & aperiret & non astringeret, ratione croci: sed sua felici tuerentur ratione, dicentes: unguentum omnino astrictivum esse, nec simplicia astringentia, quæ in unguento ponuntur,

PHARMACEVTICÆ. 293

nuntur, posse operari, & ad partes deferri, sine aliquo vehiculo & deferente: & hac ratione oleum myrtinum compositum usurpant, ut crocum fit pro vehiculo, & vim aliorum sua subtilitate deferat, & ad agendum excitet. Tamen (salvo eorum iudicio) existimo, ut Luminare majus sect. 10. de ceratis & unguentis testatur, simplex oleum à Mesue descriptum 12 distinctione de oleis sumendum, cum scilicet non sit opus dilatatione meatuum, sed omnimoda astrictione. Nihilominus medicorum ratiocinantium esto ea de re iudicium.

CAP. XVI.

Unguentum Aregon Myrepsi.

℞. Rosmarini,
Sampfuci,
Rad. Iridis recent:
Serpilli,
Ruthæ,
Radiciſ malvæ agreſtris. Singul.
℥ ij. ʒ ij, & quartam partem.
Foliorum lauri,
Salviæ,
Sabinæ, Singul. ʒ j. ʒ.
N 3 Lau-

Laureolæ, ℥ iiij. ℞.

Calaminthæ, ℥ iiij.

Mastiches,

Thuris, Singul. ℥ iiij.

Pyrethri,

Euphorbij, Singul. ℥.℞.

Zinziberis,

Piperis communis,

Singul. ℥ vj.

Olei moschati, ℥ ij.

Petrolei aut pro eo olei sanctæ

Barbaræ, ℥.℞.

Adipis ursini,

Olei laurini Singul. ℥ j. ℞.

Butyri, ℥ ij.

Olei communis, lib. ij. ℞.

Ceræ albæ puræ, lib. ℞. & quartam partem. Fiat Vnguentum.

Fictili tecto radices malvæ sylvestris & iridis per se minutim incisas, ac probe in mortario lapideo cum pistillo ligneo tufas impone: desuper separatim quæ sequitur in idem mortarium velociter trita conjice, ut rutham, laureolam, sabinam, salviā, lauri, sampsychi, & calaminthæ folia, serpilli, & summitates rosmarini: spatuloque octo dierum una cum vini rubri lib. viij. ad macerandum appone. Nonnulli tepidum aut calidum

PHARMACEVTICÆ. 295

calidum esse liquorem infusionis vo-
lunt: tamen melius, vinum non incal-
escere igne ne acescat: nam per se ig-
nem sine calore satis retinet, & ex-
primit, & fervorem excitat. Sequenti
vero die ad mediæ partis consumptio-
nem igne lento concoque, spatula ali-
quoties ducendo. Deinde oleum com-
mune prædictum in decocto adicies
(alii oleum, butyrum una cum adipe
ursino, & vino, coquunt) rursusque
omnia coques donec totum vinum eva-
poratum, & aqueus humor herbarum
in vaporem resolutus fuerit, ut prius,
spatula inter coquendū movēdo. Postea
probe per saccum cannabinum torquē-
do calide exprimes. Expressioni vero
butyrum, & ursinum adipem ut liquen-
tur addes. His liquatis iterum igni len-
to expressionem mixtam cum butyro
& adipe ursino appones, statimq; ceram
divisam ut liqueat injicies: liquatam
ab igne depones: mox oleum laurinum
moschatum seu moschelinum, & petro-
leum commiscebis, celeriter subinde
movendo, quousque omnia rite frige-
scant. Vbi omnia refrigerata fuerint, pul-
veres tenuissimos radicū pirethri, zibe-
ris & piperis insperges, de super thuris

N 4

& ma-

296 INSTITVTIONES

& mastiches pulverem separatim factum permisceris: ultimo euphorbium quam tenuissimè pulverisatum addes. Totum subactum ad usum recondes. Maxime autem in hoc parando unguento notandum, nullam descriptionem nos debere accipere præter istam quæ à Myrepso descripta est: nam & primus illam descripsit, & dosim simplicium optimam habet proportionem, respectu aliorum qui hanc descripserunt. Præpositus quoque hanc describit, & radices jari loco radicum iridis, radices sciscidis & folia, loco radicum malvæ silvestris usurpat: bryoniâ præterea & utramque policariam ultra hanc Myrepfi adiungit: atque ingredientium pondera ex dimidio contrahit: quorum fere nullum respondet ponderi à Myrepso descripto. Rursus simplicia Præpositus in oleo absque vino infundit, proclivi quidem lapsu, at tamen non negligendo. Itaque id unguentum componentes falli nolumus.

CAP. XVII.

Unguentum de Tuthia.

℞. Pompholygis lotæ, 3 vj.

Stibii

PHARMACEVTICÆ. 297

Stribii crudi usti & loti, ℥ j.

Sacchari candi, ℥. ss.

Trochiscorum alb. ℥ ij.

Butyri recētis sine sale loti, ℥ vj.

Misce, fiat unguentum cum lapide calaminari.

Confice sic. Sumito lib. ss. lapidis calaminariis, eamque in quatuor partes divide, ita ut pars una non excedat aliam. Prima autem pars igni incandescat: ignita in lib. j. aquæ rosarum, in qua prius coxeris foliorum ruthæ nostræ hortensis ℥. ss. & foliorum sceniculi ℥ j. extinguatur. Tum illa prima lapidis pars abjiciatur. Deinde altera pars in eodem igne ardescat, & in prædicta aqua rosacea restinguatur, & restincta dejiciatur. Rursus aliæ duæ partes, quæ restant, ut prius sigillatim incendantur, & in aqua supradicta extinguantur & ejiciantur. Tunc aqua per lineum pannum nitidum coletur: ac in ea demum aqua, butyrum pluribus ante vicibus aqua communi elotum, (aquam illam communem semper abjiciendo) longa agitatione penitus commisceatur: quod fiet, si aqua sensim butyro instilletur, non autem affatim affundatur: alioqui enim vix unquam coincorpo-

N 5

rantur:

298 INSTITVTIONES

rantur: dein pompholygem & stibium optime levigata (ut in superioribus emplastris & unguentis levigationis modum docuimus) butyro ita cum dicta aqua rosacea incorporato inspergas: de super saccharum candum rite pulverisatum, & albos trochiscos in pollinem redactos adijce. Omnia denique commixta ac subacta, scilicet in mortario plumbeo cum pistillo ex eadem materia facto, ad usum in pixide figulina vitreata servato. Adde \mathfrak{z} j. β . olei amygdalarum dulcium sine igne & recens facti, pluribusque vicibus cum æquis partibus aquæ rosacæ & fœniculi loti semper inter lavandum abjiciendo aquam pro quacunque vice.

STIBII CRVDI VSTI ET LOTI.] Stibium, stimmi, antimonium, unum & idem significant. Est autem stibium secundum Plinium lib. 33. capit. 6. lapis spumæ candidæ & nitentis, non tamen translucentis. Brassavolus vult esse plumbum. Alij lapidem plumbarium referre, magis tamen quam plumbum nitet, aut radiat, & magis friabile, manusque tingens. Alii marchesitam librariorum vel impressorum. Mathæus Sylvaticus lib. pandectarum

PHARMACEVTICÆ. 299

rum capit. 24. ait esse venam terræ simili-
 lem plumbo. Serapius lib. aggregat.
 cap. aitrud. idem cum Sylvatico sen-
 tit. Alii metallum esse asserunt, eo quod
 eliquatur ut alia metalla, & quia facile
 cum ipsis metallis commiscetur. Ex his
 variis sententiis, Plinii sententiam
 sequamur. Nam stibium est de genere
 fossilium quæ sapiunt naturam, &
 metalli & lapidis. Quatenus enim li-
 quatur ut metalla, sapit naturam me-
 tallorum: quatenus autem friabile, est
 revera de genere lapidis & metalli.
 Duo ejus genera reperiuntur, mas &
 fœmina. Mas horridior scabriorque, &
 minus ponderosus minusque radians:
 Fœmina contra nitet, friabilis, fissuris-
 que non globis dehiscens. Quæ discrimi-
 na possunt optime demonstrari in
 fodinis Germaniæ, ubi maxime abun-
 dat, ut à quodam amico Germano do-
 ctissimo accepi, se utrumque fodisse.
 Præstat autem stibium fœmineum, splē-
 didissimum, nitidum, in confractu
 crustosum, terræ & calculorum expers.
 Raro hodie fossile in nostris officinis
 habetur: excoctum vero seu eliquatum
 habemus. Vritur & lavatur in hoc un-
 guento ad sulphureas & acres partes

N 6 tollen-

300 INSTITVTIONES

tollendas: vel propter acredinem a sulphure contractam, ne oculis noceat: quæ ustio & lotio talis esse debet. Quātitatem quam voles stibij accipito, & in polinem tenuissimum reducito: deinde in fictile amplum non plumbatum, conijcito: tum demum carbonibus accensis ad calcinandum caute exponito, quoad corpuscula illa, quæ emicant, splendorem suum amiserint, vaporque sulphuris omnis cessauerit, foetorque obsoleverit, interdum tamen spatula ærea movendo. Stibium autem in calcem conversum subalbicans cineris faciem contrahet. Tunc ℥ iiij istius calcis in pollinem rediges, & in vini albi veteris ℥ ij. in fictili coopertorium horarum spatio macerabis: & infusione peracta vinum evaporabis paulatim super cineres calidos ad stibii ficcationem, ficcatum itidem in ℥ ij. lactis mulieris pariter macerabis, & lac super cineres calidos consumes. Consumpto lacte & stibio ficcato aliud lac affundes, & iterum stibium macerabis eodem igne ad lactis consumptionem, consumpto lacte & deficcatum stibium novies vel decies in æquis partibus stillaritiæ aquæ rosarum & fœni-

PHARMACEVTICÆ. 301

& fœniculi, semper abjiciendo aquam
& aliam stillatitiam innovando in mor-
tario lapideo ablues: atque hoc modo
stibium ustum & ablutum & ficcatum
reconde, tuteque ad oculorum affe-
ctus utere. Dioscorides lib. 5. cap. 59.
alium torrendi & exurendi modum
docet. Plinius quoque loco supra ci-
tato aliam methodum torrendi exhibet,
hos tu modos poteris diligenter
observare, si nostra non sufficiat præpa-
ratio.

Cœterum hujus unguenti nulla est
authoritas, sed experientia multa &
bona.

SECTIO III.

CAP. I.

De Oleis in genere.

QVandoquidem superiori sectione
unguenta universa, quæ passim in
officinis habentur in usu, qua fieri po-
tuit diligentia & brevitate à nobis ex-
plicata sunt: nunc ordine ad oleo-
rum conficiendorum methodum ac-
cedendum: quorum subjectum & ma-

N 7

ter

302 INSTITVTIONES

teria eadem est cum materia unguen-
torum & emplastrorum, cum ex qua-
cunque re habeatur oleum siue sim-
plex, siue compositum. Simplex ali-
quando sponte, ut petroleum: ali-
quando per expressionem siue aliqua
additione, ut ex simplicibus quæ suc-
cum habent oleaginosum, quemad-
modum ex tritis olivis maturis, vel
immaturis, quod maxime & proprie
oleum à Sylvio appellatur: item ex
nucibus, amygdalis, feminibus, &
consimilibus, ab eodem Sylvio oleum
abusive nuncupatur. Compositum ve-
ro aliquando per infusionem in oleo
communi, vel in alio, in sole, vel
igne lento coctum cum expressione
fit: ut rosatum, violatum, chamæme-
linum, anethinum & similia. Aliquan-
do per resolutionem coctione & ex-
pressionem, siue ulla additione, ut oleum
ovorum, de frumento. Aliquando per
artem chymisticam, hoc est, per ascen-
sum, vel descensum, ut oleum de ce-
ra, butyro, axungijs, lignis, femi-
nibus, & consimilibus. De quibus om-
nibus nobis est agendum, dempto o-
leo communi, seu maxime proprio,
quod omnibus notum est. De aliis igitur
tur

PHARMACEVTICÆ. 303

tur quantum rei scopus & ratio exiger
dicemus.

C A P. I I.

De Oleis in specie.

*Oleum Amygdalarum dulcium. à Mesue
descriptum 12 distinctione de oleis.*

℞. Ex amygdalis mundatis ab utro-
que cortice quantitatem quam vo-
lueris.

Et tere contritione ultima, & fac
pastones ex eis, & dimitte in loco cali-
do per spatium circiter horarum quin-
que, deinde iterum tere, & pone in
zaynari, & stringantur, & exprimantur
& emanabit oleum. Si autem in va-
se duplici circiter per horæ spatium
coxeris, deinde exprefferis in zayna-
ri, emanabit abundantius. At si amyg-
dalis tritis facellos impleveris, & sub ci-
nere calido, aut arena calida inter pan-
nos sepelieris, & postea exprefferis, a-
bundabit oleum. Modus operationis alius
est. Malaxentur in tina, sicut pasta ma-
xatur, & sit domus in qua malaxatur,
calida, & fundatur desuper aqua cali-
da parum, & stet pila seu mortarium
declivis

304 INSTITVTIONES

declivis ubi emanat oleum : & dum sic expresseris abundabit. Torculari autem planta inferior sit, habens concavitatem & emunctionem in parte decliviori, & in inferiori parte sit globus juxta formam capacitatis concavitatis, ut figillet omni hora ambitu vacui. Hic ergo erit modus formae ejus.

Amygdalarum dulcium, quæ recentes sint, amplæ, dulces, nec rancidæ, & cute membranosa expurgatarum lib. j. vel ij. vel iij accipe : eas in mortario lapideo nitido, pistillo ligneo, contritione ultima contunde (alii in mortario æreo illas contundunt) deinde panno aspero canabino involve & in zaynari, id est, torculari ad exprimendum inter moras vel paulatim imposito : ne subito & violenter comprimas, oleum sit turbidum & fœculentum : hoc namque modo oleum pellucidum, admodumque dulce habebis : quo recenti & non antiquato ad internas & externas corporis partes uti poteris, quia vetustate ob aëris intemperiem incalascit.

AMYGDALIS MUNDATIS A VTROQUE.] Purgantur amygdalæ, ut purius fiat oleum à cute membranosa sic.
Tor-

PHARMACEVTICÆ. 305

Torreantur & desiccentur in amplo fictili, aut in sartagine cum quadam quantitate furfuris mundi igne lento, manu versando atque agitando, donec cortex findatur & rumpatur calore: deinde cribrare oportet, ut à fursure purgentur: tum in sacculo ex linteo novo & aspero confricare, & confricando à cortice mundabuntur. Alii habent aquam puram frigidam in fictili mundo, & in ea amygdalas dulces spatium sex horarum ad macerandum imponunt, quas postea facile manu denu-
dant: ubi denudatæ fuerint, inter duo lintheamina spatium trium aut quatuor horarum desiccari permittunt: postea oleum in modum prædictum conficiunt. Vterque modus optimus sed prior altero excellentior. Cæterum minime dubium esse debet, hoc genus olei in quotidiano usu esse, necnon ab omnibus Medicis quotidie præscribi. Necessarium ergo erit amygdalas diligenter præparare, ne propriam & integram qualitatem deperdant: quæ (auctoritate Mesuæ eadem distinct. Præpositi lib. 2. particula 13. Fucshii lib. 2. sect. 14. Matheoli lib. 1. capit. 33. in Dioscoridem) posset facile immutari.
Si

306 INSTITVTIONES

Si igitur amygdalæ calefiant, in oleo extrahendo vel in aqua calida calorem contrahet oleum, quæ levi momento vel temporis successu calorem illi possunt conciliare, aut ranciditatem, cum temperatum esse debeat: tantumque abesse ut tum leniret, cum partes potius, quibus apponeretur, calefaceret. Quare (salvo meliori iudicio) præstantius & expeditius erit methodo à nobis præscripta illas parare, deinde oleum conficere: quæ ratio facilis est & excellentior, quam quæ à Mesue & aliis describitur: illaque adeo quotidie in officinis usurpatur, eodem modo paratur.

Oleum

E Nucibus,
 Avellanis,
 Persici Nucleis,
 De Cerasis,
 De Nuce Indica,
 De Pineorum Nucleis,
 De Sem. papaveris,
 Lactucæ,
 Cucurbitæ,
 Cucumeris,
 Melonis,
 Citreoli & similia.

Oleum

PHARMACEVTICÆ. 307

*Oleum Laurinum, ut Mes. & Diosco-
rides, sic conficitur.*

Bacchæ Lauri maturæ, & recentes
terantur in pila, ex aqua in lebete co-
quantur, post torculari plano, non ca-
uo exprimantur in vas subjectum, in
quo Oleum aqua supernatans colligi-
tur. Affusa calente aqua iterum teran-
tur, & exprimantur torculari à nobis
præscripto, & reponatur.

C A P. I I I.

*Et ita Oleum Ovorum ex 12 di-
stinctione Mesuæ.*

Accipe vitella ovorum elixatorum
circiter xxx.

Et comminue ea manibus, & po-
ne in sartagine lapidea, & frige super
ignem, movendo cum ligneo aut fer-
reo cocleari, donec rubescant, & re-
solvatur ab eis oleum. Et tunc expri-
me ea cum cocleari, & manabit abun-
dantius.

Ova recentia gallinacea accipian-
tur, quæ in aqua calida probe igni in-
sistuntur facies, non autem in cine-
rebus calidis (ut efficacius efficiatur
melleum) illaque manu decorticabis,
& al-

308 INSTITVTIONES

& album auferes, vitellosque illorum manu vel spatula lignea confricatos sartagine figulina, flagrantissimo igne apposita, rursus spatula lignea (non autem ferrea propter nigredinem) affrictue celeriterque undiquaque agitando, consue dum affi vel tosti sint, vel in chylum æquabilem pervenerint. Tunc subito & sine mora linteo rudi calido involve, & torculari immitte: quod statim expresseris oleum, flavum emanabit, quod repones ad usum. Hoc ita extractum, quia crassum & maximum terrestre est, potest subtilius fieri (nisi scopus auctoris varietur) si cucurbita aut retorta, in quam oleum imponitur bene cum recipiente lutata & obturata (ne spiritus in auras effluant) cum aqua vitæ & sale fusili (ad fæces retinendas ita ut eadem aquæ & salis fusilis quantitas sit, in arena vas ad distillandum apponatur. Apposito vasi pro animi arbitrio ignem subdito, & continuato, donec totum oleum distillatum sit. Revera si spectemus scopum istius olei, rectificatio hæc minime fieri debet, sed potius absque rectificatione uti debemus.

C A P.

CAP. IV.

*Oleum de terebinthina simplex ex the-
sauro Evonymi Vsuale.*

Accipe terebinthinæ claræ quantum
videbitur.

Cineris è ligno duro aut forti, ℥ iij.
ne eleuetur distillando.

Et in retorta fornaci accommoda,
a principio fiat ignis lentus ad humi-
ditatis dissolutionem, postea augeatur
ignis ad olei distillationem.

Oleum terebinthinæ fieri potest arte
hymistica, in cucurbita vitrea cum ca-
pitello rostrato, vel in retorta: ita ut
intrumvis vas terebinthina sit semiple-
um, absque arena, aut cinere è ligno
duro, & optimè obturatum cum reci-
piente amplissimo, vt spiritus libere spa-
ri possint (alioquin vas rumperetur)
cucurbita vel retorta terebinthinam
continens, vasi arena pleno imponatur,
& super furnum quadratum adaptetur
ut distilletur. Tum ignem mediocrem
facito, & continuato, donec ex lib. j te-
rebinthinæ ℥ iij olei clari ac albi ha-
ueris. Tunc ignem parum augebis,
continuando, quousque tibi sit ℥ ij. olei
subrubi,

310 INSTITVTIONES

subtusi, aureique coloris ac lucidi. Per
terea rursus ignem augebis, dum rum
iterum $\frac{3}{4}$ ij s olei rubri croceique
loris & clari effluent.

Hac enim methodo tria genera
terebinthinæ arte & industria facta
bebis. Tandem hoc unum operan
erit notandum, ut pro quacumque ig
auctione recipiens permutetur ad ol
diversa è terebinthina recipienda, q
diligentissime in vitreis vasis obtura
fervabis, & cum opus fuerit uteris.

C A P. V.

Oleum Ros. completum Mesuei.

\mathcal{R} . Rosar. rub: recent: & compl
tarum, scilicet apertarum, q. s.

Oleo ex Olivis vel Sefamino recent
ti, & aqua fontana aliquoties loto, m
cera in vase vitreo, diebus septem in
sola: coque tribus horis in vase dupl
ci. Expressis foliis, & abjectis, nov
imponere: insola iterum dies septem
coque ut prius: tertio idem fiat. Dein
de aquæ infusionis rosarum dictæ i
Syrupis quantum est Oleum, misce
opercula, insola dies quadraginta; po
excola, & iterum diu insola.

Sin

PHARMACEVTICÆ. 311

Sint folia pro qualibet libra Olei ad pondus sex unciarum vel quinque saltem. At Dioscoridis tempore in lib. j ss. lib. ss. ponebant. Sint folia exungulata, jubente Dioscoride; fit enim Oleum validius: portio enim illa alba incocta existit, & vim astringentiam in se continet. Sed dicant mihi quæso Seplasia-rii, quisnam est illorum, qui hæc omnia agat? Quis enim Oleum abluit? Quis per Rosas immutat? Quis decoquit illas diplomate? Quis infusionem addit? Oii immortales, quid magis impium, & iniquum quam ægrotantium afflictorū, & dolore acerrimo, ac ardenti inflammatione excruciatorum sanitatem impedire; imo & sæpe affectus illos augere? Ab acri enim oleo minime ab-uto, & à pauca Rosarum quantitate quæ semel immergunt, & in ipso ma-erant, Oleum imperfectum evadit: at si forte fortuna ter Rosas novas in Oleum injiciunt, completum vocant: si unicavice, simplicem dicunt, spernentes Mesuei decreta. Arbitror tamen aliquem probum virum inveniri illius mandata servantem.

Oleum Rosatum Omphacinum.

Hoc ex Olei olivarum immatura-
rum,

312 INSTITVTIONES

rum, & foliis Rosarum nondum apertarum
rum conficitur.

Arbitror ego à paucissimis componi
hoc Olei genus ad Mesuei mentem
Pro immaturo enim, magis ignavia
quam avaritia ducti maturum sumunt
Oleum.

Idem modus operationis est cum
Oleo Violaceo, ex floribus.

Absinthino, cujus summitates capiuntur
pe,

Anethino,

Rutaceo,

Majorano,

Nardino,

Menthino,

Papaverino, ex capitibus, foliis
& floribus,

Chamæmelino,

Liliaceo,

Cheirino,

Sambucino,

Nenupharino, &c.

℞. Olei Olivarū maturi loti lib. ij
Comarum Absinthii, vel Lilio
rum flor. vel

Chamæmeli lib. ℞. Alij ℥ iij.

Vini Rub. vel Succij ejus, vel
decoctionis ℥ viij ℞.

Qua

PHARMACEVTICÆ. 313

Quæ conficiantur eadem methodo,
qua uſi fuimus in Oleo Roſato cõpleto.

C A P. V I.

Oleum de Cotoneis Meſuei.

Accipe carnium cotoneorum trito-
rum

Cum cortice ſuo, quibus medietas
accidit maturationis.

Succieorum ana Partes æquales.
Olei ex oliuis incompletis, quantum
ſuffic.

Et pone in vafe vitreo per dies quin-
decim ad ſolem, deinde coque in vafe
duplici per horas quatuor: poſt illud
ſiat permutatio cotoneorum, & ſucci
eorum: fiat ſicut diximus bis, vel ter,
deinde cola & reconde.

Cotonea poma lanugine deterſa ro-
bunda & odorata pene immatura, ari-
ſque locis nata ad hunc uſum laudat
Plinius: quæ cum corticibus infuſio-
nem, & ſuccum parandum in ſcobem
uenem cum lima lignea radere oport-
et: deinde in panno canabino, rudi,
celeriter torquendo, ut emanet ſuccus
exprime. Expreſſum, & pariter ſcobem
uenem non expreſſam, quantitate ido-
nea,

nea, una cum olei quantitate præscripta, xv. dierum spatio ad macerandum in fictili cooperto ad solem exponenda. Macerata in diplomate, ad succi humidique consumptionē decoquantur. De coctione facta torquendo colentur: & colaturæ succus recens ac recentia cotonea, ut prius præparata, dicto fictili cooperto immittantur, & rursus totidem diebus insolentur, & eodem igne supradicto ad humidi peremptionem decoquantur. Post coctionem & colationem, alia cotonea atque succus expressus colaturæ injiciantur, & superior doctrina insolentur & coquantur. Idem, si præstantius vis habere oleum bis aut ter dicto modo repetes. Postremo colatum repones: eritque constans & certa ejus facultas.

CAP. VII.

*Oleum Irinum Mesuæ xij. distinct.
de oleis, Vsuale.*

Accipe radicem Ireos quantitate aliquā & florum ejus duplū, sunt lib. ij. Aquæ decoctionis radicū ejus quo suffic. lib. ij.

Et funde super ea

Oleum

PHARMACEVTICÆ. 315

Oleum sesaminum aut de olivis maturis quantum oportet.

Et decoque in duplici vase, deinde permuta radices & folia liliorum, & fac ut diximus de oleo rosato.

Radices recentes tempore & loco collectas minutissime incilas ac velociter in lapideo mortario cum pistillo tussas, una cum floribus recentibus medio-criter tufis, in oleo sesamino, fictili cooperto impone (aut oleum commune olivarum dulce, infalsum ac maturum accipe) spatioque vij. dierum calidè macerabis: deinde in diplomate ad humidum radicum & florum consumptionem coquantur: denique calide torquendo vehementer exprimatur. Tunc tantundem radicum & florum simili bonodo tusorum, in expressione colata eodem vase obturato immitte, ac rursus insolari per dies septem dimitte. Post hæc ut prius prædicto igne ad humidum consumptionem percoquito; deinde extorquendo calidè comprimendo, radicesque unâ cum floribus ficcis subjicito: & tantundem recentes conunde, & in oleum colatum impone una cum aquæ decoctionis radicum in quantitate prædicta, eodemque fictili
O 2 cooperto

cooperto soli ad macerandum dierum
septem spatio expone. Peracta mace-
ratione, igne levi, hoc est, in diplomat
vel cineribus calidis percoque, ut to-
ta radicum humiditas, florum, & aqua
decoctionis radicum consumatur. Hu-
miditate consumpta canabino panno
calide oleum transcoletur, colatum
vero optime coopertum ad usum con-
servetur.

Cæterum neminem latere debet A-
lexandrinum capit. 718. hoc describere
& pariter Myrepsum nu. 30. variantq
ab isto. Dioscorides lib. i. cap. 55. pre-
tiosissimum habet, sed nobis factu o-
ingredientium inopiam impossibile.
Præterea notabimus ad decoctionem
prædictam faciendam radicum ireos \mathfrak{z}
xij. cum aquæ fontanæ lib. iij. β . suffi-
cere: totumque ad medias coquer
licet, aut paulo plus. Atque hæc ideo
monui, ut nihil tyrunculi temere agant

C A P. VIII.

Oleum mastichinum Mesuæ.

Accipe olei rosati. \mathfrak{z} xij

Mastiches. \mathfrak{z} iij

Vini boni aust. \mathfrak{z} viij. in alio \mathfrak{z} iij

Decoqu

PHARMACEVTICÆ. 317

Decoque sicut prius ad vini consumptionem.

In vase æreo vel fictili mastichen electam crassiuscule pulverisatam, unctum oleo rosato, & vino rubro austero (propter astringentem & confortantem) ad coquendum in diplomate pone, spatula movendo, donec vinum sit omnino consumptum, quo consumpto oleum transcoletur, & usui servetur. Notandum Præpositum 13. particula lib. 2. eas duas à Mesue descriptas recensere: alteram præterea Alexandrini ex cap. 35. desumptam. Myrepsus duas etiam descriptiones assignat. Sect. 16. nume. 38. & 39. omnes ab alijs invicem differentes simplicibus & ponderibus, & maxime ab ista, quæ in usu quotidiano est ex Mesuæ descriptione.

C A P. IX.

Oleum de euphorbio Mesuæ.

℞ Euphorbii rec. 3. ℥.

Olei de cheiri. 3. v.

Vini odoriferi tantundem.

Decoque usque ad vini consumptionem, & utere.

Recens.

O 3

318 INSTITVTIONES

Recens euphorbium accipito: si autem recentem recentem careamus, veteris duplicem vel triplam esse debet proportio. Illud in tenuissimum pulverem reducito: semel inter pulverisandum paucum vino aspergito, ne nares feriat. Pulverisatum una cum oleo, vinoque rubro, lento igne, vase duplici, spatula movendo ad consumptionem vini prædicti decoquo. Coctum nec colatum ad usum reconde.

Maximè hic notandum, Galenum in fine lib. 2. pharm. pro vario scopo oleum de euphorbio parare. Sic enim inquit, si euphorbium invalidum sit, vel si vetus est ut bimum, trimum, & jam pallidum, aut flavum, 3. vj. si sensus in auribus vel parte alia est acerrimus minus, semiunciam vel 3. iij. si obtusus, validi euphorbii 3. ss. vel 3. v. præferim si affectus est contumax, ut alopecia, licet apponere. Quocirca diligenter attendat Pharmacopœus electionem veram euphorbii, antequam istud oleum conficiat, ut possit hanc compositionem rectè parare. Cæterum notabimus, Galenum lib. 2. de compositione medicament. secundum loca, oleum commune maturum ad lib. i. capere

PHARMACEVTICÆ. 319

operare in quantitate prædicta euphorbii,
illudque minuere aut augere pro scopo
vario, eodem modo procedendum est
cum Oleis

De piperibus

De Nardo simp.

De Castoreo Simp. & aliis.

C A P. X.

Oleum costinum Mesuæ.

℞. Costi amari. ℥. ij.

Cassia lignæ. ℥. j.

Extremitatum samplici. ℥. viij.

Vini odoriferi quantum sufficit ad
infundendum noctibus duabus.

Olei sesamini. lib. iij.

Decoquantur sicut oleum nardinum
horis sex.

Radix costi, & cassia lignea simul
probe concassentur & in vino odorife-
ro una cum extremitatibus samplici
viridis crasse contusis, fictili novo co-
operto spatio horarum quatuor, ad
summum sex, ad infundendum super
cineres calidos imponantur. Alii spa-
tio unius diei simplicia infundunt: una
cum oleo sesamino aut ejus succeda-

O 4

neo:

320 INSTITVTIONES

neo: & in diplomate omnia ad humi-
di consumptionem coquunt: vbi cocta
fuerint calide exprimendo transco-
lant. Colatum vero oleum ad usum
reservant.

C A P. X I.

*Oleum lumbricorum terrestrium
incerto authore frequens.*

℞ Vermium terræ. lib. ij.
Olei olivarum maturi & loti.
lib. iiij.

Vini nigri & generosi. ℥. viij.
Bulliant omnia simul & fiat oleū, de-
inde percolerur.

A terra separentur lumbrici, & la-
uentur diligenter in aqua fontana plu-
ribus lotionibus, donec à terra sint im-
munes, semper tamen aquam pro qua-
cumque lotionem innovando. Peracta
lotione, in vase cooperto vna cum vini
nigri generosi lib. i. ss. & oleo prædicto,
vase duplici ad vini fere peremptionem
coquantur: dein per pānum rudem ca-
nabium colentur: colatum ad usus ne-
cessarios recondatur. Petrus Monta-
gnana in antidotario suo capite. 6. de
oleis unum habet minime varium.

C A P.

PHARMACEVTICÆ. 321

C A P. X I I.

Oleum de croco Mesuæ.

℞ Croci, ℥. j.
Myrrhæ puræ, ℥. iiij.
Cordumeni, cum Sylvio Cardam.
℥. iij.

Calami aromatici. ℥. viij.

Infundantur medicinæ in
Aceti, ℥. viij.

Diebus quinque, præter cordume-
num : die sexto proiciatur super ea
cordumenum & dimittatur die uno,
deinde fundatur super ea

Olei lib. j. s.

Et coquantur lento igne vsque ad a-
ceti consumptionem : & sunt qui loco
aceti vinum ponunt.

In fictili cooperto calamum aroma-
ticum crasse tusum, crocum integrum,
& myrrham confractam, vna cum aceti
℥. viij. vel ℥. x. diebus quinque calide
infundes, sexto die desuper cordume-
num mediocriter tusum proicies, &
badhuc spatium unius diei omnia macerari
permittes : maceratis & infusis oleum
olivarum immaturum lotumque affun-
des,

322 INSTITVTIONES

des, & lento igne ad aceti consumptionem, spatula movendo, concoques: cocta per pannum rudem colabis: colatum reconde & utere.

Avicenna 5 canone Summa 1. Tract. 10. unum describit. Alexandrinus cap. 732. alterum habet, qui minime cum Mesue convenit.

C A P. X I I I.

Oleum de capparibus incerto auctore.

℞. Corticum radicū capparum, ℥ j.

Corticum tamarisci,

Foliorum tamarisci,

Seminis agni casti,

Asplenij, seu ceterach,

Cyperi, ana ℥ ij.

Ruthæ. ℥ j.

Aceti albi,

Vini albi clari odoriferi, ana ℥ ij.

Olei maturi olivarum, lib. j.

Coquantur in duplici vase ad aceti & vini consumptionem.

Radices cyperi minutissime incidantur, & in mortareo æreo una cum corticibus capparum & tamarisci obiter tundantur: tussæ fictili novo cooperto injiciantur, Desuper semen casti confusum,

PHARMACEVTICÆ. 323

tusum, folia ruthæ, tamarisci & scolopendriæ separatim in mortario lapideo contusa imponantur: mox acetum & vinum una cum oleo desuper affunde, & spatio xv. dierum insola, peracto die infusionis in diplomate vel in cineribus ad vini & aceti consumptionem concoque: statim cola, colatum usui reserva.

Animaduertite plures esse hujusce olei descriptiones apud Musam Brassavololum ab ista differentes. Nam aliæ recipiunt corticem radicis capparis, scolopendriam, tamariscum, absinthium, oleum commune & acetum. Aliæ radicem corticis capparis, radicem iridis, agnum castum, tamariscum, oleum, & vinum. Aliæ cortices radicis capparis, scolopendriam, tamariscum, iridis radicem, radices cyclaminis, galanogam, oleum & acetum. Aliæ radicem corticis capparis & iridis radices, agnum castum, tamariscum, oleum, & vinum. Idcirco parva mihi videtur differentia, & video omnes pro animi arbitrio istud oleum parare. Tamen quamuis reperiantur multæ descriptiones diversæ, ista præscripta mihi videntur usitata & longa experientia celebrata.

O 6

CAP.

Oleum de scorpionibus simplex Mesuae.

℞, Scorpiones circiter xx. vel plus vel minus, secundum quantitatem eorum, & pone in vase vitreo, & funde super eos olei amygdalarum amararum lib. ij. &

Stringe caput vasis, & dimitte in sole diebus xxx. deinde cola & utere.

Terrestres ac vivos scorpiones secundum eorum magnitudines, hoc est, si magni, crassi, & plurimum farcti sint, viginti: si vero parvi quadraginta quinque, vel ad summum l. accipe, & vase vitreo cooperto ipsos una cum quantitate olei amygdalarum amararum prædicta, soli diebus canicularibus, ipotio xxx. dierum ad macerandum appone. Melius si antequam soli apponantur, igne levi bullirent tribus vel iiij. ebullitionibus, quamvis non sit scopus authoris scorpiones decoqui, sed tantum macerari. Exactis diebus macerationis oleo minime colato reconde, & utere.

PHARMACEVTICÆ. 325

C A P. X V.

Oleum vulpinum Mesuæ.

℞. Vulpem integram, cujus interiora sint evulsa,
Et pone in vase, & infunde super ipsam,
Aquæ fontium &
Aquæ marinæ, ana Kist. j.
Olei antiqui clari, Kist. ij. ss.
Decoque igne lento cum
Salis, ℥ iij. +

Vsque ad aquæ consumptionem, deinde pone in vase, & projice super ipsam

Herbæ anethi &
Halasech, seu Thymi, ana lib. j.
Et funde super ea
Aquæ dulcis in qua coctæ fuerunt ex iisdē herbis, ana M. j.
Decoque sicut prius usque ad aquæ consumptionem: & administretur.

Vulpem integram mediæ ætatis pinguem, venatu longaque insectatione defatigatam (quia tunc oleum fiet digerentius) recenterque occisam, cujus interiora sint evulsa, accipito, & minutissime cōscindito, ut ab ossibus medulla

vid. creata in finem

la defiliat : & in quantitate olei & falis communis prædicta, fictili novo & amplo ponito : desuper aquæ marinæ & fontanæ lib. xij injicito. Melius si leuiter vel ad medias in aqua decoctionis herbarum, fontana & marina absque oleo coquatur vulpes, ne oleum nimia coctione uratur, & vis ipsius vulpis facilius eliciatur coctione aquarum quam oleorum. Coctæ ad medias oleum addatur & ad reliquum humiditatis coquatur igne lento: consumpta fere aqua aliæ item aquæ dulcis in qua anethi & thymi singulorum M. j. incocti fuerint circiter lib. viij affundito, simulque cum lib. j. thymi summitatum & lib. j. summitatum anethi ad hujus aquæ peremptionem & artuum dissolutionem, vel ut ipsius pinguedo ac caro in jus colliquata abierint, & omnia sint liquefacta præter ossa recoquito: deinde velociter extorquendo calide exprimito: expressum ad usum recondito.


Hæc sunt (candide lector) quæ duobus hisce libris tuum in usum comprehensa, crebro amicorum suasu & rogatu impulsî in lucem tandem emisimus. Fructum vero laboris nostri ad eos uberrimum spero peruenturum, qui rei medica-

PHARMACEVTICÆ. 327

medicamentariæ ferio addicti, præcepta & consilia nostra insequentur. Nos si quid ad publicam utilitatem contulerimus id singulare Dei. Optimi Maximi beneficium esse agnoscimus. Interim dum tu qualescunque has ingenij nostri primitias explorabis, ad alia studia, non minus his utilia, animum & calamus paramus. Vale.

FINIS LIBRI SECVNDI.

SOLI DEO GLORIA.



IN

INDEX EORVM

Quæ hoc libro continentur.

Tractatus universalis.

D E Ponderibus,	pag. 1
De Mensuris,	8
De Manipulis,	11
De quibusdam generalibus, & officio	
Pharmacopœi.	15

LIBRI PRIM I

SECTIO I.

C onservæ quare præparandæ, quan- do cõdiendæ, & quomodo, pag. 19	
Cynosorchis quid? ejus electio & præ- paratio,	20
Modus condiendi Rad: Satyrionis, ibid.	
Rad. Symphiti majoris, Iridis, Acori, Enulæ campanæ conditura,	21
Formulæ condiendi Rad: Buglossæ, Boraginis, Cichorii,	22
Radix Eryngii quid? ejusque condi- tura.	23
De Corticibus Arantiorum, Limonum Citronorum, &c.	34
De caulibus lactucæ,	25
De conditura fructuum: ut Nucum vi- ridium, Amygdalarum, Berberum, Pyrorum, Cerasorum, Abricotti, Cy- doneo-	

I N D E X

doneorum, Prunorum, & Olivarum, &c. 26

De Foliis condiendis quomodo & quando, 28

De Florum conditura, quomodo & quando ejus electio, 31

De Cons: Ros: rubrarum & melle Rosato, tripliciq; conficiendi modo, 3

De melle Anthosato. Mercuriali, & passularum, 36

S E C T I O I I.

DE Sapis in genere, & specie, 38
Rob quid? simplex, & compositum, 39

Diamorum quomodo conficiatur. Dianucum, 40

Quomodo Berberes, Omphacinum, Cerasa S. A. componantur in formam Sapæ, 41

Mira Cydonea simplex, & composita, 42

De Iulapiis in genere, & specie, 42, 43

Iulep quid? & quomodo paratur, 44

Iulapium Rosarum, ibid. Violarum, Iulapium zizyphorum. 45

S E C T I O I I I.

DE Syrupis in genere, & specie, 45

De simplicibus, & compositis, ibid.

Cur

I N D E X.

- Cur inventi & à quibus, 46
- Syr: Acetosi simplex, ad humores præparandos, eorum putredinē coercendam, obstructas vias expediendas, 48
- Oxyfaccharū fere idem præstat, 48, 49
- Syr: è rosis Siccis. Ad catharrum tenuem ventriculumq; roborandū, 50
- Syr: Ros: laxat. ad biliosos, serososque humores è primis visceribus leviter detrahendos, ibid.
- Syr: Violatus ad humectandum, & error pharmac. 51
- Syr: de Pomis simplex ad melancholiā & terros vapores infringendos, 52
- Syr: de Buglossa, boraginis id etiam præstant. ibid.
- Syr. Intibi Sarivi ad Iecoris, lienis, aliarumque rerum vitia solvenda, 53
- Syr: de Glycyrrhiza & Hyssopo: incidunt, tenuant, detergunt, expurgantque Thoracis pulmonumque vitia, 54
- Syr: de Absinthio. Ad ventriculum & jecur corroboranda, 57
- Syr: de Byzanthiis simp: & comp: ad viscerum obstructions, 57
- Syr: de Cichorio comp. Ad aperiendum & abstergendum, 59
- Syr: de Eupatorio, easdem facultates obtinet

I N D E X.

obtinet. Varię quæstiones, & solutiones, 62, 63, 64.

Syr: de Epithymo ad melancholicum humorem. nota errores, 65, 66, 67

S E C T I O I V.

DE Eclegmatis, seu Loch in genere & specie, 68

Quid eclegma, loch, vel lodoch, & linctus, unde nomen, 69

Loch de caulibus gordonii, ad asthma, 69

Loch de Scilla idem facit, sed paulo fortius: ejus electio, & præparatio, 70

Eclegma de pulmone Vulpis, ejus præparatio ad phthisin, ad ulcera tabidorum agglutinantia, 71, 72

Loch sanum & expertum, 73

Ad Asthma, spirandi difficultatem, tussimque veterem.

S E C T I O V.

DE speciebus Aromaticis in genere & specie, 75

Cur pulverisanda aromata, 76

Ad tabellas conficiendas quomodo, 77

Species Diaanthos. Ad cerebrum imbecillum corroborandum, tristes ac melancholicos roborandos, 78

Lignum

I N D E X.

- Lignum aloes quod præstantissimū, 79
- Diapinidion, ejus compos: cautio: ad
pleuritidem, peripneumoniam, ta-
bem, tussim cum febris, fauces, &
asperam arteriam, 80
- Diarrhis ad frigida & inveterata pulmo-
num vitia, ut tussim, asthma, ranci-
tatem, 81
- Diamargaritō Frambosarii ad cor cor-
roborandum, & ad malignam conta-
giem animique Syncopem. 83
- Margaritarum electio, & præparatio,
20 lapid. pretios: Coralli, Succini,
Scobis eboris, Serici crudi, &c. Suc-
cedaneum eboris, 84, 85, 86
- Succedaneum ligni aloes, 88
- Aromatici Rosati ad ventriculum cœ-
teraque viscera corroboranda, con-
coctionem adjuvandam, humores su-
pervacuos absumendos, flatuq; dis-
cutiendos moderato calore, 89
- Exhilarans Nicolai. Ad mœrorem,
melancholiam, cordisque tædia dis-
cutienda, concoctionem juvandam,
præparatio ossis è corde cervi, ubi
reperiatur, & discrimen caprarum,
90, 91, 92
- Diarrhodon Abbatis, id præstat fere
quod arom: Ros. pro Rhapontico
Rha-

I N D E X.

Rhabarbari feces, 94
Diasantalorum ibid. & quot numero.
Diaspermatos seu de seminibus. Ad
Renes, & vias urinæ, ac feminis,
ab omni humoris illuvie clementer
expurgandas, & modus præparandi
sanguinem Hirci, 97

S E C T I O VI.

Electuarium quid? unde nomen ejus
genus & species, 97, 98
Electuarium de succo Rosarum. Ad
bilem flavam, aliosque humores te-
nues è distantioribus locis proli-
ciendos, 98
Quid Scammonium, & ejus præpara-
tio, aque electio, 99
Elect: Diacarthami, ejus nomen, Tur-
perthi correctio. Ad pituitam cras-
sam, ac bilem illi permixtam sero-
fosque humores è distantissimis lo-
cis evacuandos, 100, 101, 102

S E C T I O VII.

Elect. Diacatholicon. Ad omnes æ-
qualiter humores purgandos, 102
El: diapruni solutivi, ad bilem expur-
gandâ, cæterosq; humores, 103, 104
Elect: draphœnici, seu draturpheti. Ad

pituia

I N D E X.

- pituitam cum bile educendam, 10
Conf. Hamech. Ad atram, flavamque
bile cum pituita salsa evocandā, 10
Benedicta laxativa ad pituitosos hu-
mores, crassos atque serosos, 11
El: Lenitiv. Viscera lenit, alvum sub-
ducit, purgat choleram, & mitiga-
febrem, 11
Elect: Hieræ gal: simp: Ad repurgan-
dam bilem, pituitam, ventriculo, in-
testinis venisque meseraicis inpa-
ctam, 11
Elect: Hieræ Diacolocynthidos. Ad
crassos lentosque humores ex qui-
buscunq; corporis partibus evacuan-
dos, varios inde natos morbos cu-
randos, 11

S E C T I O V I I I.

- D**E Opiatis in genere, & specie, 11
Mithridatiū. Ad frigidos affectus,
ad principes partes corroborandas
valet, nosque ab exitialibus venenis
tuetur, 11
Theriaca. Ad virulentarum bestia-
rum ictus, idem ut Mitrid: 12
Conf: Alkermes & ejus præparatio:
quid denique faciendum cum lapide
Lazuli. Ad refarciendas vires exolu-
tas

I N D E X.

tas, ad domandam melancholiam,
cordisque tedia depellenda, 127

Philonium Rom. seu magnum. Ad som-
num accersendum, distillationem
sistendam, ac acerbissimos dolores
colicos, nephriticos, atque pleuriti-
cos consopiendo, 119

Requies Nicol: prodest febribus acu-
tis & maxime Typice laborantibus,
ut quartanariis, quotidianariis, &
tertionariis, 130

S E C T I O IX.

DE Pilulis in genere, & specie, 132
Pilulæ Aggregativæ, ad humores
omnes ex capite, hepate, ventriculo,
aliisque visceribus evacuandos, 133

Sine quibus, profunt pituitosis, & me-
lancholicis præcipue ex capite, & o-
culis trahendo, 135

Lotio, & præparatio aloes, dubium ejus
& solutio Auræ. Ad bilem cum pi-
tuita è distantioribus locis valenter
proliciendam, 136

Fumariæ. Ad biliosos humores vitiaque
cutis emendanda, 137

Agarici. Ad pituitam crassam, & len-
tam in capite, & thorace conten-
tam, unde distillationi & asthmati
pecu-

I N D E X.

- peculiares, 132
- Cochiæ Rhafis. Medetur cerebro, nervis & eorum morbis, 132
- Hermodactylorum. Ad lentos & crassos humores in extremis artubus evellendos, 142
- Fœtidæ D. Mesuæ, animadversio super pra gummi & rad: Ezulæ. Ad crassos humores, & serosos, nec arthritidi tantum frigida, sed etiam calida conducunt, 142, 143
- Lapidis Lazuli: ejus præparatio. A bilem atram, & pituitam crassam præcipue ad maniam cancrum & alios melancholicos affectus, 143
- Stomachicæ, corroborativæ etiam diætæ, vel Ante cibum D. M. Ad concoctionem juvant, & blande ventriculum expurgant, 143
- Rufi seu pestilentialia putredini resistunt, & contagio pestiferæ luis, 143
- Affaret. Ad laxum ventriculum roborandum ac biliosa ejus excrementa leviter evacuanda, 143
- De Eupatorio, ad imbecillum jecur corroborandum, bilem illam obstruentem clementer educendam, 147
- De Hiera cum Agarico. Ad ventriculum roborandum illumque cum cerebro,

I N D E X.

cerebro, pituitosis excrementis repurgandum, 148

Cynoglossæ. Ad omnes distillationes cohibendas, five in pulmones, five in dentes aut alio procumbant, doloresque inducto sopore compefcendas, 148

S E C T I O X.

DE Trochiscis in genere, & eorum usu. & quid Trochisci? 149

Ratio eorum compositionis, 150

In specie. Trochisci de agarico. Ad

Pituitam in cerebro, & Articulis rentam, expurgandam, 150

Alandal. Ad crassam, & lentam pituitam validius à remotissimis evellendam partibus, 151

Bechicæ seu sub lingua. Ad sputum educendum, ac raucitatem, & assiduam tussim compefcendam, 151

De Myrrha. ad fœtum mortuum excludendum, & secundas, ac menses ciendos, 152

De Capparibus. Ad Hepatis duritiem, lienisque obstructionem, 153

De Absynthio. Ad ventriculum, heparque corroborandum, eorum obstructionesvolvendas. 154

P

D

I N D E X.

De Gallia moschata. Ad cerebrum, co-	
corroborandū, ac os, & corpus odo-	
ris suavitate perfundendum,	15
Cyphi. Ad Mithridatii cōpositionē,	15
Hydicroi. Ad Theriacam componen-	
dam,	15
De Spodio. Ad immodicum alvi Fluo-	
rem, ac febrem continuam, ad lætifi-	
candum cor, & viscerum inflamma-	
tionem,	16
Spodium quid?	16
De Viperis, earumque electione, a-	
præparatione. Trochisci conficiun-	
tur pro eadem Theriacæ compo-	
sitione,	15
De Scillis, earum electione, præpara-	
tionem, & usu,	15
De Carabe. Ad omnem Hemorrh-	
giam sistendam,	16
De Alkakengi. Ad Renum, Vesicæ ex-	
ulcerationes, ad diffuriam, ardori	
urinæ, & sanguinis mixtionem com-	
pescendam,	16
De Albo Rhafis. Ad incrementis O-	
phthalmiæ curationem,	16
Cerusa quid: ejus lavandi modus,	16
Lectori salutem,	16

LIBER

I N D E X.

LIBER SECVNDVS.

SECTIO I.

DE Ceratis & Emplastris in genere.

Illorum differentia ab Emplastris, Vn-
guentisque, 168

Materia ex qua hæc conficiuntur, 168

Ceratum Santalinum, 169

Phlegmonas & intemperaturas cali-
das, ventriculi, hepatis, extinguit. 174

Ceratum Vigonis, 176

Malignam qualitatem in morbis oppu-
gnat, & fugat ob Mercurium, emol-
lit, & dirigit.

Lumbricorum lotio, 178

Differentia inter pinguedinem & adi-
pem, 183

Quales Ranæ eligendæ, & quando, 184

Lythargyri electio, ibid.

Infrigidans Galeni, 186

Refrigerat ardentes febres, hepar, &
sedat dolores capitis.

Emp. Diachylon parvum, 187

Scirros hepatis, lienis, & durities reli-
quas emollit.

Muscagines quomodo sunt conficien-
dæ, 189

I N D E X.

Emp. Diachylon magnum,	192
Tumores calidos digerit & maturat,	
Electio Scyllæ,	194
Icthyocolla, quid? & ejus utēdi modus,	
Oesypus, quid? & ejus præparandi mo- dus,	196
Approbatio Resinæ pini,	197
Emp. Gratia Dei,	197
Ad vulnera detergēda & consolidanda.	
Cera & Propulus, quid? illorum electio,	200
Emp. de Ianua, seu de Betonica,	202
Ad vulnera mundificanda & incarnan- da, cum inflammatione sananda.	
Emp. Ceroma, seu Ceroneum,	205
Ad Scapularum dolorem & pectoris, ad universam hydropem, ad intestino- rum tormina & inflammationes ma- tricis, mirabile.	
Emp. Oxicrocium,	208
Prodest ossibus fractis, item partibus quæ dolore aliquo affliguntur, duri- tiam denique omnem emollit, & discutit.	
Emp. Tripharmacum,	209
Facit nasci carnem in vulneribus & consolidat ea.	
Emp. Palmeum, seu Diachaciteos,	211
Ad omnes recentes fluxiones sisten- das,	

I N D E X.

- das, ac veteres insuper resolvendas,
ulceraq; dysepum lotica glutinanda.
- Emp. de Pelle Arietina, 214
- Ad Enteroselem, & intestinorum ra-
micem, & herniam.
- Colophonia, quid? locus à quo defera-
tur, viscus quernus, quid? Gypsum
quale eligendum, 218, 219
- Sanguinis humani electio, 220
- Emp. de Muscilaginibus, 223
- Maturat Apostemata, durities mollit,
partim resolvit, & partim dirigit.
- Emp. de Minio, 225
- Ad ulcera mala & antiqua.
- Minium, quid? controversiæ variorum
Auctorum de eo, 226
- Emp. pro Stomacho, 231
- Ad temperiem ventriculi frigidam &
humidam.
- Emp. de Meliloto, 233
- Emollit omnem duritiem Lienis, jeco-
ris, ventriculi, &c.
- Emp. pro Matrice, 238
- Ad Uteri imbecillitatem & ejus proce-
dentiam, & aliis muliebribus vitiis &
nimix humorum copix optime suc-
currit.

I N D E X.

S E C T I O I I .

D E Unguentis in genere ,	241
Vnguentum, quid? & ejus differen-	
tia à linimento,	242
Vng. Album Rhafis,	243
Cerufa, quid?	244
Ad intertrigines, & ambufta.	
Vng: Tripharmacum feu Nutritum,	244
Vnde nutritum dictum, Lytargyrium	
aureum & argenteum quid? ad in-	
flammationes, exuftiones & biliofas	
eruptiones,	246
Vng: aureum, ad vulnera leniter deter-	
genda & glutinanda,	248
Vng: Basilicum ad opus movendum,	
præcipue ad ulcera nervorum, nam	
calefacit parũ, & blãde abftergit,	249
Vng: Ægyptiacum ad ulcera fistulofa	
detergenda, excrescentemque, aut	
emortuam carnem vehementer exe-	
dendam,	250
Vng: Populeum ad Renum capitisque	
dolores compescendos, ac fomnum	
conciliandum,	251
Vng: de Althæa, ad nervorum duritiem	
emolliendam, ac pectoris laterisque	
dolorem ex frigida caufa lenien-	
dum,	264
Vng:	

I N D E X.

- Vng: Agrippæ, ad corporis œdemata
discutienda, ac hydropicos lienosof-
que juvandos, 259
- Vng: Rosarum sedativum inflamma-
tionum & erysipelatis, & ignis perfic
& sodæ calidæ. 261
- Vng: inulatum ad pruritum, ad scabiem
& alias cutis fœditates, 264
- Transcolatio per alutā argenti vivi, 266
- Argentum vivum, quid, & quomodo à
Chymistis nominatur, quotuplex sit,
& quomodo extinguatur, nec non
ejus electio, 267
- Vng: Diapompholygos, ad ulcera cava
carne implenda, ad cicatricem fic-
cando perducenda, 269
- Plumbum, quotuplex, & ejus differen-
tia, 272
- In quo loco reperiatur, ac modus ejus
præparationis, [273, 274
- Pompholyx vel Spodium, quid, 277
- Vng: Apostolorum ad ulcera detergen-
da & carne implenda, 279
- Succus quomodo admiscendus, 286
- Vng: Martiatum ad Cerebri, nervo-
rumque frigidos affectus, tremorem,
convulsionem & resolutionem, nec
non arthritidam, 288
- Vng: ad Scabiem, confert maxime mor-
pheæ,

I N D E X.

- pheæ, scabiei & aliis cutaneis viriis, 285
 Vng: Comitissæ. Inceptū abortum pro-
 hibet: hæmorrhoidas sistit, ac laxa-
 tos lumbos conciliat, 286
 Vtlio cruris bovis, 291
 Vng: Aregon. Ad uterina mulierum ma-
 la, distentiones, quartanas, comitia-
 les, spinę dolores, & renum valet. 293
 Vng: de Tuthia. Stibium, quid? 298,
 Ejus lotio & præparatio, 300
 Maxime ad oculorum affectiones con-
 fert & inflammationes sistit, 296

S E C T I O I I I.

- D**E Oleis in genere, 301
 Eorum differentia, 302
 De Oleis in specie, 303
 Oleum Amygd: dulc: Asperitates lenit
 gutturis pulmonis, & ad frigidos, &
 flatulentos affectus, 303
 Oleum Laurinum, 307
 Oleum Ovorum, ad impetiginem &
 cutis morbos, facit nasci capillos, &
 cōfert fistulis & ulceribus malis, ibid.
 Oleum de Therebinthina, Simplicia
 vulnera sanat, ad nervos contractos
 à frigiditate valet, 309
 Oleum Rosatum completum, ad dolo-
 res

I N D E X.

- res capitis ex febre, &c. 310
- Oleum Rosarum Omphacinū quid? 311
- Oleum Violaceum, Asbynthinum, Anethinum, Rhutaceum, Majoranæ, Nardinum, Menthinum, Papaverinum, Chamæmelinum, Lileaceum, Cheirinum, Sambucinum, 312
- Oleum de Cytoneis. Ad debilitatem stomachi, vomitum & fluxum: restaurat resolutionem, corroborat nervos, &c. 313
- Oleum Irinum. Attenuat, resolvit, maturat, digerit humores phlegmaticos, faciliat sputum, sedat tussim, mollit durities matricis, confert spasma, doloribus juncturarum & foetorinarium, 314
- Oleum Mastichinum, Cerebrum, nervos, juncturas, ventriculum, hepar corroborat: tumores duros lenit, dolores sedat, 316
- Oleum de Euphorbio, ad frigidos cerebri & nervorum affectus, si in spina dorsi linatur, 317
- Oleum costinum, Calefacit, obstructa aperit, nervosum genus roborat, corporis odorem, ac colorem commendat, 319
- Oleum Lumbricorum, Nervos infrigidatos
- P 5


I N D E X.


- datos confortat : & utile est dolori-
 bus juncturarum, 320
- Oleum de Croco, Nervos in frigidato-
 confortat, & ad dolores juncturarum
 utiles, 321
- Oleum de Capparibus, valet duritie
 opilationi, & dolori splenis, ac omni
 ejus ægritudini, 323
- Oleum de Scorpionibus, lapidem re-
 num & vesicæ frangit, & expellit,
 lumbis, pubi, peritonæo illitum aut
 per meatum urinarium injectum, 324
- Oleum Vulpinum ad Podagras, reli-
 quasque arthritidis species, ac dorsi,
 renumque dolorem est efficacissi-
 mum, 325


F I N I S I N D I C I S E T
 F A C V L T A T V M.


*Errata quæ lectionis sensum remorantur
sic benigne Lector emendabis.*


Pag. 33, lin. 8. forcipe. 34, 4. florum. 52, ult. Baphyco.
55, 9. Pinidiæ. 58, 29. ureteres. 60, 6. Alkakingi.
75, 25. hic. 76, 4. Tertius, ut malefica vis illorum cor-
rigatur. 116, 19. Sælius. 139, 14. libro 111. 163, 12.
Nestucas. 240, 24. Ladanum: 255, 21, 22. lib. semis &
colophonix tritæ, & resinæ albæ puræ addantur uncia iij.
246, 2. Lithargyrio. 6, penult. Stater. 325, Christ.
10 & 11. Θ pro X.

















B 736